



استفراغ همراه با سردرد شدید یا درد شکم باشد، پیگیری پژوهشکی ضروری است.

علل مهم استفراغ به شرح زیر است:

- ۱- تحریکات عصبی مثل سردردهای میگرنی
- ۲- مسایل گوارشی نظری مسمومیت غذایی
- ۳- بیماری‌های مربوط به کبد، کلیه و ...

که در مصرف غذاهای چرب روی می‌دهد. اما ممکن است به دنبال بیماری و گرفتاری هر قسمی از دستگاه گوارش هم ایجاد شود. گاهی هم بر اثر تحریکات عصبی یا بیماری‌های مربوط به گوش، استفراغ ایجاد می‌شود. افرادی که مبتلا به حمله‌های مکرر میگرن می‌شوند، از علایم آشنایی مثل سردرد همراه با تهوع و استفراغ آگاهند. اما در مواردی دیگر که

توجه!

چنانچه همراه استفراغ، خون به صورت رگه‌های قرمز رoshn، ذرات سیاه شبیه به دانه‌های قهوه‌ی لخته‌ی خون باشد باید فوراً به پژوهشک مراجعه کنید.

- اسهال وی پس از ۳ روز نیز بهمود نیابد.
- اسهال خیلی آبکی باشد.
- استفراغ مکرر داشته باشد.
- تشنج خیلی زیاد داشته باشد.
- بی‌حال یا خواب‌آسود باشد.

به هر کودک مبتلا به اسهال، اگر شیر مادر می‌خورد، به دفعات بیشتر و به مدت طولانی‌تر در هر وعده شیر بدھید و در صورت شروع غذایی کمکی، مایعات بیشتر مانند سوپ، دوغ و آب سالم بدھید و نوشاندن مایعات اضافی را تا زمان قطع اسهال ادامه دهید.

نوشاندن مایعات به کودک مبتلا به اسهال، نجات بخش زندگی اوست.

تقاضه با شیر خشک، عدم دسترسی به آب آشامیدنی سالم، دفع غیربهداشتی زباله و عدم رعایت بهداشت مواد غذایی از عوامل مساعد کننده‌ی بیماری‌های اسهالی‌اند. مایعات مناسب برای پیشگیری از کم آبی بدن در دوران بیماری اسهال شیر مادر، سوپ، لعاب برنج، دوغ و محلول O.R.S است. استفاده از توالت بهداشتی، تمیز نگهداشتن آب و غذا و شستن دست‌ها با آب و صابون بعد از توالت و قبل از خوردن غذا می‌تواند از بروز اسهال پیشگیری کند.

۳-۵-۲-۳-۳-۳ اسهال: اسهال در واقع دفع مکرر بسیار شل یا مدفع آبکی است. اسهال اغلب با دل درد و دلیلچه (انقباض‌های عضلات قسمت پایینی شکم) همراه است. در بسیاری از موارد اسهال به سبب عفونت‌های ویروسی است و کمتر از ۴۸ ساعت طول می‌کشد. اسهال به ندرت شدید است و عموماً تنها درمانی که لازم دارد مصرف مقادیر فراوان مایعات برای پیشگیری از کاهش آب بدن است. با این همه در صورت ادامه پیدا کردن اسهال به مدت بیشتر از ۴۸ ساعت یا بیشتر شدن تعداد دفعات اسهال باید به پژوهشک مراجعه کرد. هم‌چنین در صورتی که شغل شما در تماس با مواد غذایی است و مبتلا به اسهال شده‌اید حتماً به پژوهشک مراجعه کنید.

اسهال می‌تواند بر اثر باکتری‌ها، ویروس‌ها، قارچ‌ها و سم موجود در مواد غذایی فالس ایجاد شود.

اگر با اسهال، خون نیز همراه باشد و یا تعداد دفعات اجابت مزاج به حدی زیاد باشد که فرد بی‌حال شود و یا تب بیمار بالا باشد باید به سرعت به مرکز درمانی مراجعه کنید.

اسهال دومین عامل مرگ و میر کودکان زیر ۵ سال در کشور ماست. اگر در هر کودک مبتلا به اسهال، علایم زیر مشاهده شود باید هر چه سریع‌تر به پژوهشک مراجعه کنید:

- در مدفع کودک خون دیده شود.

- میل به مایعات ندارد.

فعالیت عملی ۲

هنرجویان را به گروه‌های ۵ نفری تقسیم کنید. هر گروه تعدادی از کودکان و والدین آن‌ها را از میان همسایگان و افراد فامیل خود انتخاب کرده، در بحث زیر شرکت دهند،
ابتدا با تجربیات خود کودکان شروع کنید. علایم اسهال را شرح دهید و از کودکان پرسید.

- چه کسی به چنین بیماری مبتلا شده است؟
- آخرین بار چه زمانی به این بیماری مبتلا شده است؟
- آیا هیچ یک از شما کلمه‌ی اسهال را شنیده است؟
- سپس بحث را درباره‌ی پرسش‌های کلیدی متمرکز کنید مثلاً پرسید:
- چگونه اسهال را تشخیص می‌دهید؟
- آیا اسهال داشتن فقط یک جور کثیف بودن است یا خطرناک هم هست؟
- کدام گروه سنی بیشتر دچار اسهال می‌شوند؟
- آیا کودکانی که با شیشه تغذیه می‌شوند بیشتر اسهال می‌گیرند یا کودکانی که از شیر مادر تغذیه می‌کنند؟

فعالیت عملی ۳

هنرجویان ابتدا طرح کودکی را بر روی کاغذ یا تخته سیاه بکشند.
سپس علایم کم آبی شدید بدن را بنویسند. این علایم به شرح زیر است:

- ملاج فرو رفته
- چشم و دست‌های بدون حرکت
- دهان و زبان خشک
- چشمان فرورفته و بدون اشک
- پوست شل

در مرحله‌ی بعدی علایم ذکر شده را روی طرح کودکی که ترسیم کرده‌اند، علامت‌گذاری کنند.
در آخرین مرحله‌ی تصویر علامت‌گذاری شده را در کلاس نشان دهند و درباره‌ی آن بحث کنند.

۴-۵- یبوست: بعضی از افراد روزانه یک یا (سبزی‌ها و میوه‌ها) در رژیم غذایی است. یبوست در دوران بارداری نیز شایع است، چون تغییرهای هورمونی بدن باعث شل شدن عضلات روده می‌شود. چنانچه یبوست بیش از ۲ هفته طول بکشد، حتماً به پزشک مراجعه کنید.

علت یبوست معمولاً کم بودن مایعات یا غذاهای برفیر دو بار و برعی دیگر بسیار کمتر اجابت مزاج می‌کند. یبوست حالتی است که دفعات اجابت مزاج کمتر از حد معمول است یا مدفعه سفت و کم حجم شده است.

توجه!

اگر موقع دفع احساس درد همراه با خستگی زیاد و احساس سرمای بیش از حد نسبت به گذشته و خشکی پوست یا شکنندگی موها وجود دارد، احتمالاً مربوط به کمکاری غده‌ی تیروئید است و حتماً باید به پزشک مراجعه کنید.



اگر رنگ پوست یا چشم فردی به زردی گراییده است برای تشخیص علت دقیق آن به پزشک مراجعه کنید.

اقدام‌های ساده‌ی زیر می‌تواند برای پیشگیری یا درمان بیوست مفید باشد:

- مصرف غذاهای پرفیر مانند سبزی‌ها را زیاد کنید.
- بر مصرف مایعات روزانه بیفزایید.
- هرگاه ضروری بودن اجابت مزاج را احساس می‌کنید، خودتان را نگه ندارید، حتی اگر خیلی مشغول باشید.
- سعی کنید برای دفع برنامه‌ی منظم به صورت روزانه داشته باشید، به طوری که هر روز در همان ساعت برای دفع به توالت بروید.
- فعالیت بدنی و ورزش روزانه را در برنامه‌ی خود قرار دهید.

۶-۲- مسایل مربوط به خون

یکی از مهم‌ترین مسایل مربوط به خون، کم‌خونی است.

۱-۶- کم‌خونی: خون از سه جزء: گلوبول‌های قرمز، گلوبول‌های سفید و پلاکت‌ها تشکیل شده است. رنگ قرمز خون به علت وجود ماده‌ای به نام هموگلوبین در گلوبول‌های قرمز است.

کم‌خونی عبارت است از: پایین‌تر از حد طبیعی بودن حجم گلوبول‌های قرمز.

علل مهم کم‌خونی عبارت است از:

ساخت ناکافی خون در بدن، خونریزی، وجود عوامل شیمیایی مثل سم و دارو در بدن، عفونت‌ها و سرطان‌ها. آیا می‌دانید با دیدن چه علایمی باید به کم‌خونی شک کنید؟ مهم‌ترین علامت آن رنگ پریدگی بیمار است. تنگی نفس، تپش قلب، خستگی و زردی نیز از علایم دیگر کم‌خونی‌اند. از میان انواع کم‌خونی‌ها کم‌خونی فقر آهن به علت شیوع زیاد و اهمیت آن توضیح داده می‌شود.

۶-۵- یرقان (زردی): تعریف شما از زردی چیست؟ آیا تا به حال با فردی که دچار یرقان است، برخورد داشته‌اید؟ یرقان عبارت است از: تغییر رنگ بافت‌ها به ویژه صلبیه (سفیدی) چشم به رنگ زرد.

شایع‌ترین علل زردی عبارت است از: هپاتیت (التهاب کبد)، بیماری‌های کبدی، داروها، سنگ‌های صفراوی.



بیشتر بدانید

انواع مختلف کم‌خونی:

- کم‌خونی ناشی از نارسایی مغز استخوان در ساخت گلوبول‌های قرمز (خون در سلول‌های مغز استخوان ساخته می‌شود).
- کم‌خونی ناشی از خونریزی
- کم‌خونی ناشی از اختلالات گلوبول‌های قرمز
- کم‌خونی ناشی از کمبود ویتامین‌ها
- کم‌خونی ناشی از کمبود آهن

(برخی انگل‌ها با تغذیه از خون بیمار، موجب کم خونی می‌شوند). در بسیاری از جوامع مقدار آهن جذب شده از رژیم غذایی برای تأمین نیاز بسیاری از افراد کافی نیست. اگر مقدار آهن قابل جذب رژیم غذایی قابل افزایش نباشد باید از مکمل‌های آهن (قرص آهن یا اسید فولیک) استفاده کرد. کودکان ۶-۲۴ ماهه و زنان باردار تقریباً همیشه در این گروه قرار می‌گیرند. این کم خونی در بین زنان به دلیل دفع آهن از طریق خونریزی ماهانه پیشتر دیده می‌شود، بهخصوص زنان باردار. نوجوانان و کودکان نیز به سبب قرار گرفتن در سن رشد در معرض کم خونی هستند.

این نوع کم خونی به علت کمبود آهن در بدن ایجاد می‌شود. کم خونی فقر آهن یکی از مشکل‌های تغذیه‌ای شایع در جهان است و نه تنها تهدیدی برای سلامت مادران است بلکه در کم وزنی هنگام تولد و کاهش مقاومت در برابر عفونت دخالت دارد. این نوع کم خونی اکثرأ بر اثر کمبود آهن در مواد غذایی ایجاد می‌شود.

برای پیشگیری و درمان کم خونی فقر آهن چندین روش وجود دارد که عبارت است از:

- بهبود رژیم غذایی، غنی‌سازی مواد غذایی با آهن،
- استفاده از مکمل‌های آهن و کنترل عفونت‌های انگلی.

توجه!

اگر همراه با غذا یا با فاصله‌ی زمانی اندک پس از مصرف غذاچای یا قهوه مصرف شود، جذب آهن کم می‌شود.

۳ فعالیت عملی

هر هنرجو داستان کوتاهی از قول خانمی که مبتلا به کم خونی فقر آهن است بنویسد.

داستان را می‌توانید به این صورت آغاز کنید:

اسم من ... است. من در روستای ... واقع در شهر ... زندگی می‌کنم. روستای ما بسیار خوش آب و هواست (مختصری در خصوص آن روستا توضیح دهید). غذای مادر این روستا اغلب ... است. یکی از مشکل‌هایی که در بین نوزادانی که در روستای ما متولد می‌شوند، این بود که هنگام تولد بسیار لاغر بودند. ولی به علت عدم آگاهی مردم کسی به این مسأله توجهی نداشت.

من به تدریج متوجه شدم که هنگام فعالیت دچار خستگی می‌شوم و گاهی احساس سرگیجه نیز دارم. سپس بیمار به پزشک مراجعه می‌کند. پزشک بعد از پرسیدن سؤالاتی از بیمار و انجام آزمایش، مشکل بیمار را کم خونی فقر آهن تشخیص و توصیه‌های لازم را انجام می‌دهد.

۷-۲- مسایل مربوط به کلیه

۷-۱- تکرار ادرار^۱، نیاز فوری به ادرار عفونت دستگاه ادراری است. ولی هر یک از این ۳ علامت کردن^۲ و سوزش ادرار^۳: این ۳ علامت اکثرأ نشان‌دهنده‌ی اگر به طور جداگانه نیز باشد، باید بررسی شود.



توجه!

چنان‌چه تب و لرز و درد در ناحیه‌های پشت و پهلو داشتید باید هرچه سریع تر به پزشک مراجعه کنید.

۲-۷-۲ دردهای ناحیه‌ی کلیه: این گونه دردها می‌شود.

اکثرًا یک طرفه‌اند و بر اثر التهاب یا سنگ کلیه ایجاد

توجه!

درد معمولاً همراه با تهوع و استفراغ است و چنان‌چه تب و لرز داشتید یا خون درون ادرار تن دیده شد
باید هرچه سریع تر به پزشک مراجعه کنید.

۲-۷-۳ سنگ‌های کلیوی: یکی از علل شایع علاوه بر ایجاد درد شدید در بیمار، می‌تواند باعث عفونت نیز

درد ناحیه‌ی پهلوها و دیدن خون در ادرار، سنگ‌های کلیوی بشود.

هستند. اکثر سنگ‌ها از جنس کلسیم است. سنگ‌های کلیوی

بیشتر بدانید

خون در ادرار!

خون در ادرار همیشه به معنی ادرار قرمز رنگ نیست. کاهی با وجود خون در ادرار، ادرار به رنگ قرمز درنمی‌آید. وجود خون در ادرار، هم می‌تواند دردنگ باشد و هم بدون درد.

سرطان کلیه، وجود توده در کلیه، صدمه به کلیه و یا عفونت‌ها باعث می‌شود بدون آن که فرد احساس درد کند در ادرارش خون دیده شود.

چنانچه خون در ادرار همراه درد باشد، معمولاً ناشی از سنگ یا عفونت کلیه است.

توجه!

به جز ادرار دفع شده‌ی صبحگاهی معمولاً ادرار شفاف، زرد کمرنگ و کهربایی است.



مبانی سماری‌های واگیر و غیر واگیر: آشنایی با علائم و نشانه‌های شایع سماری‌ها

- ۴-۷-۲- تسکین علایم عفونت‌های دستگاه ادراری: لازم است عفونت‌های دستگاه ادراری با تجویز آنتی‌بیوتیک درمان شود. اقدام‌های زیر نیز می‌تواند در تسکین علایم قبل از مراجعه به پزشک مفید باشد:

 - در ۴ ساعت اول هر یک ساعت حدود نیم لیتر (دو لیوان) مایعات بنوشید.
 - قرص استامینوفن بخورید.
 - برای پیشگیری از بروز مجدد عفونت باید روزانه ۲ تا ۳ لیتر مایعات بنوشید.
 - در هوای گرم از مقدار فوق نیز بیشتر بنوشید.

همیشه کارهای پیشگیری کننده‌ی زیر را انجام دهنده:

 - تخلیه‌ی کامل و مرتب مثانه بسیار اهمیت دارد.
 - علاوه بر این زنان مبتلا به عفونت‌های ادراری باید بهداشت را به خوبی رعایت کنند. پس از دفع خود را از جلو به عقب بشویند تا از ورود باکتری‌ها از مقعد به پیشابراه جلوگیری شود.
 - مدت کوتاهی پس از آمیزش جنسی ادرار کنند.
 - هنگام شستشو از لوازم بهداشتی غیرمعطر استفاده کنند.

توجه!

چنان‌چه مفصل گرم و دردناک باشد، حرکت مفصل با درد شدید همراه باشد، مفصل شکل طبیعی خود را از دست داده باشد، درد و تورم در مفاصل کوچک هر دو دست باشد و خشکی هنگام صبح و خشکی کلی بدن حداقل یک ساعت طول بکشد باید به بیزشک مراجعه کنند.

- ۲-۸-۱-درد مفاصل : به محل اتصال دو یا چند استخوان مفصل می‌گویند. مفاصل بدن باعث می‌شوند تا حرکت دو استخوان مجاور بر روی هم امکان‌پذیر شود. درد مفاصل علامتی شایع است و علت آن اغلب استفاده‌ی بیش از حد از مفصل یا وارد آمدن آسیب‌های خفیف است. چنین علایمی معمولاً کوتاه مدت‌اند و درمان دارویی ضرورتی ندارد. اما چنان‌چه درد مفصل طول بکشد، نشانه‌ای از بیماری جدی است و باید پژشک آن را بررسی کند.

۲-۸-۲-اغلب یکی از مفاصل تحمل کننده‌ی وزن بدن را مثل لگن یا زانو گرفتار می‌کند.

اگر بر اثر عواملی مانند وزن زیاد، سن بالا، بعضی بیماری‌های خاص و ... این مفاصل آسیب بینند و نتوانند وظایف خود را به درستی انجام دهند، آن را آرتربیت گویند که اکثرًا با درد مفصل مشخص می‌شود و به تدریج منجر به التهاب و تخریب مفصل می‌شود.

پوکی استخوان هم حالتی است، که در آن استخوان شکننده می‌شود و احتمال شکستگی با ضربات و صدمه‌های کوچک افزایش می‌یابد.

اگر درد و خشکی مفصل به تدریج و در عرض چند ماه انجاد شده باشد ممکن است به علت آرتربیت باشد. این سعادتی



بیشتر بدانید

یک بیماری شایع متابولیک استخوان بوده و در آن کاهش عمومی و شدید در توده‌های استخوانی (پوک شدن استخوان) بوجود می‌آید که در آن عناصر تشکیل دهنده‌ای استخوان از نظر کیفیت تغییر نمی‌کند ولی، از



نظر کمیت کاهش می‌باید. این بیماری وقتی بروز می‌کند که کاهش توده‌ی استخوان بیش از حد سریع باشد. در ضمن خانم‌ها بسیار بیشتر از آقایان دچار پوکی استخوان می‌شود و همین‌طور با افزایش سن احتمال بروز پوکی استخوان بیشتر می‌شود.

۲-۸-۲ دست درد: درد دست می‌تواند بر اثر باشد و باید هر چه سریع‌تر به اورژانس مراجعه کنید.
۳-۸-۲ پا درد: درد پا اغلب به سبب آسیب‌دیدگی خفیف عضلات، تاندون‌ها و رباط‌ها ایجاد می‌شود. چنین آسیب‌هایی آسیب‌هایی اغلب پس از فعالیت سنگین و غیرمعمول و یا در بی‌انجام ورزش‌های سنگین پس از مدت‌ها بی‌فعالیتی ایجاد می‌شود که خود به خود خوب می‌شود.



آسیب‌دیدگی یا کشیدگی عضلات و تاندون‌ها یا رباط‌های نگهدارنده‌ی استخوان‌ها و مفاصل ایجاد شود. چنین آسیب‌هایی خصوصاً پس از فعالیت‌های جسمی سخت و غیرمعمول، مثل



ورزش کردن پس از مدت‌ها بی‌فعالیتی ایجاد می‌شود. منشأ آن درسته از دردهای دست که به تدریج ایجاد می‌شوند ممکن است درد ناحیه‌ی گردن باشد.

اگر درد بازو با تنگی نفس، تهوع، عرق کردن یا احساس طولانی مدت در یک یا هر دو پای خود احساس درد یا سنگینی می‌کنید ممکن است مبتلا به علت حمله‌ی قلبی از حال رفتن همراه است.

درد پا ممکن است علل مهم‌تری نیز مثل بیماری‌های مربوط به رگ‌های خونی پا داشته باشد. اگر پس از ایستادن طولانی مدت در یک یا هر دو پای خود احساس درد یا سنگینی می‌کنید ممکن است مبتلا به علت حمله‌ی قلبی از ایستادن طولانی مدت پرهیز کنید.

بیشتر بدانید

- کثار آمدن با سیاه‌رگ‌های مبتلا به واریس واریس متورم شدن سیاه‌رگ‌های پاست که با درد زیادی همراه است. چنان‌چه درد پایتان ناشی از سیاه‌رگ‌های واریسی است اقدام‌های زیر می‌تواند مفید واقع شود:
 - از ایستادن طولانی مدت پرهیز کنید.
 - چنان‌چه مجبور به ایستادن هستید در فواصل زمانی منظم پاها بین راه حرکت دهید تا جریان خون حفظ شود.
 - هنگامی که نشسته‌اید پاهای خود را بر روی چهارپایه یا زیرپایی بگذارید.
 - از پوشیدن لباس‌های تنگ پرهیز کنید.
 - چنان‌چه اضافه وزن دارید سعی کنید آن را کاهش دهید.

۴-۸-۲-کمر درد: کمر درد معمولاً به خاطر قرار گرفتن دقیقه روی ناحیه‌ی دردناک بگذارید.

- در صورت شدید بودن کمر درد یا بهتر نشدن آن در عرض ۲ روز به پزشک مراجعه کنید.

نکته‌های زیر در خصوص مراقبت از کمر بسیار مهم‌اند:

- وضعیت مناسب قرارگیری بدن و دقت در بلند کردن صحیح اجسام سنگین می‌تواند در پیشگیری از مشکل‌های کمر مفید باشد.
- صاف بایستید و از پوشیدن کفش‌های پاشنه بلند بپرهیزید.
- موقعی که پشت میز نشسته‌اید به وضعیت قرار گرفتن خود توجه کنید.

- موقعی که در خودرو یا در خانه نشسته‌اید در وضعیت مناسب بنشینید.
- لازم است یک تشك اضافی برای محافظت بهتر از کمر بر روی تختخواب خود بگذارید.
- ورزش مرتب و ملایم می‌تواند در تقویت عضلات کمر و شکم و کاهش اضافه وزن مفید باشد.
- موقع برداشتن اشیاء زانوهای خود را خم کنید و در زمان بلند کردن، کمر خود را صاف بگیرید.

بدن در وضعیت نامناسب ایجاد می‌شود. با وجود این کمر درد می‌تواند نشانه‌ای از آسیب مفاصل، رباطها یا دیسک غضروف بین مهره‌ای باشد. در بسیاری از موارد این اتفاق به خاطر کارهای مثل بلند کردن اجسام سنگین رخ می‌دهد و معمولاً انجام اقدام‌های ساده‌ی زیر برای درمان آن‌ها مفید واقع می‌شوند.



- تا حد امکان فعالیت داشته باشید و کارهای روزانه‌ی معمول خود را انجام دهید.

- در صورت شدید بودن درد در بستر استراحت کنید. اما این استراحت نباید بیش از دو روز طول بکشد.

- از استامینوفن استفاده کنید.

- کیسه‌ی آب داغ را در یک حolle پیچیده و روی ناحیه‌ی دردناک خود بگذارید.

- در صورتی که گرم کردن باعث تسکین درد نشد، از کیسه‌ی یخ استفاده کنید و آن را هر ۲ تا ۳ ساعت به مدت ۱۵

فعالیت عملی ۵

هنرجویان به گروه‌های ۵ نفری تقسیم شوند و هر گروه نحوه‌ی مراقبت از کمر درد را در قالب یک

نمایش در کلاس ارایه کنند. نمایشنامه را می‌توان به این صورت طراحی کرد:

- یکی از افراد کلاس هنگام بلند کردن جسمی سنگین دچار کمر درد می‌شود.
- خانواده‌ی بیمار، او را به نزد پزشک می‌برند.
- پزشک ضمن معاینه‌ی بیمار و حصول اطمینان از آن که آسیب جدی به وی وارد نشده است، برای تسکین درد او استامینوفن تجویز و توصیه می‌کند. کیسه‌ی آب داغ روی ناحیه‌ی دردناک بگذارد.
- پزشک توصیه‌های لازم را در خصوص مراقبت صحیح از کمر به بیمار و اطرافیان وی ارایه می‌کند.



- ۲-۹-۱**—**مسایل مربوط به گوش و حلق و بینی** کمک شست و شو درمان کرد.
- ۲-۹-۲**—**مشکلات شنوایی** : در بسیاری از موارد کاهش شنوایی از خصوصیات شایع بالا رفتن سن نیز کاهش شنوایی تیجه‌ی عفونت گوش یا بسته شدن مجرای گوش در اثر جرم گرفتگی است که به آسانی می‌توان آن را به هست.

توجه!

در موارد زیر حتماً به پزشک مراجعه کنید:

- اگر ترشحی به رنگ زرد مایل به سبز از گوشستان خارج می‌شود.
- اگر دچار حملات سرگیجه به نوعی شده‌اید، که احساس می‌کنید همه چیز دور سرتان در حال چرخیدن است (سرگیجه واقعی) و یا صدای‌هایی در گوش خود می‌شنوید.
- در صورت کاهش ناگهانی شنوایی بدون هیچ علت واضح در یک یا هر دو گوش.

گرفتگی گوش است. در صورت شدید بودن درد لازم است به پزشک مراجعه کنید.

هنگام پرواز یا در ارتفاع نیز ممکن است، فرد دچار گوش درد و مبهم شنیدن صداها شود. چنانچه استفاده از آبنبات یا آدامس مؤثر نبود، در حالی که سوراخ‌های بینی خود را با دست گرفته و بسته‌اید، سعی کنید هوا را با فشار از بینی خارج کنید.

۲-۹-۳—**گرفتگی یا آبریزش بینی** : بیشتر افراد حداقل یک بار در سال دچار گرفتگی یا آبریزش بینی می‌شوند. معمولاً علت این علایم تحریک شدن مخاط بینی است. این تحریک ممکن است تیجه‌ی یک عفونت ویروسی مثل سرماخوردگی یا تیجه‌ی واکنش‌های حساسیتی باشد.

سروصدای بیش از حد می‌تواند به گوش داخلی آسیب برساند و باعث ایجاد مشکلات شنوایی شود، پس باید از رویه رو شدن با سروصدایی بلند دوری کرد مثلاً به موسیقی با صدای بلند خصوصاً از طریق گوشی (هدفون) گوش نکرد. اگر مجبورید که از طریق گوشی به موسیقی گوش دهید حتماً باید صدا به اندازه‌ای کم شده باشد که بتوانید صدای دیگر را هم علاوه بر موسیقی بشنوید.

چنانچه در محل کار سروصدایی بلند هست همیشه از گوشی یا محافظت گوش استفاده کنید.

۲-۹-۲—**گوش درد** : درد گوش می‌تواند از یک احساس مبهم گرفته تا دردی تیز، شدید و ناخوشایند متفاوت باشد. درد معمولاً به خاطر عفونت مجرای گوش ایجاد می‌شود. گاهی نیز علت گوش درد بسته بودن مجرای گوش به سبب جرم



ویروسی یا کار کشیدن بیش از حد از صداست. می‌توان این علایم را با برخی اقدام‌ها تسکین داد و معمولاً نیازی به مراجعه به پزشک نیست. آواز خواندن با صدای بلند یا داد زدن موقع تشویق در مسابقه می‌تواند باعث التهاب تارهای صوتی شود.

۴-۹-۲- گرفتگی صدا یا درنیامدن صدا: گرفتگی صدا، خشکی صدا یا درنیامدن صدا تقریباً همیشه به علت لارنژیت (التهاب و ورم حنجره و تارهای صوتی) ایجاد می‌شود. در بیشتر موارد، علت این التهاب، عفونت‌های


توجه!

چنان‌چه گرفتگی صدا، در نیامدن صدا یا تغییر آن بیش از دو هفته طول کشیده است و یا مکرراً رخداد دهد، خصوصاً اگر سن فرد بالای ۴۰ سال است و سیگار نیز می‌کشد، شاید علت خطرناکی داشته باشد و باید به پزشک مراجعه کند.

چنان‌چه صدایتان در نمی‌آید یا دچار گرفتگی شده است، اقدام‌های زیر قبل از مراجعه به پزشک می‌تواند مفید باشد :

- تا حد امکان از صدایتان استفاده نکنید.
- در محیط پُر از دود سیگار نروید.
- مایعات زیاد بنوشید.
- در صورت ابتلا به علایمی شبیه سرماخوردگی از داروهای مسکن مثل استامینوفن استفاده کنید.
- ظرفی را از آب داغ پر کنید و چند دقیقه بخار آن را به بینی بکشید.
- نباید بیش از دو هفته به این اقدام‌ها تکیه کنید. در صورت برطرف نشدن علایم در این مدت به پزشک مراجعه کنید.

۱-۲-۱۰- سر درد : تقریباً هر فردی گاه‌گاهی دچار سردردهای خفیف تا متوسطی می‌شود که به تدریج ایجاد شده، بعد از چند ساعت برطرف می‌شود بدون آن که عارضه‌ای از خود بر جای بگذارد. بعید است چنین سردردهایی علامتی از وجود بیماری زمینه‌ای جدی باشد. معمولاً این سردردها نتیجه‌ی مسایلی مثل فشارها و تنفس‌های روزانه یا خستگی‌اند.



۱۰- مسایل مربوط به سیستم عصبی

دستگاه عصبی در واقع به عنوان فرماندهی بدن است و تمامی اعضای بدن تحت کنترل این دستگاه است. دستگاه عصبی از دو قسمت مغز و نخاع تشکیل شده که از هر یک از آن‌ها

توجه!

در موارد زیر به مرکز درمانی مراجعه کنید:


- چنانچه سردرد شما شدید باشد و به صورت ناگهانی و در چند دقیقه ایجاد شده است و یا بیشتر از ۲۴ ساعت طول بکشد.
- اگر با مصرف داروهای مسکن بدون نسخه ممثل استامینوفن برطرف نشود.
- اگر سردرد چندین بار در طول یک هفتگه رخدید.
- اگر همراه سردرد، حالت تهوع و استفراغ و تاری دید وجود داشته باشد.
- اگر سردرد با خم کردن سر بدتر می‌شود و میدان دید نیز مشکل دارد.



چیز در حال دوران است، حالتی غیرطبیعی است مگر آن که فرد کل نوشیده باشد، یا آن که مرتبأ به دور خود چرخیده باشد (مثل چرخ و فلک سواری). سرگیجه ممکن است علامتی از یک بیماری زمینه‌ای باشد. سرگیجه معمولاً با احساس تکان (همانند فردی که در قایق نشسته است) و با علایم تهوع، استفراغ و تلوتلو خوردن همراه است. در صورت تکرار یا طولانی شدن سرگیجه باید به پزشک مراجعه کرد.

برای تسکین سردرد، در بین کار روزانه استراحت کرده، هوای آزاد تنفس کنید. عضلات شانه و گردن را ماساژ دهید. اگر این اقدام‌ها مفید واقع نشد در اتفاقی آرام، خنک و تاریک استراحت کنید.

۲-۱۰-۲ سرگیجه: احساس عدم تعادل برای یک لحظه، اتفاقی شایع است و نباید مایه‌ی نگرانی باشد. اما سرگیجه‌ی حقیقی که طی آن شخص احساس می‌کند که همه



۱۱-۲ مشکلات مربوط به چشم

چشم یکی از اعضای بسیار حساس بدن است و در مراقبت از آن باید بسیار دقت کرد. در اکثر موارد درد چشم به علت مسایل نسبتاً حفيف و جزئی است. در صورت ابتلا به درد شدید در چشم یا اطراف آن، قرمزی چشم، ضربه به چشم، تاری، دوبینی و کاهش دید به پزشک مراجعه کنید.

چکیده

✓ در طول این واحد کار ۱۱ نشانه از شایع‌ترین علایم مربوط به بیماری‌های مختلف شرح داده شد. این ۱۱ علامت شامل: مسایل عمومی، مسایل مربوط به پوست، مسایل قلبی - عروقی، مسایل مربوط به دستگاه تنفس، مسایل مربوط به دستگاه گوارش، مسایل مربوط به خون، مسایل مربوط به کلیه، مسایل مربوط به سیستم عضلانی اسکلتی، مسایل مربوط به گوش و حلق و بینی، مسایل مربوط به سیستم عصبی و مشکل‌های مربوط به چشم بود. این علایم (همراه با توضیحاتی که در متن آمده است)، می‌تواند زنگ خطر و تهدیدی برای سلامت شما باشد.

✓ لذا شما با مشاهده‌ی این علایم (در صورتی که غیرطبیعی بودند) می‌توانید اقدام‌های اولیه را انجام داده، در صورت لزوم به مراحل درمانی مراجعه کنید.

آزمون پایانی نظری واحد کار دوم ؟

- ۱- در صورت احساس کسالت دمای بدن را در چه فاصله‌هایی اندازه می‌گیرید؟
 الف) هر ۲ ساعت ب) هر ۳ ساعت ج) هر ۴ ساعت د) هر ۶ ساعت
- ۲- خارش اکثراً بر اثر چه عاملی به وجود می‌آید؟
 الف) کهیر ب) خشکی پوست ج) عفونت‌ها د) داروها
- ۳- شایع‌ترین علل سرفه کدام است؟
 الف) سرماخوردگی ب) سیگار کشیدن ج) آسم د) هر سه
- ۴- شایع‌ترین علت بروز اسهال کدام است؟
 الف) ویروس‌ها ب) باکتری‌ها ج) قارچ‌ها د) سم موجود در مواد غذایی فاسد
- ۵- مهم‌ترین علامت کم‌خونی کدام است؟
 الف) تنگی نفس ب) رنگ پریدگی بیمار ج) تپش قلب د) خستگی
- ۶- درد پا اغلب به سبب وارد آمدن آسیب خفیف به کدام یک از قسمت‌های زیر ایجاد می‌شود؟
 الف) عضلات ب) رباط‌ها ج) تاندون‌ها د) هر سه
- ۷- کدام یک از جملات زیر غلط است؟
 الف) عفونت گوش کمتر باعث کاهش شنوایی می‌شود.
 ب) سر و صدای بیش از حد می‌تواند به گوش داخلی آسیب برساند.
 ج) چنانچه ترشحی به رنگ زرد مایل به سبز از گوشتان خارج می‌شود باید حتماً به پزشک مراجعه کنید.
- ۸- علت گرفتگی یا آبریزش بینی تحریک شدن مخاط بینی است.
- ۹- برای تسکین سردرد انجام دادن کدام یک از کارهای زیر مناسب‌تر است؟
 الف) در بین کار روزانه استراحت کنید. ب) در هوای آزاد تنفس کنید. ج) عضلات گردن و شانه را ماساژ دهید. د) هر سه
- ۱۰- با مشاهده‌ی کدام یک از علایم زیر در چشم باید به پزشک مراجعه کنید؟
 الف) قرمزی چشم ب) وارد شدن ضربه به چشم ج) تاری دید
 د) هر سه
- ۱۱- دردهای ناحیه‌ی کلیه با کدام یک از علایم زیر باید همراه باشد تا سریعاً به مرکز درمانی مراجعه کرد؟
 الف) تهوع و استفراغ ب) تب و لرز ج) دیدن خون در ادرار د) هر سه



آزمون پایانی عملی واحد کار دوم ؟

- ۱- تحقیق درباره‌ی وضعیت اسهال در جامعه:
 - با انجام تحقیق ساده‌ای به نکته‌های زیر پی برید:
 - اسهال در جامعه‌ی شما چه قدر شیوع دارد؟
 - اسهال در کودکان کمتر از ۵ سال شایع‌تر است بخصوص در کودکانی که با شیشه‌های تغذیه می‌شوند و کودکانی که علاوه بر شیر مادر غذاهای دیگر را نیز شروع کرده‌اند.
 - اسهال در فصل‌های بارانی شایع‌تر است.
 - اسهال می‌تواند به کم شدن آب بدن و سرانجام به مرگ بینجامد.
- کار خود را برای این تحقیق در ۵ مرحله سازماندهی کنید و نتیجه‌ی آن را گزارش دهید:
 - الف) ابتدا پاسخ این پرسش‌ها را بیابید:
 - افرادی را که به اسهال مبتلا شده‌اند بیابید (با بررسی کل مدرسه یا حتی فقط یک خانه).
 - کدام گروه سنی بیشتر مبتلا شده‌اند؟
 - مردم در کدام فصل بیشتر به اسهال مبتلا می‌شوند؟
 - آیا کسی از کودکان یا شیرخواران مبتلا به اسهال جان خود را از دست داده است؟
 - ب) چگونه اطلاعات را جمع‌آوری کنید?
 - با پرسیدن از هنرجویان دیگر در مدرسه
 - با پرسیدن از اعضای خانواده یا ساکنان منزل
 - با پرسیدن از همسایه‌ها
 - با پرسیدن از یک کارمند بهداشتی روستایی
 - ج) چگونه اطلاعات را ثبت کنید?
 - نموداری بسازید که نام بیماران، سن آن‌ها، ماه تقویمی و تعداد بیماران مبتلا به اسهال را نشان دهد.
 - د) از این اطلاعات چه می‌آموزید?
 - شیوع اسهال در جامعه.
 - گروه سنی خاصی که اسهال در آن‌ها شایع‌تر است.
 - فصلی که اسهال شایع‌تر است.
 - ه) براساس این اطلاعات چه کاری می‌توانید انجام دهید?
 - اطلاعات بیشتری درباره‌ی اسهال به دست بیاورید.
 - به دیگران بگویید.
 - راه کمک کردن به کودکان مبتلا به اسهال را یاد بگیرید.



واحد کار سوم

آشنایی با بیماری‌های شایع و اگیر و اصول پیشگیری

از آن‌ها





هدف‌های رفتاری: انتظار می‌رود، هنرجو پس از گذراندن این واحد کار بتواند به هدف‌های زیر دست یابد:

- ۱- عوامل به وجود آور ندهی بیماری های واگیر را نام ببرد.
 - ۲- علایم، راه های انتقال و پیشگیری از چند بیماری ویروسی شایع و مهم را شرح دهد.
 - ۳- علایم، راه های انتقال و پیشگیری از چند بیماری میکروبی شایع و مهم را توضیح دهد.
 - ۴- علایم، راه های انتقال و پیشگیری از چند بیماری انگلی شایع و مهم را بیان کند.
 - ۵- علایم، راه های انتقال و پیشگیری از یک بیماری قارچی شایع و مهم را شرح دهد.

۱. بیماری‌های قابل پیشگیری با واکسن را نام ببرید.

۲. چند بیماری را که از طریق ویروس منتقل می‌شود نام ببرید.

۳. راه‌های انتقال عمدۀ بیماری بیماری ایدز کدامند؟

۴. برای پیشگیری از ابتدا به عفونت انگلی کرمک چه اقدام‌هایی باید انجام شود؟

۵. در مورد بیماری ایدز کدام جمله صحیح است؟

الف) تشخیص آن با آزمایش خون است.

ب) از طریق هوا منتقل می‌شود.

ج) هردو

۶. علامت عمدۀ بیماری هپاتیت کدام است؟

الف) تب

ب) زردی

ج) کاهش وزن

د) درد بدن

۷. درباره‌ی بیماری کراز کدام عبارت صحیح است؟

الف) میکروب کراز در خاک وجود دارد.

ب) کراز از طریق زخم‌های آلوده منتقل می‌شود.

ج) بیماری کراز توسط واکسن قابل پیشگیری است.

د) همه‌ی موارد

مقدمه

از دهه‌ی ۱۳۷۰ علاقه‌مندی و استقبال از کنترل بیماری‌های واگیر به سبب برگشت بسیاری از بیماری‌های عفونی مانند مalaria و سل و بروز بیماری‌هایی چون ایدز به شدت افزایش یافته است.

بیماری‌های واگیر همان طور که از نامشان پیداست، بیماری‌هایی هستند که قابل انتقال از فرد به فرد یا از حیوان و محیط به انسان است و برخی از آنان قادرند اپیدمی^۱‌های بسیار وسیع و مرگ و میرهای زیادی را باعث شوند. برای مبارزه و کنترل این بیماری‌ها آنچه اهمیت دارد، شناخت علایم، راه‌های انتقال و پیشگیری از آن‌هاست و برای موفقیت در کنترل این دسته از بیماری‌ها لازم است مبارزه و پیشگیری از سطوح محیطی و از جامعه آغاز شود. چون پس از بروز بیماری و انتشار آن علاوه بر عوارضی که جبران ناپذیرند (از جمله معلولیت‌های دائم و مرگ و میرهای ناشی از آن‌ها) برای کنترل آن‌ها صرف هزینه و وقت و نیروی انسانی بسیاری لازم است. مجموعه‌ای که در پیش رو دارید با هدف آشنایی با مهم‌ترین و شایع‌ترین بیماری‌های واگیر تهیه شده است.

۱-۳- بیماری‌های واگیر

بیماری‌های واگیر بحسب عامل ایجادکنندهٔ آن به قارچ‌ها هستند مثل مalaria، کرم کدو، آسکاریس، شیپس، کچلی چند دسته‌ی عمدۀ تقسیم می‌شود:

بیماری‌هایی که عامل به وجود آورندهٔ آن‌ها انگل‌ها	در این واحد کار توضیح مختص‌ری درخصوص شایع‌ترین و مهم‌ترین بیماری‌هایی که عامل ایجاد آن ویروس‌ها هستند، مثل آبله مرغان، سرخک، هپاتیت، ایدز و ...،	بیماری‌هایی که عامل به وجود آورندهٔ آن‌ها باکتری‌ها هستند، مثل منزیت، سل، کزار، تب مالت و ...،
و		

توجه!

تعريف ویروس

ویروس‌ها کوچک‌ترین عامل عفونی بیماری‌زا هستند و برای زندگی به یک سلول کامل وابسته‌اند. آنتی‌بیوتیک‌ها که برای از بین بردن باکتری‌ها تهیه شده‌اند، بر روی ویروس‌ها مؤثر نیستند.

تعريف باکتری

موجوداتی ذره‌بینی‌اند که شکل ثابتی دارند و به تنها یی قادر به ادامه زندگی‌اند و می‌توانند در بدن انسان ایجاد بیماری کنند. (همه‌ی باکتری‌ها الزاماً بیماری‌زا نیستند)

تعريف قارچ

یکی از عوامل بیماری‌زا هستند و باعث بروز بعضی از بیماری‌ها در انسان می‌شوند که قابل انتقال از فردی به فرد دیگر است مثل کچلی.

تعريف انگل

انگل به موجود زنده‌ای اطلاق می‌شود که در داخل یا خارج بدن موجود دیگری ریست می‌کند و نیازهای زندگی خود را از وجود آن حیوان تأمین می‌کند.



۱-۳-۱- بیماری‌های ویروسی

- آبله مرغان: آیا تا کنون بیمار مبتلا به آبله مرغان را دیده‌اید؟



تب، ترشح بینی، سرفه و برجستگی‌های سرخرنگ با مرکزی سفید و یا سفید متمایل به آبی روی مخاط دهان دیده می‌شود. در سومین تا هفتمین روز بعد از شروع تب لکه‌های قرمز مشخص بیماری، اول روی صورت و سپس در تمام نقاط بدن، ظاهر شده، ۴ تا ۷ روز ادامه خواهد داشت. عالیم سرخ در نوزادان و بزرگسالان شدیدتر از کودکان است. برخی از مهم‌ترین عوارض بیماری سرخ عبارت‌اند از: عفونت ریه، عفونت گوش میانی و ورم معزی.

روش انتقال

- ۱- از راه هوا به کمک انتشار قطره‌های آب دهان،
- ۲- تماس مستقیم با ترشحات بینی و یا گلوی افراد آلوده،
- ۳- اشیایی که به تازگی به ترشحات بینی یا گلوی افراد آلوده شده‌اند.

قابلیت انتقال سرخ کمی قبل از شروع تب تا ۴۵ روز بعد از ظهور دانه‌های پوستی ادامه دارد.

بهترین راه پیشگیری، ایمن‌سازی است. واکسن سرخ در دو نوبت در یک سالگی و در ۴-۶ سالگی تزریق می‌شود. سایر راه‌های پیشگیری شامل جدا نمودن بیماران از دیگران یک تا دو روز قبل از بروز دانه‌ها و تا یک هفته بعد از بروز آن‌ها، استفاده از وسایل شخصی مثل لیوان، قاشق و ... بیمار است.

آبله مرغان بیماری ویروسی واکیر است که معمولاً با دانه‌های قرمز (تاولی یا چرکی که بعد از یکی دو روز خشک و بوسه‌ای می‌شوند)، تب، کوفتگی بدن، درد مفاصل و دردهای دیگر در بدن بروز می‌کند.

یکی از مشخصات بیماری آن است که دانه‌های قرمز در تنہ بسیار بیشتر از صورت یا پاها هستند و فرد بعد از ابتلا به آن، دیگر چهار این بیماری نمی‌شود.

آبله مرغان از سه طریق منتقل می‌شود:

- ۱- از طریق هوا مثل عطسه و سرفه و صحبت کردن
- ۲- از طریق تماس با ترشحات دانه‌ها
- ۳- از طریق لوازم بیمار دوره‌ی واکیری معمولاً از یک تا دو روز قبل و حداقل تا ۵ روز بعد از ظهور اولین دانه‌ها ادامه دارد.

کسانی که مبتلا به آبله مرغان شده‌اند، احتمال دارد در بزرگسالی به نوع شدیدتر آن مبتلا شوند.

جداسازی بیماران از سایرین از زمان بروز دانه‌ها (یک تا دو روز قبل از پیدایش دانه‌ها) تا یک هفته بعد از آن یکی از کارهای پیشگیری است.

- سرخک: آیا تا کنون به شما توصیه شده است که از تزدیک شدن به فرد مبتلا به سرخک خودداری کنید؟ چرا؟
- سرخک بیماری ویروسی حاد واکیردار است که با عالیم

توجه!

افرادی که یک بار به بیماری سرخک مبتلا شده‌اند یا واکسن زده‌اند تا آخر عمر به این بیماری مبتلا نخواهند شد.

ماهه‌ی اول بارداری رخ دهد، باعث آسیب شدید در نوزادان و نقایص مادرزادی در آنان می‌شود. به این سبب زنان در برابر این بیماری واکسینه می‌شوند. اما باید دقت کرد که زنان تا سه ماه بعد از واکسیناسیون سرخجه نباید باردار شوند، زیرا واکسن (ویروس زنده‌ی ضعیف شده) برای جنین خطرناک است. بیماری سرخجه با زدن واکسن قابل پیشگیری است.

● سرخجه: آیا تا کنون شما یا یکی از اعضای خانواده‌تان به بیماری سرخجه مبتلا شده‌اید؟ سرخجه بیماری ویروسی واگیر است که از لحاظ عالیم شبیه بیماری سرخک است اما طول مدت بیماری بسیار کوتاه‌تر است و معمولاً پیش از سه روز طول نمی‌کشد. خطر بیماری سرخجه آن است که اگر در دوران بارداری زنان به خصوص سه



بیشتر بدانید

واکسیناسیون سرخجه در دو نوبت در دوازده ماهگی و ۱-۴ سالگی همراه واکسن‌های اوریون و سرخک (MMR) انجام می‌شود.



● سرماخوردگی: شما حتماً در طول زندگیتان سرما خورده‌اید، آیا هیچ فکر کرده‌اید علت سرماخوردگی چیست؟

سرماخوردگی یک بیماری ویروسی است که ناحیه‌ی بینی، گلو و حلق را درگیر می‌کند و به شکل آبریزش بینی و چشم، عطسه، ناراحتی در گلو، احساس سرما و بی‌قراری بروز می‌کند. طول مدت سرماخوردگی ۲ تا ۷ روز است. تمام افراد در طول سال یک تا شش بار سرما می‌خورند.



مبانی بیماری‌های واگیر و غیر واگیر و اصول پیشگیری از آن‌ها

هپاتیت بیماری ویروسی واگیر است که انواع مختلف دارد، هپاتیت B، هپاتیت A، هپاتیت C.

علامت عده و مهم هپاتیت‌ها رنگ زردی است که زودتر از همه در سفیدی چشم ظاهر می‌شود.

هپاتیت علایمی مثل تب، لرز، سردرد، ضعف عمومی و دردهای گوناگون دارد.

راه‌های انتقال هپاتیت A از طریق آب آلوده، مواد غذایی آلوده، یا انتقال مستقیم (تماس مستقیم مثل دست دادن، بوسیدن و ...) از فرد بیمار به فرد سالم است. هپاتیت A با این‌که اغلب به شکل حاد بروز می‌کند ولی به بیماری مزمن کبدی تبدیل نمی‌شود.

هپاتیت B و C از طریق به کار بردن سرنگ، سوزن و لوازم غیراستریل در کارهای پزشکی و دندانپزشکی، سوراخ کردن گوش و ختنه‌ی غیربهداشتی، از طریق مادر آلوده به نوزاد و از طریق ترشحات آلوده مثل بزاق انتقال می‌یابد.

در هپاتیت B و C خطر تبدیل به بیماری مزمن کبدی و سلطان کبد وجود دارد.

برای پیشگیری از ابتلا به هپاتیت نوع A، شستن دست‌ها قبل از غذا خوردن بعد از رفتن به توالت، جدا کردن وسایل فرد بیمار و ضد عفونی آن‌ها می‌تواند مؤثر باشد.

هپاتیت B را می‌توان با واکسن پیشگیری کرد که در سه نوبت تزریق می‌شود.

برای پیشگیری از هپاتیت C باید به نکته‌های زیر توجه کرد:

- استفاده از کاندوم در تماس‌های جنسی
- اجتناب از تزریق خون در موقع غیرضروری
- استریل کردن سرنگ و کلیه‌ی وسایل تیز و بربند (در تزریقات، سوراخ کردن گوش، ختنه، دندانپزشکی‌ها و غیره)
- استفاده کردن از سرنگ استریل (یک‌بار مصرف) و وسایل شخصی خود مانند تیغ و مساواک و

● اوریون: آیا تا کنون اتفاق افتاده که یکی از دوستانتان به علت ابتلا به اوریون از آمدن به مدرسه منع شده باشد؟

سرماخوردگی از طریق تماس مستقیم با ترشحات بینی، چشم و دهان و انتقال غیرمستقیم از طریق دست و وسایل آلوده‌ی شخص بیمار انتقال پیدا می‌کند.

دوره‌ی واگیری از ۲۴ ساعت قبل از شروع علایم بالینی تا ۵ روز بعد از آن است.

با رعایت بهداشت فردی مثل شستن دست‌ها و پوشاندن دهان و بینی هنگام عطسه و سرفه و استفاده نکردن از وسایل شخصی دیگران مثل قاشق و لیوان و ... می‌توان از انتقال بیماری پیشگیری کرد.

● آنفلوآنزا: حتی در طول فصل‌های سرد سال، خود یا اطرافیانتان به آنفلوآنزا دچار شده‌اید؟ آیا می‌توانید علایم عمدی آن را نام ببرید؟

آنفلوآنزا بیماری ویروسی واگیر است. ویژگی آن دوره‌ی پنهانی کوتاه مدت و در بی آن تب، سرفه، آبریزش بینی، سردرد و درد عضلات است.

آنفلوآنزا از طریق عطسه، سرفه، سخن گفتن، از فرد بیمار به فرد سالم منتقل می‌شود و از عوارض مهم آن، سینه پھلوست.

دوره‌ی واگیری آن تا یک هفته بعد از شروع بیماری ادامه دارد.

بهترین روش پیشگیری از آنفلوآنزا، واکسیناسیون است که فقط در افرادی که در معرض خطرند مثل افراد مسن و کارکنان پزشکی و پرستاری توصیه می‌شود. جداسازی بیمار و رعایت نکته‌های بهداشتی (استفاده از وسایل شخصی، پوشاندن دهان و بینی و شستن دست‌ها) نیز در پیشگیری از بیماری مؤثر است.

● هپاتیت‌های ویروسی: به نظر شما مهم‌ترین علامت بیمار مبتلا به هپاتیت چیست؟



دهد، به طوری که گلbul های سفید نتوانند آن‌ها را از بین ببرند. فرد آلوده به ویروس اچ. آی. وی چندین سال بدون علامت و به ظاهر سالم است ولی پس از مدتی (چند سال) علامت دار شده، دچار بیماری ایدز می‌شود. در ابتدای آلودگی به این ویروس ممکن است فرد دچار علایمی مثل آنفلوآنزا شده که بعد از مدت کوتاهی خود به خود خوب می‌شود. گاهی ویروس از راه خون به مغز می‌رود و سلول‌های مغزی را نابود می‌کند. این افراد ممکن است دچار اسهال‌های طولانی مدت، کاهش وزن زیاد، تب‌های طولانی بدون دلیل خاص، ضعف و تحلیل بدن شوند که نهایتاً نیز منجر به مرگ‌شان می‌شود. در تمام مدت بی‌علامتی، فرد می‌تواند بیماری را به دیگران منتقل کند.

- راه‌های انتقال ویروس اچ. آی. وی
- (۱) تماس جنسی بدون استفاده از محافظت با فرد آلوده به ویروس،
 - (۲) استفاده از سرنگ مشترک (با فرد آلوده) در زمان مصرف مواد مخدر در معتادان تزریقی،



اوریون بیماری ویروسی و اگیر است که با تب، ورم و درد یک یا چند غده‌ی بزاقي (غدد بزاقي غددی هستند که در داخل دهان باعث ترشح آب دهان می‌شوند) در قسمت بنگوش، بروز می‌کند. مهم‌ترین عارضه‌ی بیماری ورم بیضه است. تعداد کمی از مبتلایان ممکن است عقیم شوند.


اوریون از طریق تماس مستقیم با ترشحات دهان و بزاقي فرد آلوده منتقل می‌شود.

دوره‌ی و اگیری اوریون از یک روز قبل تا سه روز بعد از ورم غده‌های بزاقي است.

اوریون را می‌توان به کمک زدن واکسن پیشگیری کرد که همراه واکسن سرخک و سرخجه در دو نوبت در یک سالگی و ۶-۴ سالگی تزریق می‌شود. راه‌های دیگر پیشگیری جداسازی بیمار و وسائل شخصی او در دوران سرایت بیماری یعنی یک روز قبل تا سه روز بعد از ورم غده‌های بزاقي است.

● /ایدز: آیا فرد مبتلا به ایدز^۱ را دیده‌اید؟ به نظر شما فرد چگونه به ایدز مبتلا می‌شود؟

ایدز (یا آلودگی به ویروس اچ. آی. وی) بیماری ویروسی است که در ۲۰ سال اخیر شناخته شده است. ویروس ایدز نوعی ویروس خطرناک است که می‌تواند خود را تغییر شکل



- (۳) تزریق خون آلوده، سوراخ کردن گوش با وسائل آلوده، استفاده از تیغ آلوده در آرایشگاه‌ها،
- (۴) از مادر آلوده به نوزاد در زمان حاملگی، زایمان و شیردهی.



توجه!



- ویروس اچ. آی. وی از چه راه‌هایی منتقل نمی‌شود؟
- ارتباطات عادی اجتماعی
- دست دادن، بوسیدن و در آغوش گرفتن، سرفه و عطسه
- استفاده از استخر، توالت عمومی و وسایل نقلیه‌ی عمومی
- استفاده از رختخواب و ظرف غذای مشترک
- مگس و سایر حشرات و حیوانات

از آنجا که ایدز درمان قطعی ندارد بنابراین پیشگیری از آن بسیار مهم است. با در نظر گرفتن راه‌های انتقال اصول (در تزریقات، سوراخ کردن گوش، ختنه، دندانپزشکی‌ها و غیره) پیشگیری مشخص می‌شود.

- ضدعفونی کردن سرنگ و کلیه‌ی وسایل تیز و برنده (در تزریقات، سوراخ کردن گوش، ختنه، دندانپزشکی‌ها و غیره)
- عدم استفاده از سرنگ مشترک و وسایل شخصی دیگران مانند تیغ و مسوک و
- اجتناب از مصرف مواد مخدر به دلیل آثاری که بر قضاوت فرد می‌گذارد و او را به سمت استفاده از سرنگ مشترک و کارهای خلاف، سوق می‌دهد.
- ^۴ پیشگیری از انتقال از راه مادر به نوزاد:
- زن آلوده به ویروس اچ. آی. وی نباید باردار شود. در صورت وقوع حاملگی زن آلوده باید تحت درمان قرار گیرد.

۱) پیشگیری از انتقال از راه تماس جنسی:

- نداشتن تماس جنسی خارج از محدوده‌ی ازدواج و استفاده از کاندوم در موارد مشکوک
- ^۲ پیشگیری از انتقال از راه تزریق خون:
- اجتناب از تزریق خون در موقع غیر ضروری
- آزمایش همه‌ی خون‌های اهدایی به سازمان انتقال خون از نظر آلودگی به این ویروس

۳) پیشگیری از انتقال از طریق آسیب‌های پوستی:

بیشتر بدانید



تا اواخر سال ۱۳۸۲ (دسامبر ۲۰۰۴) ۲۴-۴۱ میلیون نفر در جهان آلوده به ایدز بودند که بیش از ۹۰ درصد آلوهه‌شدگان جدید متعلق به کشورهای در حال توسعه است. در آسیا در هر دیقه ۵ فرد جوان به این ویروس آلوده می‌شوند. روزانه ۱۴۰۰۰ مورد آلودگی در سال ۲۰۰۲ رخداده است که حدود ۵۰ درصد آن‌ها بین ۱۵ تا ۲۴ سال دارند. (گزارش سازمان بهداشت جهانی و UNAIDS - ۲۰۰۴ میلادی)

۱ تا ۳ فعالیت عملی

- ۱- تحقیق کنید کدام یک از افراد خانواده، فامیل، دوستان یا آشنایان شما به یک یا چند بیماری ویروسی مبتلا شده‌اند؟ بعد جدول زیر را پر کنید و در کلاس گزارش دهید.
- ۲- از افراد بالای ۵۰ سالی که می‌شناسید سوال کنید که آیا به بیماری‌های ویروسی دچار شده‌اند؟ این سوال هارا از افراد کمتر از ۲۰ سال نیز بکنید و نتیجه را با هم مقایسه کنید و در کلاس گزارش دهید. به نظر شما وضع بهداشت از گذشته تاکنون چه تغییری کرده است؟
- ۳- به گروه‌های ۴ یا ۵ نفری تقسیم شوید و هر گروه عالیم یکی از بیماری‌های فوق را در کلاس نمایش دهد و نوع بیماری را از سایر هنرجویان سوال کند.

نام فرد	سن بیمار	نام بیماری	سن فرد در زمان بیماری	علایم بیمار	طول مدت بیماری	اقدام‌های انجام شده برای بهبود
---------	----------	------------	-----------------------	-------------	----------------	--------------------------------

بدن را مبتلا کند، ولی بیشتر از همه ریه‌ها را درگیر می‌کند.
دسته‌ای از بیماری‌ها هستند که عامل ایجاد‌کننده‌ی آن‌ها انواع راه انتقال بیماری سل تقریباً همیشه از راه تنفس است (از طریق سرفه، عطسه و صحبت کردن).
بسیار زیادی از میکروب‌ها و باکتری‌ها هستند. در این قسمت مهم‌ترین بیماری‌های میکروبی توضیح داده می‌شود:
● منزیت: منزیت بیماری واگیری است که با عالیم سردرد شدید، استفراغ و سفت شدن گردن شروع می‌شود و در مدت چند ساعت بیمار را به حالت اغماء می‌برد.
راه انتقال این بیماری از طریق تماس با ترشحات بینی و حلق بیمار مانند عطسه و سرفه است. بنابراین بهترین راه قفسه‌ی سینه، تب، کاهش اشتها، کاهش وزن، بی‌حالی، تعریق شبانه، خستگی زودرس و ضعف عمومی است.



بیمار تا زمانی که درمان نشده باشد می‌تواند بیماری را

منتقل کند. دو هفته بعد از شروع درمان، دیگر فرد نمی‌تواند

۲-۱-۳- بیماری‌های میکروبی: بیماری‌های میکروبی دسته‌ای از بیماری‌ها هستند که عامل ایجاد‌کننده‌ی آن‌ها انواع بسیار زیادی از میکروب‌ها و باکتری‌ها هستند. در این قسمت مهم‌ترین بیماری‌های میکروبی توضیح داده می‌شود:

● منزیت: منزیت بیماری واگیری است که با عالیم سردرد شدید، استفراغ و سفت شدن گردن شروع می‌شود و در مدت چند ساعت بیمار را به حالت اغماء می‌برد.
راه انتقال این بیماری از طریق تماس با ترشحات بینی و حلق بیمار مانند عطسه و سرفه است. بنابراین بهترین راه پیشگیری، جداسازی بیمار، ضدغوفونی و سایل شخصی او و استفاده از پوشش دهان و بینی (ماسک) است.
اگر در دو روز اول ابتلا به این بیماری، درمان دارویی شروع شود، بیمار بهبود می‌یابد.

افرادی که در تماس نزدیک با این بیماران اند نیز باید درمان شوند تا از سرایت به آن‌ها جلوگیری شود.

● سل: آیا می‌دانید یک سوم مردم دنیا (حدود دو میلیارد نفر) آلوده به میکروب سل اند؟ به نظر شما راه انتقال بیماری کدام است؟ آیا بیمار مبتلا به سل را دیده‌اید؟

سل بیماری عفونی است که می‌تواند تقریباً تمام اعضای



مبانی بیماری‌های واکیر و غیر واکیر: آشنایی با بیماری‌بای شایع واکیر و اصول پیشگیری از آن‌ها

میکرب سل را به سایرین انتقال دهد. گاهی اوقات میکرب سل از راه خون به سایر بافت‌های بدن مانند استخوان‌ها، مفصل‌ها و... سراحت می‌کند و ممکن است باعث مرگ بیمار شود.

پیشگیری:

با انجام اقدام‌های زیر، می‌توان خطر انتقال عفونت را تا حدی کاهش داد:

- (الف) بهبود وضع بهداشت در جامعه و محیط زندگی
- (ب) افراد این واکسن در بدو تولد تلقیح می‌شود.

بیشتر بدانید



امروزه در بین بیماری‌های میکروبی در تمام دنیا سل شایع‌ترین عامل کشنده‌ی بزرگسالان (حتی بیشتر از ایدز و مalaria) است.

تا کنون یک سوم جمعیت جهان (حدود ۲ میلیارد نفر) به میکرب سل آلوده شده‌اند و سالانه ۱۰ میلیون مورد جدید بروز می‌کند. اکنون، بیش از ۲۰ میلیون نفر به بیماری سل مبتلا هستند.

- در هر ثانیه یک نفر به باکتری سل آلوده می‌شود.
- در هر ۴ ثانیه یک نفر به بیماری سل مبتلا می‌شود.
- در هر ۱۰ ثانیه یک نفر بر اثر ابتلا به سل می‌میرد.

• تب مالت: آیا درباره‌ی بیماری‌های مشترک بین انسان و حیوان چیزی می‌دانید؟ تب مالت یکی از این بیماری‌هاست. تب مالت بیماری میکروبی است که از حیواناتی مثل گاو، گوسفند، بز، خوک، اسب و سگ به انسان منتقل می‌شود. فردی که با حیوانات در تماس مستقیم باشد بیشتر در معرض خطر ابتلا به این بیماری است.

این بیماری به شکل تب‌های نامنظم همراه با عرق فراوان و درد مفاصل بروز می‌کند.

• ترخُم: آیا تا کنون دچار عفونت چشم شده‌اید؟ چه مشکلی داشتید؟

تراخم بیماری واکیر و مزمنی است که باعث التهاب و زخم چشم می‌شود. این التهاب یا خود به خود خوب می‌شود

و حیوان بازی می‌داند. تب مالت بیماری میکروبی است که از حیواناتی مثل گاو، گوسفند، بز، خوک، اسب و سگ به انسان منتقل می‌شود. فردی که با حیوانات در تماس مستقیم باشد بیشتر در معرض خطر ابتلا به این بیماری است.

این بیماری به شکل تب‌های نامنظم همراه با عرق فراوان و درد مفاصل بروز می‌کند.

تب مالت به صورت‌های زیر انتقال می‌یابد:

(الف) تماس با مواد آلوده‌ی حیوان مثل بافت‌ها و خون

(ب) از طریق مواد غذایی مثل شیر، پنیر و ماست آلوده

مبانی بیماری‌های واکیر و غیر واکیر و اصول پیشگیری از آن‌ها

باعث انتقال بیماری می‌شود. مگس‌های آلوده هم در انتشار آن نقش دارند.

تراخم با بدی کیفیت زندگی مرتبط است. بیماری در شرایط فقر، جهل، بدی بهداشت فردی، بی‌سوادی و بدی مسکن زیاد می‌شود و اگر شرایط زندگی بهبود یابد رو به پسرفت می‌گذارد.

و یا به سوی رخم ملتحمه پیشرفت می‌کند و سبب انحراف مژه‌ها به داخل چشم یا برگشتگی لبه‌ی پلک به داخل چشم می‌شود.

رخم ناشی از مژه که به دنبال خراشیدگی آن ایجاد می‌شود در نهایت به کاهش بینایی و احیاناً کوری منجر می‌شود.

تماس مستقیم با ترشحات چشم افراد آلوده و تماس غیرمستقیم از طریق لوازم آلوده مثل حوله، سرمه و انگشت

بیشتر بدانید

احتمالاً در سراسر جهان ۱ تا ۹ میلیون نفر به علت تراخم نایین شده‌اند و تعداد بسیار بیشتری هم دچار کاهش نسبی بینایی هستند. این بیماری از نظر کاهش شدید توان کاری افراد و از کارافتادگی‌های شدید بار سنگینی بر دوش جامعه است.

داده شود. با داشتن رخم‌های عمیق، کثیف، وسیع و گذشنی بیش از ۵ سال از تزریق واکسن کراز، لازم است واکسن زده شود.

کراز در نوزادان می‌تواند از طریق بندناف که با وسیله‌ای آلوده بریده شده باشد و یا هنگامی که بر روی زخم آن خاک، خاکستر یا تپله‌ای گاو بگذارند، ایجاد شود.

بیماری کراز با واکسیناسیون قابل پیشگیری است. واکسن کراز همراه با واکسن دیفتری و سیاه سرفه به اسم واکسن سه گانه (ثلاث) در ۲ ماهگی، ۴ ماهگی، ۶ ماهگی، ۱۸ ماهگی و ۴-۶ سالگی به کودکان تزریق می‌شود.

برای محافظت زنان بارداری که واکسن نزدیک و حفظ نوزاد او، دو واکسن کراز به فاصله‌ی یک ماه به مادر تزریق می‌شود.

برای پیشگیری از کراز، پس از ایجاد رخم باید همه‌ی رخم‌ها هر چه زودتر با دقت تمیز و شسته شوند و اجسام خارجی، خاک، گرد و غبار و بافت‌های مرده‌ی رخم برداشته شود.

● کنز/ز: آیا بیمار مبتلا به کراز را دیده‌اید؟ به نظر شما کراز چه ارتباطی با رخم دارد؟

کراز بیماری میکربی است که با علایمی مثل سفت شدن ماهیچه‌ها، به خصوص ماهیچه‌های جونده، ماهیچه‌های صورت، ماهیچه‌های گردن و پشت و ماهیچه‌های شکم و پاهای بروز می‌کند. سفت شدن ماهیچه‌های تنفسی موجب اشکال تنفسی می‌شود که می‌تواند به مرگ بیمار بینجامد.



میکرب کراز در خاک است و از طریق رخم‌هایی که به این میکرب آلوده شده باشد به انسان منتقل می‌شود. بنابراین باید همه‌ی رخم‌ها هر چه زودتر و با دقت تمیز و شسته و شو



بیشتر بدانید


بیماری کزار در سراسر جهان روى مى دهد. با وجود واکسنی مؤثر، هر سال لااقل یک میلیون نفر در سطح جهان از این بیماری مى میرند که نصف این تعداد، نوزادان هستند.

ورم و قرمزی لوزه‌ها و ترشح سفید رنگ روی آن‌ها، ورم و قرمزی زبان است. این بیماری یکی از شایع‌ترین عفونت‌ها در کودکان است.

درمان این بیماری با پنی‌سیلین است که به مدت ده روز و به مقدار کافی به صورت خوراکی یا تزریقی تجویز می‌شود. چنان‌چه بیمار به موقع و کافی درمان نشود، ممکن است به تب روماتیسمی حاد دچار شود که ۶-۲ هفته بعد از گلودرد چرکی ظاهر می‌شود. بیماری تب روماتیسمی باعث اختلال در دریچه‌های قلب می‌شود و بیشتر افراد ۱۵-۵ ساله را گرفتار می‌کند.

افرادی که دچار تب روماتیسمی شده‌اند باید تا سال‌ها و گاهی تا آخر عمر، ماهانه یک آمپول پنی‌سیلین تزریق کنند.

• گلودرد چرکی (فارنژریت): بیماری میکربی است که در ناحیه‌ی گلو و حلق و قسمت‌های فوقانی دستگاه تنفس، ایجاد بیماری می‌کند. اصطلاحاً به این بیماری آثرین هم گفته می‌شود. علایم این بیماری گلودرد، تب، بی‌اشتهاای، ضعف،



بیشتر بدانید

تنها میکربها عامل گلودرد نیستند بلکه ویروس‌ها هم می‌توانند باعث گلودرد شوند. در گلودرد ویروسی علاوه بر تب، بی‌اشتهاای، ضعف، گلودرد، ورم و قرمزی لوزه‌ها و زبان، بیمار دچار آبریزش بینی، عطسه و سرفه هم می‌شود. این نوع گلودرد درمان خاصی لازم ندارد. شست‌وشوی مکرر گلو با محلول آب و نمک و مصرف داروهای ضد درد و تب برای تسکین درد مؤثر است.

• ذات‌الریه: ذات‌الریه چیست و به نظر شما چه علایم بیماری عبارت است از لرز ناگهانی، تب، تنگی نفس، تنفس سریع، سرفه همراه خلطی قرمز رنگ. این بیماری از راه‌های زیر می‌تواند انتقال پیدا کند:

مشکلاتی می‌تواند برای بیمار به وجود آورد؟ ذات‌الریه بیماری میکربی است که باعث عفونت می‌شود.


مبانی بیماری‌های واکیر و غیر واکیر و اصول پیشگیری از آن‌ها

جمعیت در محل زندگی، به خصوص در مؤسسات شباهنروزی، سر بازخانه‌ها و خوابگاه‌ها باید جلوگیری کرد.

- ۱- از طریق ترشحات دهان و بینی به‌طور مستقیم
- ۲- از طریق وسائل آسوده به‌طور غیرمستقیم
برای پیشگیری از این بیماری در صورت امکان از تراکم

فعالیت عملی ۴

هنرجویان به گروه‌های ۵ یا ۶ نفری تقسیم شوند، یک نفر نقش فرزند مبتلا به سل و یک نفر نقش مادر او را بازی کند. فرزند علایم بیماری را به مادر بگوید و بقیه‌ی هنرجویان مادر را راهنمایی کنند که فرزند او ممکن است مبتلا به چه بیماری باشد و چه کار کند تا درمان شود.



کرم بالغ در مدت ۱۰ تا ۱۲ روز رشد خود را
کامل می‌کند و برای چند ماه زندگی خواهد کرد.

**۳-۱-۳- بیماری‌های انگلی و قارچی : انگل‌ها و
قارچ‌ها** دسته‌ای از عوامل بیماری‌زا هستند که تمام یا قسمتی از زندگی خود را در بدن انسان بسر می‌برند و در بدن ایجاد بیماری می‌کنند. در این قسمت از پوادمان با مهم‌ترین و شایع‌ترین بیماری‌های انگلی و قارچی آشنا می‌شوید.

● آسودگی به کرم کدو

هیچ‌گاه دچار دردهای شکم و بی‌اشتهاهی‌های طولانی شده‌اید؟ فکر می‌کنید علت آن چه بوده است؟ کرم کدو گروهی از کرم‌های که بدن آن‌ها از تعداد زیادی بند تشکیل شده که گاهی طول آن به چندین متر نیز می‌رسد. این کرم‌ها قسمتی از زندگی خود را در بدن انسان می‌گذرانند. میزان دیگر این انگل گاو و خوک است. در آسودگی به کرم‌های کدو، انسان دچار درد شکم، بی‌اشتهاهی و سوء‌هاضمه و اسهال می‌شود.

راه انتقال : تخم کرم کدو در بند آخر کرم قرار دارد و همراه مدفوع از بدن خارج می‌شود. اگر دفع مدفوع در محلی نامناسب باشد، گاوها و خوک‌ها همراه علف تخم‌ها را می‌خورند و تخم‌ها به داخل بدن آن‌ها می‌رود و در عضلات حیوان مستقر می‌شود. انسان نیز با خوردن گوشت آسوده (مثل گوشت نیم بخشی گاو آسوده)، خوردن سبزی‌های آسوده به تخم کرم و یا انتقال از راه دست‌های آسوده، به بیماری مبتلا می‌شود.

پیشگیری : برای پیشگیری از این آسودگی‌ها لازم است افراد آسوده درمان شوند، چون آن‌ها تخم انگل را با مدفوع خود دفع کرده، باعث آسودگی محیط و انتقال آن به دیگران می‌شوند.

پختن کامل گوشت و غذا و ضد عفنونی سبزی‌ها و رعایت بهداشت فردی مثل شستن دست‌ها با آب و صابون قبل از خوردن غذا و بعد از رفتن به توالت، نیز در پیشگیری مؤثرند.

● آسودگی به کرم آسکاریس : آیا می‌دانید که شایع‌ترین آسودگی کرمی انسان آسودگی به کرم آسکاریس است؟ کرم آسکاریس کرمی صورتی و بلند است و اغلب در روده‌ی انسان زندگی می‌کند. آسودگی به این کرم در انسان باعث تهوع، درد شکم و سرفه می‌شود و در کودکان ایجاد بی‌اشتهاهی، لاغری، بزرگی شکم، بی‌قراری در خواب و ناراحتی عصبی می‌کند. آسکاریس شایع‌ترین آسودگی کرمی انسان است.



مبانی بیماری‌های واکیر و غیر واکیر و اصول پیشگیری از آن‌ها

به سفید روشن است و طول آن حدود یک سانتی‌متر است. آلدگی به این نوع کرم باعث علایمی مثل دندان قروچه، خارش مقعد، درد شکمی، اسهال، دل‌پیچه، سردرد، رنگ پریدگی و بی‌اشتهاجی می‌شود.

راه انتقال: کرم‌های ماده‌ی بالغ در روده‌ی بزرگ انسان زندگی می‌کنند و در اواخر شب از مخرج خارج شده، در ناحیه‌ی اطراف مقعد تخم‌گذاری می‌کنند. به همین دلیل کودکان مبتلا به کرمک شب‌ها دچار سوزش و خارش مقعد، بی‌قراری و بی‌خوابی می‌شوند. بر اثر خاراندن مقعد، تخم انگل زیر ناخن‌ها و به سر انگشتان کودکان چسبیده، از طریق انگشتان آلدده وارد دهان می‌شوند.

تخم انگل از طریق غذا و ظروف آب، لباس‌ها و وسایل خواب آلدده نیز می‌تواند منتقل شود. در فضای اتاق‌ها و توالات‌های محل سکونت افراد آلدده، تعداد زیادی تخم اکسیور وجود دارد.

پیشگیری: بهترین روش جلوگیری از آلدگی به انگل، رعایت بهداشت در کودکان و درمان افراد آلدده است. شست و شوی ناحیه‌ی مقعد به‌طور مرتب و به‌خصوص صبح زود پس از برخاستن از خواب، کوتاه کردن ناخن‌ها، شستن دست‌ها با آب و صابون به‌خصوص بعد از دفع و قبل از غذا خوردن و ضدغوفونی کردن لباس‌ها و وسایل آلدده، به پیشگیری از انتشار بیماری کمک می‌کند.


برای جلوگیری از انتقال بیماری بین اعضای خانواده‌ی بیمار، بهتر است همه‌ی اعضای خانواده به‌طور دسته‌جمعی هم زمان طبق دستور پزشک، از داروی ضد انگل استفاده کنند.

● آلدگی به انگل ژیاردها

آیا رعایت بهداشت فردی در پیشگیری از این بیماری مؤثر است؟ چگونه؟

ژیاردها انگلی تک سلولی است که در مدفوع به صورت توده بوده، بیشتر روده‌ی باریک انسان را مبتلا می‌کند. علایم بیماری عبارت است از: اسهال طولانی مدت، دفع چربی در مدفوع، دل‌پیچه، پف آلدگی (ورم در ناحیه‌ی پلک‌ها و صورت)، خستگی و کاهش وزن.

راه انتقال: انسان تخم کرم را با مدفوع دفع می‌کند. این تخم‌ها در محیط بیرون زنده می‌ماند و از طریق آب یا خوردن میوه و سبزی‌های آلدده، انگشتان آلدده به خاک یا خوردن خاک آلدده به مدفوع انسان، وارد بدن می‌شود. تخم در بدن انسان رشد می‌کند و تبدیل به کرم می‌شود.



بیشترین آلدگی به این کرم در کودکان است و آن‌ها مهم‌ترین عامل انتشار بیماری در جامعه‌اند. کرم‌های آسکاریس می‌توانند دور هم جمع شوند و به صورت گلوله‌ای مسیر روده را بینندند.

برای پیشگیری از آلدگی به آسکاریس دفع بهداشتی مدفوع انسان، تهیه‌ی آب آشامیدنی سالم، استفاده از توالت بهداشتی و رعایت بهداشت فردی بسیار مهم است. درمان بیماران با دارو امکان‌پذیر است.

● آلدگی به کرمک (اکسیور): کرمک، زرد مایل





● **شپش**

آبا با فردی که دچار خارش در سر و بدن است مواجه شده‌اید؟ به نظر شما چه مشکلی ممکن است داشته باشد؟



شپش حشره‌ای بی‌بال است که در مناطق پر جمعیت و دارای سطح بهداشت پایین، بیشتر دیده می‌شود. شپش سه نوع است: شپش سر، شپش بدن و شپش عانه^۱ (شپشک).

شپش سر در موهای سر، ابرو و مژه‌ها و شپش بدن، در لباس‌ها به خصوص در طول سطح داخلی درزهای لباس‌ها زندگی می‌کند. شپشک نیز معمولاً در ناحیه‌ی شرمگاهی زندگی می‌کند.

شپش سر تخم خود را نزدیک پوست سر، درست روی ریشه مو می‌چسباند. شپش سر چسبنده است و با شامپو، صابون و شانه زدن از مو جدا نمی‌شود. علامت آلودگی به شپش سر خارش شدید و وجود دانه‌های سفید چسبیده به موست که ممکن است به زخم شدن منجر شود.

راه انتقال: شپش سر و بدن از راه مستقیم یعنی حرکت شپش از بدن مبتلایان و وارد شدن به بدن افراد سالم و یا راه غیر مستقیم یعنی از طریق وسایل شخصی مثل شانه، برس، روسربی یا مقنعه، لباس‌ها، وسایل حمام، سلمانی و ... منتقل می‌شود.

راه‌های پیشگیری: ۱- لباس‌ها و لوازم بستر در آب داغ ۵۵ درجه‌ی سانتی‌گراد به مدت ۲۰ دقیقه) شسته شود به طوری که تخم شپش را از بین برد.
۲- از تماس بدنی با افراد آلود و آنچه به آن‌ها تعلق

راه انتقال: انگل ژیاردیا پس از آن که همراه مدفوع

وارد محیط خارج شد، از طریق دست‌های آلود و یا مصرف آب‌های آشامیدنی آلود و یا غذای آلود وارد بدن و در آنجا فعال می‌شود. اغلب آلودگی‌ها به کمک غذای سرد و به دلیل آلودگی دست تهیه‌کنندگان آن غذاها منتقل می‌شود.

پیشگیری: برای پیشگیری از این بیماری رعایت بهداشت فردی و شستشوی دست‌ها با آب و صابون قبل از خوردن غذا و بعد از دفع لازم است. کل آب آشامیدنی قادر به از بین بردن ژیاردیا نیست بنابراین وقتی امکان آلودگی آب وجود دارد، باید آب را قبل از استفاده جوشاند. غذاها نیز در صورتی که امکان آلودگی‌شان باشد باید کاملاً پخته شوند. دفع مدفوع به صورت بهداشتی نیز در پیشگیری مؤثر است.

● **آلودگی به کرم‌های قلابدار**

دسته‌ای از کرم‌ها هستند که به خاطر شکل اندام تناسلی نر، به آن‌ها کرم قلابدار می‌گویند.

آلودگی به این کرم در مناطقی با آب و هوای گرم که دفع مدفوع نیز به صورت بهداشتی انجام نمی‌شود، دیده می‌شود. این کرم‌ها می‌توانند در بدن انسان خونخواری کرده، ایجاد کمبود آهن و کم خونی کنند.

راه انتقال: تخم کرم با مدفوع دفع و در محیط به لارو (نوزاد انگل) تبدیل می‌شود. این لارو با سوراخ کردن پوست و بیشتر پوست پا وارد بدن شده، در محل ورود کمی قرمزی و خارش در پوست ایجاد و پس از رسیدن به روده، روزانه هزاران تخم تولید می‌کند.

پیشگیری: مهم‌ترین راه‌های پیشگیری عبارت است از:
۱- جلوگیری از آلودگی خاک، مثلاً نباید از کود انسانی برای تقویت خاک کشاورزی استفاده کرد.

۲- پوشیدن کفش در محل‌های آلود به خصوص باید به شالیکاران پوشیدن چکمه را توصیه کرد.

۳- دفع بهداشتی مدفوع و استفاده از توالث‌های بهداشتی.



مبانی بیماری‌های واکیر و غیر واکیر: آشنایی با بیماری‌های شایع واکیر و اصول پیشگیری از آن‌ها

انگل بعد از گزش انسان به کمک پشه‌ی آلوده، وارد جریان خون فرد می‌شود و به این ترتیب فرد را مبتلا می‌کند. در صورتی که پشه‌ی آنوفل این فرد مبتلا را نیش بزند انگل‌ها وارد بدن پشه می‌شود و در آن‌جا رشد می‌کند. بدین ترتیب گرددس انگل در بدن پشه و انسان ادامه می‌یابد. پس این بیماری می‌تواند از طریق انتقال خون فرد مبتلا به بیماری، وسائل و تجهیزات پزشکی آلوده و از مادر آلوده به جنین منتقل شود. علایم بیماری شامل لرز، تب و تعریق دوره‌ای به مدت ۴ تا ۶ ساعت در هر دوره است. سردرد و تهوع هم در بیمار است.

برای پیشگیری از ابتلا به مالاریا انجام دادن کارهای زیر مفید است:

- سپاهشی مکان‌های استراحت پشه مثل مکان‌های مسکونی انسان و حیوانات، پاشیدن نفت، گازوییل و روغن روی سطح آب‌های راکد یا سپاهشی مرداب‌ها و جاهایی که آب راکد هست. این محل‌ها، محل زندگی لارو پشه‌هاست.
- خواهیدن در داخل پشه‌بندها و نصب توری به در و پنجره.

-. خشکاندن باتلاق‌ها و آبگیرها.

• کچلی سر

کچلی نوعی بیماری قارچی است که می‌تواند پوست، مو و ناخن را گرفتار سازد و بیشتر در سال‌های مدرسه شایع است. کچلی سر از انواع دیگر شایع‌تر است. این بیماری به صورت زخم کوچکی شروع می‌شود و سپس زخم از اطراف شروع به رشد می‌کند. موها در ناحیه‌ی ابتلا به سادگی شکسته می‌شوند و به تدریج ناحیه‌ی مبتلا بی مو می‌شود. گاهی اوقات زخم‌ها بزرگ، کمی برجسته و ترشح دار می‌شود.

کچلی سر در پسرها شایع‌تر از دخترهاست. تراکم جمعیت و فقر، احتمال ایجاد آن را افزایش می‌دهد.

راه انتقال: از طریق تماس مستقیم یا غیرمستقیم، به خصوص از طریق پشتی صندلی‌های سینما، وسائل سلمانی، شانه، برس و یا لباس‌های آلوده به موی سر انسان مبتلا منتقل می‌شود.

دارد، به خصوص لباس‌ها و وسائل بسترهای باید پرهیز کرد.

۳- در شرایطی که خطر انتقال شپش زیاد است باید از مواد دور کنندهٔ حشرات بر روی موی سر، سطح بدن و لباس‌ها به خصوص در خوابگاه‌ها، سریازخانه‌ها و ... استفاده کرد.

درمان اختصاصی با دارو انجام می‌شود که با نوعی شامپوی مخصوص همراه است.

● مالاریا

آیا بیمار مبتلا به مالاریا را دیده‌اید؟ به نظر شما مهم‌ترین علامت بیماری چیست؟



مالاریا بیماری انگلی است که توسط پشه‌ای به نام آنوفل (جنس ماده پشه) به انسان منتقل می‌شود. این پشه برخلاف سایر پشه‌ها که به صورت مستقیم بر روی زمین می‌نشینند به صورت مایل بر روی سطوح می‌نشیند. امروزه این بیماری پیشتر در جنوب شرقی ایران در استان‌های سیستان و بلوچستان، هرمزگان و قسمت گرمسیری کرمان دیده می‌شود.

راه انتقال



پیشگیری: رعایت بهداشت پوست، عدم استفاده از وسایل شخصی دیگران و استحمام مرتب سبب پیشگیری از بروز بیماری کچلی می‌شود.

درمان: در موارد خفیف بیماری، موهای سر باید روزانه شسته و موهای شل جدا شود. برای درمان بیمار باید از داروهای خوراکی ضد قارچ، پمادها و محلول‌های موضعی و شامپوهای مخصوص استفاده کرد. در موارد شدید باید پس از شستشوی روزانه سر، کلاه به سرگذاشت و کلاه‌های آلوده را بعد از استفاده به خوبی شست.



فعالیت عملی ۵

در خصوص بیماری مالاریا (نحوه ابتلاء‌های انتقال، پیشگیری و علایم آن) داستانی بنویسید و در کلاس بخوانید و نظر سایر هنرجویان را در این باره جویا شوید.

بیشتر بدانید

بیماری‌های آمیزشی

بیماری‌های آمیزشی همان‌طور که از نام آن‌ها مشخص است از طریق تماس جنسی با فرد آلوده ایجاد می‌شود.

علایم این بیماری‌ها، ترشح از مجاری ادرار، ترشح از رحم، درد در ناحیه‌ی دستگاه تناسلی و درد زیر شکم در زنان، ورم پوست بیضه و بزرگ شدن غده‌های لنفاوی کشاله‌ی ران در مردان است.

چه کسی مبتلا به بیماری‌های آمیزشی می‌شود؟

فردی که با فرد آلوده تماس جنسی داشته باشد ممکن است مبتلا به بیماری آمیزشی شود.

بیماری‌های آمیزشی عاقب سختی دارند از جمله:

- کوری و عفونت ریه در نوزاد

- شکایت از درد مژمن شکم در زنان

- ناباروری در مردان و زنان

- مرگ در نوزادان و بزرگسالان در بعضی از بیماری‌های آمیزشی مانند ایدز و سیفلیس (یکی از بیماری‌های آمیزشی)



- سقط خود به خودی، حاملگی نابجا و سرطان دهانه‌ی رحم
- پیامدهای اجتماعی برای مرد یا زنی که همسرش مبتلا به بیماری آمیزشی است مانند جدایی از همسر.

فردی که مبتلا به بیماری آمیزشی است چگونه می‌تواند از انتقال بیماری به دیگران جلوگیری کند؟

فردی که مبتلا به بیماری آمیزشی است تا زمانی که علایم از بین نرفته و درمان کامل نشده باشد نباید فعالیت جنسی داشته باشد، چون باعث انتقال آلودگی به همسرش می‌شود. اگر فرد مبتلا به بیماری آمیزشی قادر به اجتناب از تماس جنسی نباشد، لازم است از کاندوم استفاده کند.

بهترین شیوه‌ها برای پیشگیری از بیماری‌های آمیزشی عبارت است از:

- ۱- پایبندی به شعایر دینی و دوری کردن از فعالیت جنسی خارج از چهارچوب ازدواج
- ۲- وفاداری متقابل مدام‌العمر به همسر
- ۳- استفاده از کاندوم

چکیده

✓ بیماری‌های واگیر، بیماری‌هایی هستند که از انسان به انسان، یا از حیوان به انسان منتقل می‌شود. این بیماری‌ها بر اساس عامل به وجود آورنده‌شان به چند دسته‌ی عمدۀ تقسیم می‌شوند: بیماری‌های میکروبی، بیماری‌های ویروسی، بیماری‌های انگلی و بیماری‌های قارچی. دسته‌ای از این بیماری‌ها با واکسن قابل پیشگیری‌اند. یعنی با واکسیناسیون به موقع مادر و کودک از ابتلا به این بیماری‌ها پیشگیری می‌شود مثل فلنج اطفال، سرخک، سرخجه، کزار، اوریون، سل، هپاتیت.

✓ بیشتر بیماری‌های واگیر با رعایت بهداشت فردی و محیط، تغذیه‌ی مناسب، واکسیناسیون و ... قابل پیشگیری‌اند. انسان می‌تواند با شناخت راه‌های پیشگیری این بیماری‌ها و به کار بستن آن‌ها از ابتلا به بسیاری از آن‌ها جلوگیری کند.

آزمون پایانی نظری واحد کار سوم ؟

- ۱- کدام یک از راه‌های انتقال آبله مرغان نیست؟
الف) تماس مستقیم با فرد آلوده
ب) انتقال خون
د) انتقال از طریق وسایل فرد آلوده
ج) از طریق هوا
- ۲- کدام یک مشخصه‌ی بیماری سرخجه است?
الف) دانه‌ها تقریباً همیشه در صورت بروز می‌کند.
ب) عامل بیماری باکتری است.
ج) بیماری از حیوان به انسان منتقل می‌شود.
د) در مردان بیشتر از زنان اتفاق می‌افتد.
- ۳- کدام یک از بیماری‌های قابل انتقال از حیوان به انسان است?
الف) سرخک
ب) آبله مرغان
ج) هاری
د) ایدز
- ۴- کدام یک از علایم بیماری منژیت است?
الف) سردرد شدید
ب) استفراغ
ج) سفت شدن گردن
د) همه‌ی موارد
- ۵- کدام یک از خصوصیات ویروس هپاتیت A نیست?
الف) ویروس با ۵ دقیقه جوشاندن از بین می‌رود.
ب) انسان تنها مخزن عفونت است.
ج) راه انتقال آن مدفوع – دهان است.
د) هیچ کدام
- ۶- کدام یک راه انتقال ویروس هپاتیت B است?
الف) انتقال خون
ب) به کار بردن سرنگ و سوزن و وسایل آلوده در پزشکی
ج) انتقال از مادر آلوده به نوزاد
د) همه‌ی موارد
- ۷- کدام یک راه انتقال کرم کدو است?
الف) خوردن سبزی آلوده به تخم انگل
ب) هیچ کدام
ج) هر دو
- ۸- کدام یک از موارد فوق درباره بیماری تراخم صحت ندارد?
الف) کودکان ۲ تا ۵ ساله بیشتر گرفتار می‌شوند.
ب) بیماری از حیوان به انسان منتقل می‌شود.
ج) گرد و غبار و دود از عوامل مساعد کننده‌ی شرایط برای بیماری است.
د) بیماری در شرایط فقر، جهل و بدی بهداشت فردی زیاد می‌شود.
- ۹- کدام یک از بیماری‌های زیر با واکسیناسیون قابل پیشگیری نیست.
الف) تب مالت
ب) کزان
ج) اوریون
د) هپاتیت B
- ۱۰- راه‌های انتقال تب مالت کدامند?
۱۱- راه‌های عمدۀ انتقال بیماری ایدز را نام ببرید.
۱۲- علایم مهم بیماری سل را بنویسید.



آزمون پایانی عملی واحد کار سوم

- ۱— درباره‌ی شایع ترین بیماری واکیر منطقه‌ی خود تحقیق کرده، علت شیوع آن را گزارش دهید.
- ۲— تحقیق کنید چه حیواناتی در محل زندگی شما وجود دارد؟ گزارشی درباره‌ی بیماری‌هایی که از طریق این حیوانات قابل انتقال‌اند تهیه کنید.
- ۳— در صورت امکان درباره‌ی میزان شیوع آلودگی به شپش سر در بین هنرجویان مدرسه تحقیق و بررسی کنید.