

<p>پیمانه مهارتی: گیاهشناسی و انتخاب رقم مناسب آفتابگردان</p> <p>شماره شناسایی: ۲۱۲۱۰۱۱۹-۱</p>	<p>مهارت: کشت آفتابگردان</p> <p>شماره شناسایی: ۲۱۲۱۰۱۱۹</p>
--	---

## پیمانه مهارتی (۱)

# گیاهشناسی و انتخاب رقم مناسب آفتابگردان

### هدف کلی

شناسایی گیاه آفتابگردان و مراکز تهیه، توزیع، خرید و فروش بذر آن

اهداف رفتاری: در پایان این پیمانه، فرآگیر باید بتواند :

- ۱- اهمیت زراعت آفتابگردان را توضیح دهد.
- ۲- خصوصیات گیاهشناسی آفتابگردان را بیان کند.
- ۳- ارقام آجیلی و روغنی را نام ببرد.
- ۴- خصوصیات عمومی و اختصاصی مطلوب در انتخاب بذر آفتابگردان را توضیح دهد.
- ۵- میزان بذر مصرفی را تعیین نماید.

مهارت: کشت آفتابگردان

شماره شناسایی: ۲۱۲۱۰۱۱۹

پیمانه مهارتی: گیاهشناسی و انتخاب رقم مناسب آفتابگردان

شماره شناسایی: ۲۱۲۱۰۱۱۹-۱

## مقدمه

آشنایی با خصوصیات گیاهشناسی یک گیاه و نیز فهمیدن ارزش و اهمیت آن، نقش مطلوبی در زراعت یا تولید آن گیاه دارد. اغلب گیاهان، دارای ارقام و انواع متعددی هستند. که هر یک برای شرایط و هدف خاصی مناسب‌اند. از این رو، لازم است ویژگیهای هر رقم یا نوع را به خوبی بشناسید و با توجه به هدف و شرایط خود، از آنها به درستی استفاده کنید. در این پیمانه علاوه بر موارد فوق، با چگونگی تشكیل، خصوصیات مطلوب، مراکز تهیه، توزیع و فروش بذر آشنا شده، نحوه عقد قرارداد را فرا خواهید گرفت.

مهارت: کشت آفتابگردان

شماره شناسایی: ۲۱۲۱۰۱۱۹

پیمانه مهارتی: گیاه‌شناسی و انتخاب رقم مناسب آفتابگردان

شماره شناسایی: ۲۱۲۱۰۱۱۹-۱

### پیش آزمون

- ۱- سه گیاه زراعی روغنی را نام ببرید.
- ۲- از قسمتهای مختلف گل، کدام یک در تولید مثل نقش مستقیم دارند؟
- ۳- حشرات، چگونه در گرده افسانی و تولید مثل گیاهان، نقش ایفا می‌نمایند؟
- ۴- منظور از خلوص بذر چیست؟ انواع آن کدام است؟
- ۵- چه رابطه‌ای بین نوع گیاه از نظر زودرسی و دیررسی با شرایط منطقه وجود دارد؟

## ارزش و اهمیت روغن‌های نباتی و زراعت آفتابگردان

بشر، انرژی مورد نیاز خود را از سه منبع عمدۀ یعنی پروتئینها، قندها و چربیها به دست می‌آورد. از این منابع، انرژی چربیها از همه بالاتر یعنی ۹ کیلوکالری در هر گرم می‌باشد در حالی که هر گرم پروتئین یا قند، ۴ کیلوکالری انرژی تولید می‌کند. امروزه برخلاف گذشته سوء تغذیه را تنها ناشی از کمبود پروتئین در جیره غذایی نمی‌دانند. زیرا در بسیاری از موارد چربیها تأثیر مهمی در سوء تغذیه دارند.

چربیها، بخصوص روغن‌های نباتی، در کودکان و افراد ضعیف فوق العاده با اهمیت هستند. نقش چربیها در انتقال و تسهیل عمل جذب ویتامینهای A، D، E و K منحصر به فرد بوده، برای سلولهای مغزی و تنظیم کنندگان سوخت و ساز بدن ضروری هستند.

آفتابگردان یکی از نباتات روغنی مهم جهان است که از نظر تولید روغن، در بین گیاهان یکساله تولیدکننده روغن، بعد از سویا در مقام دوم قرار دارد و بیش از ۱۴٪ کل روغن نباتی جهان را تولید می‌کند. روغن آفتابگردان بسیار مطلوب است و به همین دلیل، زراعت آن در مناطق معتدل تمام قاره‌ها معمول شده است. آفتابگردانهای آجیلی از بازار سیندی ویژه‌ای برخوردارند. علاوه بر این، فرآورده‌های جانبی آفتابگردان بخصوص کنجاله آن باعث توجه هرچه بیشتر به زراعت این گیاه با ارزش شده است.

## مبدأ، تاریخچه و سیر پراکنش آفتابگردان

آفتابگردان از گیاهان بومی نواحی مرکزی قاره آمریکاست. طبق مومنیایی شده نوعی آفتابگردان از این منطقه کشف شده است. آفتابگردان، برای نخستین بار به واسطه جهانگردان اسپانیایی به اروپا آورده شد و در قرون شانزدهم و هفدهم به اغلب کشورهای اروپایی به عنوان گیاه زینتی وارد گردید و مورد کشت قرار گرفت.

در قرن ۱۸، آفتابگردان به روسیه برده می‌شود. روسها،

موقعیت خورشید است. طبقه‌ای این گیاه، به هنگام صبح به طرف شرق و به هنگام غروب به طرف غرب قرار می‌گیرد.

### ریشه آفتابگردان

آفتابگردان دارای ریشه راست و عمیق است. ریشه اصلی آن، در شرایط خشک و خاکهای متوسط و سبک، تا بیش از ۳ متر در خاک نفوذ کرده، آب و مواد غذایی را جذب می‌کند. در شرایط آبیاری، تقریباً ۸۰ درصد ریشه‌ها در عمق ۳۰ سانتیمتر پراکنده هستند. پراکنده‌گری ریشه‌ها در عمق خاک و نسبت ریشه‌های اصلی به فرعی در ارقام مختلف بسیار متنوع است.


به ارزش روغنی آن بی‌بردن و اقدامات اصلاحی روی آن انجام دادن، به نحوی که درصد روغن آن از حدود ۲۰٪ در ابتدای ورود به روسیه، به بیش از ۵۵٪ در سال ۱۹۶۰ رسید. امروزه ارقامی که به عنوان ارقام روغنی در نقاط مختلف جهان از جمله آمریکا کشت می‌شوند، ارقام اصلاح شده روسی هستند.

### خصوصیات گیاه‌شناسی آفتابگردان

آفتابگردان زراعی، گیاهی است یکساله، نام علمی گیاه<sup>۱</sup> و همچنین نام جنس<sup>۲</sup> و نامهای اسپانیایی<sup>۳</sup>، فرانسوی<sup>۴</sup>، انگلیسی<sup>۵</sup> و نیز نام فارسی آن همگی بیانگر چرخش طبقه‌ای این گیاه در برابر



شکل ۱-۲—ریشه آفتابگردان در مراحل اولیه رشد و نمو



شکل ۱-۱

۱—Helianthus annuus

۲—Helianthus از دو کلمه Helies به معنی خورشید (آفتاب) و Antus به معنی گل تشکیل شده است.

۳—Giresol

۴—Tournesol

۵—Sun Flower

**ساقه**

ساقه آفتابگردن راست و برآفراشته است. ارتفاع ساقه در انواع اصلاح نشده تا ۵ متر می‌رسد و دارای شاخه‌های جانبی به شکل‌های مختلف هستند. اما ارقام اصلاح شده دارای ۹٪ تا ۲ متر ارتفاع و عمدتاً بدون شاخه جانبی هستند. ساقه‌ها پوشیده از کرک‌های ریز بوده، قطر آنها از ۲ تا ۶ سانتیمتر متغیر است. تراکم زیاد بوته و مصرف بی‌رویه کودهای ازته باعث بلند و نازک شدن ساقه و شکستگی آن می‌شود.



شکل ۱-۳— ساقه افراشته و بدون انشعب آفتابگردن

**تحقیق کنید**

۱— چنانچه شاخه اصلی در ارتفاع حدود ۲۰ سانتیمتری از سطح خاک بریده شود، در بلند مدت چه تغییری در گیاه ایجاد می‌شود؟

۲— با توجه به جدول مقابل و گردش علمی در سطح منطقه خود، تعیین کنید چه نوع آفتابگردانی در منطقه شما بیشتر کشت می‌شود.


جدول ۱-۱

ارتفاع ساقه به سانتیمتر	نوع آفتابگردن
بیش از ۲۰۰ سانتیمتر	خیلی طویل
۱۷۵ تا ۲۰۰ سانتیمتر	طویل
بین ۱۲۰ تا ۱۷۵ سانتیمتر	نیمه پا کوتاه
کمتر از ۱۲۰ سانتیمتر	پا کوتاه


شدن آب در پشت طبق، سبب پوسیدگی می‌گردد. حالت‌های ۵، ۶ و ۷ مشکلات زیادی را در برداشت با کماین به همراه دارد. حالت اتصال طبق، یک ویژگی ارشی است ولی دادن بی موقع کود سرک و ضعیف شدن ساقه‌ها می‌تواند سبب تشدید حالت‌های ۵، ۶ و حتی ۷ شود. گاهی نیز کبود آب و سنگینی طبق، به ویژه در مراحل انتهایی دانه‌بندی، سبب شکستگی ساقه و ایجاد حالتی مشابه شماره (۷) می‌شود.

نحوه اتصال ساقه به طبق و یا گل انتهایی، اسکال مختلف دارد و در مراکز تحقیقاتی بسته به مقدار خمیدگی طبق نسبت به ساقه، هفت نوع خمیدگی دیده می‌شود.

حال شماره ۱ از نظر زراعی شکل چندان مطلوبی محسوب نمی‌شود زیرا اولاً گلها و دانه‌ها به علت تابش شدید آفتاب دچار سوختگی می‌شوند و ثانیاً از ناحیه پرندگان نیز آسیب می‌بینند. مناسب‌ترین شکل زراعی حالت ۲ و پس از آن حالت‌های ۲ و ۴ می‌باشد. حالت ۴ در مناطق پرباران چندان مناسب نیست زیرا جمع



جدول ۱-۲



شکل ۱-۴

## برگ

تعداد برگهای آفتابگردان بین  $۸۰ - ۷۰$  عدد در بوته‌ها و انواع مختلف، متفاوت است. اندازه آنها بزرگ است و گاهی طول آنها به  $۳۰$  سانتیمتر و عرض آنها در عریض‌ترین قسمت به  $۲۵$  سانتیمتر می‌رسد. اغلب قلبی شکل اند و کناره آنها دندانه دار است. اندازه برگها در قسمت میانه ساقه بزرگ‌تر از قسمتها پایین و بالایی هستند و این برگها نقش مهمتری در تغذیه گیاه دارند. برگها در پایین ساقه به صورت متقابل و در قسمتها بالا به صورت متناوب با دمبرگ نسبتاً طویل قرار گرفته‌اند.

مهارت: کشت آفتابگردان

شماره شناسایی: ۲۱۲۱۰۱۱۹

پیمانه مهارتی: گیاه‌شناسی و انتخاب رقم مناسب آفتابگردان

شماره شناسایی: ۲۱۲۱۰۱۱۹

برگها خورشیدگرا هستند و همواره طوری قرار می‌گیرند که عمود بر تابش آفتاب باشند (صبح به طرف شرق، غروب به طرف غرب و ظهر و شب رو به بالا) ولیکن در شدت تابش زیاد، حول محور مرکزی لوله می‌شوند.



شكل ۵—تابش نور یک جانبی به گیاهان نورسته آفتابگردان



شكل ۶—برگ آفتابگردان: به شکل پهنگ، کناره برگ، دمبرگ و رگبرگها توجه کیشد.

فکر کنید: عکس در چه وقتی از شبانه روز گرفته شده

است؟ چرا؟



شکل ۱-۷- غنچه آفتابگردان

## گل و گل آذین

نحوه قرار گرفتن گل بر روی محور گل دهنده را اصطلاحاً «گل آذین» می‌گویند. نوع گل آذین در آفتابگردان کلابرک<sup>۱</sup> است که در آن تعداد زیادی گل روی نهنجی سطح که به آن «طبق» یا «قرص» هم می‌گویند، قرار گرفته‌اند. به هر یک از گلهای قرار گرفته بر روی طبق «گلچه» می‌گویند. گلچه‌ها به صورت دوایر مارپیچی که از مرکز دایره شروع و به محیط ختم می‌شوند قرار گرفته‌اند و خود شامل دو نوع زبانه‌ای و لوله‌ای هستند. گل یا گلچه‌های زبانه‌ای واقع در خارجی‌ترین دوایر، دارای رنگ زرد قشنگ و جذاب‌اند. این گلهای عقیم هستند و نقشی در تولید دانه ندارند اما در جذب حشرات و لقاح گلهای لوله‌ای نقش بسیار مهمی دارند.



شکل ۱-۹- طبق آفتابگردان و دانه‌های روی خطوط متعدد مرکز




شکل ۱-۸- گل آفتابگردان با گلچه‌های جذاب زبانه‌ای

می‌گویند. این لپها قبل از شکوفا شدن به هم چسبیده هستند. قاعده متورم مادگی را «تحمدان» می‌گویند که پس از رشد تبدیل به میوه می‌شود.

تعداد گلهای لوله‌ای یک طبق بین ۷۰۰ تا ۳۰۰۰ عدد تغییر می‌کند که در صورت فراهم بودن شرایط مطلوب تغذیه و محیط رشد، تعداد زیادتری از آنها به دانه تبدیل می‌شوند.

گلهای لوله‌ای، گلهای کاملی هستند یعنی دارای کاسبرگ، گلبرگ، مادگی و پرچم‌اند.

کاسبرگ‌ها به دو فلس کوچک تبدیل شده‌اند. گلبرگ‌ها به تعداد ۵ عدد بهم چسبیده (لوله‌ای) و در انتهای آزاد هستند. پرچمهای پنج عدد دارد. بساک این پرچمهای بهم چسبیده است و تشکیل لوله‌ای می‌دهد که از درون آنها خامه مادگی عبور می‌کند. کلاله مادگی دو شاخه‌ای است که هر یک از شاخه‌ها را «لپ»



شکل ۱۱-۱- پایین: برش عمودی از یک گل آذین آفتابگردان. بالا: نمایش تک گلهای لوله‌ای بر حسب محل قرار گرفتن آنها (بدتفاوت اندازه آنها دقیق نبود).

مهارت: کشت آفتابگردان

شماره شناسایی: ۲۱۲۱۰۱۱۹

پیمانه مهارتی: گیاه‌شناسی و انتخاب رقم مناسب آفتابگردان

شماره شناسایی: ۲۱۲۱۰۱۱۹-۱

شدن تمام گلهای لوله‌ای، گلهای زرد زبانه‌ای شروع به ریزش می‌کنند (در این زمان رشد ریشه به حد اکثر خود رسیده، دیگر ادامه نمی‌یابد).

**فکر کنید:** آیا شروع گلدهی، تابع شرایط محیط است یا اینکه صرفاً یک صفت ارشی می‌باشد؟ در تصویر زیر گلهای مختلفی را در طبق می‌توان مشاهده کرد. در قسمتهای خارجی گلهای تلقیح شده در محل فعالیت زنبور کلاله‌ها خارج شده‌اند و در قسمت مرکزی طبق، پرچمها با توده‌های گرده از گل خارج گردیده‌اند.

**فعالیت کنید:** در فصل داشت آفتابگردان، یک گل کامل (لوله‌ای) را از طبق جدا کرده، ضمن ترسیم شکل آن، قسمتهای مختلف آن را بررسی کنید.

### گلدهی در آفتابگردان

شکوفا شدن گل از محیط به سمت مرکز است. ابتدا گلهای زبانه‌ای ظاهر می‌شوند سپس گلهای لوله‌ای واقع در خارجی‌ترین دایره طبق شکوفا می‌شوند. هر روز ۲ تا ۴ ردیف از گلها باز می‌شوند. از این‌رو، بسته به تعداد گل و درشتی طبق، زمان گلدهی بین ۵ تا ۱۰ روز طول می‌کشد. یک روز پس از باز



شكل ۱-۱۱

## گرده افسانی و لقاح در آفتابگردان

به انتقال اندام جنسی نر (دانه گرده) از بساک پرچمها به روی کلاله مادگی را «گرده افسانی» می‌گویند.

مجموع دانه‌های گرده تولیدی از بساک پرچم یک گل لوله‌ای، حدود ساعت ۷ صبح به صورت توده زرد رنگ به اندازه ته سوزن ته گرد تشکیل می‌شوند که به سادگی قابل مشاهده هستند. در بعداز ظهر همان روز، حوالی ساعت ۵ بعداز ظهر، خامه مادگی رشد کرده، طویل می‌گردد. با رشد خود بساکها را کنار زده، کلاله در سطحی بالاتر از سطح بساک قرار می‌گیرد. آنگاه لپهای گیرنده دانه گرده از هم باز می‌شوند. همین دو عارضه ۱- ناهمزمانی رسیدگی بساک و کلاله، ۲- بالاتر قرار گرفتن سطح کلاله از سطح بساکها باعث می‌شود که دانه گرده آن گل نتواند مادگی همان گل را تلقیح نماید. از این‌رو، آفتابگردان گیاهی دگرگشن است و حشرات و بویژه زنبور عسل، در تلقیح گلهای آن، نقش مهمی دارند.



شکل ۱-۱۲



شکل ۱-۱۳

**فکر کنید:** چگونه می‌توان مانع انتقال دانه گرده از ارقام نامطلوب گردید؟ حداقل دو راه پیشنهاد کنید.  
زنبور عسل چگونه می‌تواند عملکرد مزرعه آفتابگردان را افزایش دهد.

لقاد: به ترکیب دانه گرده با تخمک مادگی اصطلاحاً «لقاد» می‌گویند. وقتی که دانه گرده به کمک عوامل مختلف مثلاً حشرات، از گل دیگر یا حتی از بوته دیگر به سطح کلاله رسید در آنجا رشد گرده، خود را به تخمک می‌رساند. با ترکیب دانه گرده با یکی از سلولهای تخمک، سلول تخم حاصل می‌شود.


از رشد سلول تخم، دانه (مغز) آفتابگردان به وجود می‌آید و از رشد دیواره خارجی تخدمان، پوسته میوه آفتابگردان حاصل می‌شود. البته بدون لقاد نیز، در آفتابگردان پوسته میوه به وجود می‌آید که به آنها اصطلاحاً «دانه‌های پوک» می‌گویند و به صورت لاغر و کوچک لا بلای سایر میوه‌ها دیده می‌شوند.

**تفسیر کنید:**



شكل ۱۴-۱

**فکر کنید:** ثابت شده است که وقتی کلیه گلهای یک طبق لقاد یافته‌ند، گرایش طبق به نور، از بین رفته، اغلب (بیش از ۹۰ درصد) رو به سمت شرق یا شمال شرقی قرار می‌گیرند. این موضوع چه اهمیت کاربردی می‌تواند داشته باشد؟ چگونه؟



شکل ۱-۱۵- برش طولی میوه آفتابگردان و نمایش قسمتهای مختلف آن

**میوه و دانه در آفتابگردان**  
نوع میوه در آفتابگردان از نوع خشک ناشکوفاست که به آنها «فندقه»<sup>۱</sup> گفته می‌شود و خود شامل دو قسمت عمده است:  
**۱- دانه:** که اصطلاحاً به آن «مغز» می‌گویند. دانه شامل پوسته دانه، گیاهک و مواد غذایی است.

**۲- پوسته:** پوسته میوه که همان قسمت برونبیر یا فرابر میوه می‌باشد و ممکن است به رنگ‌های سفید، سیاه، بنفش، قهوه‌ای، قرمز، خاکستری با خطوط سیاه و سفید دیده شود. رنگ غالب ارقام زراعی، خاکستری با خطوط سیاه است. با تشکیل میوه سایر قسمتهای واقع بر روی طبق با مالش دست به سطح طبق، به راحتی می‌ریزند و تنها میوه‌ها باقی می‌مانند. چنانچه پیشتر گفته شد تعداد میوه‌های یک طبق متفاوت است و رسیدن آنها نیز بر حسب رقم و شرایط منطقه، متفاوت است.

طول هر میوه از ۷ تا ۲۵ میلیمتر و عرض آنها از ۴ تا ۱۱ میلیمتر و وزن هزار دانه آنها بین ۴۰ تا ۲۰۰ گرم متفاوت است.  
**مشاهده کنید:** آیا رنگ پوسته میوه‌های تولیدی در منطقه شما یکسان است؟

- رنگ بذور کاشته شده، چطور؟

- رنگ پوسته غالب، در منطقه شما چیست؟

مرحله جوانه زدن



مرحله رویشی (رستن)



مرحله تشکیل تکمه گل



مرحله تشکیل گل



مرحله رشد میوه و رسیدن دانه



شکل ۱۶-۱-مراحل رشد آفتابگردان از جوانه زدن تا رسیدن

پیمانه مهارتی: گیاهشناسی و انتخاب رقم مناسب آفتابگردن شماره شناسایی: ۲۱۲۱۰۱۱۹	مهارت: کشت آفتابگردان شماره شناسایی: ۲۱۲۱۰۱۱۹
--	--

### مطالعه آزاد

در یک بررسی، به سال ۱۳۷۴، ویژگیهای دانه در طبقه‌های انتخابی از ۵° بوته تصادفی که در کرج انجام گرفت اطلاعات زیر حاصل گردید.

**جدول ۳-۱- برخی از ویژگیهای دانه آفتابگردان**

ضخامت دانه بر حسب میلیمتر	عرض دانه بر حسب میلیمتر	طول دانه بر حسب میلیمتر	وزن هزار دانه بر حسب گرم	عملکرد طبق بر حسب گرم	
۳/۵	۵/۴۶	۱۱/۳۷	۵۲/۳	۹۶/۹۵	میانگین
۲/۲۷	۲/۶۹	۹/۶۶	۳۱/۶۶	۲۴/۲۷	حداقل
۵/۰۲	۷/۶۳	۱۳/۲۳	۱۲۰/۶	۱۹۵/۵۱	حداکثر

اندازه دانه بر حسب محل قرار گرفتن آن در طبق متفاوت است. چنانچه قبل از اینکه شد هر چه به حلقه‌های مرکزی طبق نزدیک می‌شویم دانه‌ها کوچکتر می‌شوند. در همان مطالعه ابعاد دانه در قسمتهای مختلف طبق اندازه‌گیری شده است که در جدول (۱-۴) آمده است.

**جدول ۴-۱- برخی خصوصیات دانه بر حسب محل قرار گرفتن آن در طبق**

ضخامت دانه (میلیمتر)	پهنای دانه (میلیمتر)				طول دانه (میلیمتر)	صفت دانه
	میانگین	دامنه تغییرات	میانگین	دامنه تغییرات		
۱/۴ - ۶/۹	۲/۹۳	۳ - ۶/۸۵	۴/۷۱	۹/۲ - ۱۲/۵	۱۰/۹۲	حلقه مرکزی طبق
۲ - ۵/۲	۲/۵۲	۴ - ۸/۵	۶	۱۰ - ۱۲/۵۵	۱۱/۷۲	حلقه میانی طبق
۲/۷ - ۶/۴	۴/۱	۳/۳ - ۷/۷	۵/۸۳	۹/۳ - ۱۴/۴	۱۱/۴۹	حلقه خارجی طبق

## انواع و ارقام آفتابگردان

**گروه دانه متوسط:** این گروه، آفتابگردانهای هستند که روی غربالهای با سوراخهای گرد ۷/۱ میلیمتر باقی می‌مانند و در کارگاههای ویژه، پوست کنده می‌شوند و سپس مغزها، به صورت بو داده در بسته‌بندیهای سلوفانی و یا قوطیهای هوایگیری شده، به عنوان آجیل به بازار عرضه می‌گردد. گاهی نیز به صورت خام در آشپزی استفاده می‌شوند. ترکیب دانه‌های پوست کنده آفتابگردان به ترکیب مغز گرد و بسیار نزدیک است، بنابراین در شیرینی‌سازی و طبخی می‌توانند همانند مغز گرد و یا مغز بادام مصرف شوند.

گروه دانه ریز: معمولاً به عنوان غذای پرندگان مصرف می‌شود. این دانه‌ها مخلوط با سورگوم دانه‌ای، ذرت، ارزن و گندم یا چاودار برای تغذیه پرندگان دست‌آموز خانگی به کار می‌روند.

نسبت این سه گروه در محصول برداشتی از یک مزرعه آفتابگردان معمولاً به صورت ۱۵ تا ۲۵ درصد دانه درشت، ۴۰ تا ۶ درصد دانه متوسط و ۱۵ تا ۲۵ درصد دانه ریز می‌باشد.

همان‌طور که گفته شد کار اصلاح ارقام آجیلی در جهت درشت‌تر شدن دانه‌ها هدایت شده است. درشت‌تر شدن دانه، مستلزم قوی‌تر بودن بوته‌هاست به همین جهت ارقام آجیلی دانه درشت غالباً ارتفاع نسبتاً بیشتری از ارقام روغنی دارند سطح برگ آنها بیشتر و قطر طبقها زیادتر و دانه‌ها بسیار درشت‌تر است. گاهی وزن هزار دانه ارقام آجیلی به دو برابر وزن هزار دانه ارقام روغنی می‌رسد. درصد روغن در این گونه ارقام معمولاً حدود ۲۵ تا ۳۰ درصد و درصد پوست آنها، گاهی تا ۵۵ درصد وزن دانه است.

**ارقام آجیلی:** ارقام آجیلی موجود در ایران، از روش نامگذاری واحدی برخوردار نیستند و در مناطق مختلف اسامی

## انواع آفتابگردان

طبق نظریکی از دانشمندان<sup>۱</sup> گیاهشناسی، جنس آفتابگردان حدود ۶۷ گونه می‌باشد ولیکن، منظور ما از انواع آفتابگردان فقط انواع زراعی آن است که به دو گروه عمدهٔ روغنی و آجیلی تقسیم می‌شوند.

**۱- آفتابگردانهای آجیلی:** آفتابگردان آجیلی از نظر رده‌بندی گیاهی تفاوتی با آفتابگردانهای روغنی ندارند. این آفتابگردانها معمولاً به خاطر داشتن دانه انتخاب و اصلاح شده‌اند و طی سالها انتخاب و کشت دانه‌های درشت‌تر و درصد پوست

در این گروه حدود دو برابر پوست گروه روغنی است.

در ایران، مطالعات زیادی در مورد گروه آجیلی آفتابگردان انجام نشده است و این گروه بسته به سلیقه مصرف‌کنندگان آجیل برحسب رنگ پوست و درشتی و ریزی و کشیده بودن و یا به اصطلاح چاق بودن دانه گروه‌بندی شده‌اند ولی غالباً سلیقه مصرف‌کنندگان متمایل به استفاده از ارقام دانه درشت است و نامهای محلی برای آنها انتخاب شده است که هیچ گونه مبنای علمی ندارد. رنگ این آفتابگردانها غالباً خاکستری تیره، خاکستری با خطوط سفید و سیاه، قهوه‌ای متمایل به قرمز است. نمونه‌هایی با پوست بنفس که بقایای رنگ آنها بر دست و دهان مصرف‌کننده باقی می‌ماند مشتری چندانی ندارد. در برخی از کشورها آفتابگردانهای آجیلی را برحسب اندازه دانه و مصرف آنها به سه

گروه زیر تقسیم‌بندی می‌کنند:

**گروه دانه درشت:** این گروه، آفتابگردانهایی هستند که در هنگام بوجاری در روی غربالهای سوراخ گرد ۸/۷ میلیمتر باقی می‌مانند و به عنوان محصول پوست‌دار مصرف می‌شوند. این دانه‌ها به صورت سالم، نمک سود و بو داده، در بسته‌بندیهای کوچک به مصرف می‌رسند.

بحث کنید: آیا در منطقه شما درجه‌بندی دانه‌های آجیلی مرسوم است؟ چگونه؟  
– درجه‌بندی محصول چه محاسنی می‌تواند داشته باشد؟

مختلفی دارند. چه بسا ممکن است یک رقم در مناطق مختلف اسامی متفاوتی داشته باشد. برخی از این اسامی عبارت‌اند از: سنقری، میخی، میخی سفید، دو رنگ، کله قوچی (مشهدی)، قلمی و دور سفید.

### جدول ۵-۱- برخی از ویژگیهای ارقام آجیلی

رقم	نواحی کشت	رنگ پوست	سایر ویژگیها
سنقری	اصفهان	قرمز	مرغوب‌ترین و گران‌ترین دانه آجیلی آفتابگردان در منطقه است.
میخی	اصفهان	سیاه رنگ	دانه درشت و کشیده است. نسبت پوست به مغز، بیشتر از سنقری و ارزان‌تر از آن نیز می‌باشد.
میخی سفید	اصفهان	سفید	دانه درشت و کشیده است و در درجه سوم می‌باشد.
دو رنگ	اصفهان	مخخط سیاه و سفید	پست‌تر از ارقام دیگر
کله قوچی (مشهدی)	آذربایجان غربی	سیاه یکدست	دانه کوتاه و به اصطلاح چاق هستند.
قلمی	آذربایجان غربی	سیاه یکدست	دانه کشیده و لاغرتر است و مغز بیشتری دارد.
دور سفید	آذربایجان غربی	مخخط	در محل اتصال دو کفشک پوست یک نوار سفید، گداگرد دانه را فرامی‌گیرد.

### ۲- آفتابگردانهای روغنی

آفتابگردانهای روغنی که زراعت آن از سال ۱۳۴۶ در کشور ما شروع شده و روبه توسعه نهاده است، از لحاظ درصد روغن، مقاومت در برابر آفات و امراض و شکل بوته، و قابلیت برداشت بوسیله ماشین و برخی خصوصیات دیگر اصلاح شده‌اند که مهمترین ارقام انتخاب شده آنها عبارت‌اند از: رکورد، آرمایرسکی، زاریا، و نیمک ۸۹۳۱. ارقام دیگری نیز در کشور وجود دارند که در سطح محدود کشت می‌شوند از آن جمله می‌توان ارقام چرینیانکا، لوح، مایاک و پرودویک را نام برد.

در سالهای اخیر، آفتابگردانهای دورگه (هیبرید) نظیر ارقام مهر، شفق، گلديس و گلشید نیز تولید شده‌اند که هنوز کشت آنها



شکل ۱-۱۷

فراگیر نشده است. این دورگه‌ها از سوی مؤسسه اصلاح و تهیه بذر و نهال ایران معرفی شده‌اند.

#### جدول ۱-۶—برخی از ویژگی‌های آفتابگردانهای روغنی

رقم	نواحی کشت	مبدأ	کاشت تا برداشت (روز)	زمان لازم از	رنگ پوست	سایر ویژگیها
رکورد	سراسر کشور	رومانی	۱۳° - ۱۲°			حاکستری تیره با خطوط روشن
آرم اوپرسکی	آذربایجان غربی و فارس	روسیه	کمی زودرس تر از رقم رکورد			حاکستری تیره با خطوط حاکستری روشن
زاریا	فارس	روسیه	۱۵° - ۱۰° روز			حاکستری تیره با خطوط حاکستری روشن
ونیمک ۸۹۳۱	شمال آذربایجان شرقی بویژه در مشکین شهر و مغان	روسیه	۱۲° - ۱۳°			حاکستری تیره با خطوط حاکستری روشن

برخی از خصوصیات ارقام آفتابگردان در جدول (۱-۵)

آمده است. این جدول صرفاً برای مطالعه می‌باشد.

### جدول ۱-۷- برخی خصوصیات تعدادی از ارقام آفتابگردانهای روغنی

نام رقم	ارتفاع بوته به سانتیمتر	قطر طبق به سانتیمتر	وزن هزار دانه به گرم	درصد روغن	عملکرد دانه کیلوگرم در هکtar	تعداد آزمایش انجام شده
رکورد	۱۸۹	۲۲	۶۷/۸۷	۴۸/۵۷	۲۴۹۵	۱۷
وینیک	۱۹۴	۱۹	۷۱/۸۱	۴۸/۰۴	۲۶۵۱	۱۷
زاریا	۱۶۴	۱۹	۶۷/۹۳	۴۸/۷۶	۲۱۹۵	۱۷
آرامویرسکی	۱۹۵	۱۸/۶	۶۵/۸	۴۵/۶۷	۲۸۹۵	۵
شفق	۱۷۰	۱۹/۵	۶۱	۴۳/۵۵	۲۹۶۶	۱۱
گلدیس	۱۸۱		۵۹/۵	۴۷/۵	۳۷۶۹	۲۴
گلشید	۱۷۸		۶۸/۴۳	۴۹/۲۳	۳۹۸۳	۲۴
آذرگل	۱۷۴		۷۱/۸۷	۴۷/۴	۴۰۵۸	۲۴

بين ۹۵ تا ۱۰۰ درصد باشد. بذر باید به خوبی بوجاری شود و هنگام کاشت یکدست (هم اندازه) و از نظر فیزیکی و زیستیکی خالص باشد. آفتابگردان معمولاً قوه نامیه خود را تا ۴ سال حفظ می‌کند و پس از ۱۳ تا ۱۴ سال خاصیت جوانه زدن را به کلی از دست می‌دهد.

**۲- شرایط اختصاصی بذر در آفتابگردان:**  
**الف** - نسبت مغز به دانه: در ارقام روغنی و یا آجیلی، بالا بودن نسبت دانه به پوست یک صفت مطلوب است. در ارقام روغنی به دلیل اینکه بین درصد روغن و درصد پوست رابطه معکوس وجود دارد یعنی هر چه درصد پوست بیشتر باشد درصد روغن کمتر است این صفت بیشتر مورد توجه می‌باشد. به عبارت دیگر، این صفت، صفت ویژه درصد روغن را هم شامل می‌شود.  
**ب** - تک طبقی: تک طبقی<sup>۱</sup> یک صفت مطلوب است. در ارقام تک طبق، اندازه دانه و رسیدگی یکنواخت و برداشت

فکر کنید: در چه صورت می‌توان گفت که یک رقم برای منطقه مناسب است؟

### جمع آوری اطلاعات

چه ارقامی (روغنی و آجیلی) در منطقه شما رایج هستند؟ سابقه کشت آنها چقدر است و چگونه رواج پیدا کرده‌اند؟ (برای جمع آوری این اطلاعات می‌توانید با کشاورزان منطقه، مردمان خود و مراکز کشاورزی مصاحبه کنید).

### شرایط عمومی و اختصاصی مطلوب در بذور آفتابگردان

**۱- شرایط عمومی:** ویژگیهای عمومی بذر آفتابگردان، مطابق استاندارد مؤسسه اصلاح و تهیه بذر و نهال همانند سایر گیاهان زراعی است. قوه نامیه آن، حداقل ۸۵ درصد ترجیحاً

<sup>۱</sup>- منظور از تک طبق آن است که هر بوته تنها یک طبق داشته باشد.

## بحث کنید

۱- چرا تحقیقات در کشاورزی، امری مستمر است؟  
به عبارت دیگر چرا وقتی مطابق تحقیقات به عمل آمده، رقمی معرفی می‌گردد، کار تمام شده تلقی نمی‌شود؟

۲- چه ضرورتی دارد که یک زارع با مروجین کشاورزی ارتباط دائمی داشته باشد؟

ب — مؤسسه تحقیقات کشاورزی دیم: این مؤسسه، در اوایل دهه هفتاد هجری شمسی با جدا شدن بخشایی از مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر تأسیس گردید. از آن تاریخ، کلیه تحقیقات مربوط به دیم در این مؤسسه متتمرکز است. مرکز تحقیقات دیم دانه‌های روغنی این مؤسسه در مراغه واقع است و در شهرستانهای کرمانشاه، گچساران، شیروان و ارومیه دارای ایستگاههای تحقیقاتی می‌باشد. مقررات اجرای طرحهای تحقیقاتی و روشهای ارائه نتایج، همانند مؤسسه اصلاح بذر است.

ج — دانشگاهها: دانشکده‌های کشاورزی یکی از مراکز مهم تحقیقات و مطالعه در زمینه‌های مختلف دانه‌های روغنی می‌باشند. در این دانشکده‌ها، دانشجویان، بخصوص در مقاطع تحصیلی فوق لیسانس و دکترا، در قالب پژوهش‌های تحقیقاتی در زمینه‌های مختلف از جمله به نژادی و به زراعی دانه‌های روغنی و از آن جمله آفتابگردان تحت نظر استاد راهنمای و استادان مشاور به پژوهش می‌پردازند حاصل این تحقیقات، در رساله‌ها درج شده و یک نسخه از این رساله‌ها در کتابخانه دانشکده نگهداری می‌شود.

## مراکز توزیع بذور و توسعه کشت آفتابگردان

الف — شرکت سهامی توسعه کشت دانه‌های روغنی:  
این شرکت، در سال ۱۳۴۶ با سرمایه کارخانه‌های روغن‌نباتی کشور تأسیس گردید. وظیفه اصلی شرکت توسعه کشت دانه‌های روغنی، خرید محصول دانه‌های روغنی کشاورزان از طریق عقد قرارداد با آنها و تحويل آنها به کارخانه‌های روغن‌کشی است. این شرکت، ضمن عقد قرارداد با کشاورزان در قبال اخذ بها، به آنها کود، سم

مکانیزه بهتر صورت می‌گیرد. چرا؟

ج — پاکوتاهی و امکان برداشت مکانیزه: یکنواختی اندازه بوته و کوتاهی ارتفاع، امکان برداشت مکانیزه را فراهم می‌کند. در ارقام خیلی پا بلند به علت بالا بودن درصد خمیدگی زیاد و حتی شکستگی بوته، برداشت مکانیزه با مشکل مواجه می‌شود.

د — مقاومت در برابر ریزش: ریزش در آفتابگردان به صورت طبیعی بسیار کم است. پُر نشدن کامل میوه‌های یک طبق، در اثر عدم تأمین مواد غذایی و آب مناسب و یا خسارت پرندگان ممکن است باعث کاهش فشردگی دانه (لقی) طبق و ریزش دانه‌های آن گردد.

## مراکز اصلاح بذر آفتابگردان

الف — مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر:  
این مؤسسه تحقیقاتی که مرکز آن در کرج واقع است اولین و بزرگترین مرکز تحقیقات کشاورزی دولتی و خصوصی در ایران است. این مؤسسه دارای بخشایی متعدد است و در هر بخش، محققان و کارشناسان خبره کشاورزی، از جهات مختلف، بر روی یک یا گروهی از گیاهان به بررسی و پژوهش می‌پردازند. اغلب بذرهای اصلاح شده‌ای که امروزه در کشور ماراجع است حاصل زحمات بلند مدت محققان بر تلاش این مرکز و شعبه‌های مختلف آن در سراسر کشور است.

بخش دانه‌های روغنی در این مؤسسه از سال ۱۳۴۸ دایر شده و بر روی ۶ گیاه روغنی سویا، آفتابگردان، کنجد، کلزا، گلنگ و بادام زمینی اقدام به تحقیقات به نژادی نموده است. این بخش در شهرستانهای گرگان، گنبد، ساری، زرقان فارس، ارومیه، مغان و اردبیل، دارای ایستگاه تحقیقاتی بر روی آفتابگردان می‌باشد. نتایج تحقیقات به صورت گزارش پژوهشی و مقالات علمی ارائه می‌گردد. مروجین ادارات کشاورزی، نتایج این تحقیقات را به کشاورزان منتقل می‌نمایند.

و تلویزیون محل، انتشار اعلامیه و گاه، سخنرانی در مراکز تجمع رستاییان، نرخ خرید محصول و نیز تسهیلات را اعلام می‌دارد. این تسهیلات شامل تحويل کود، بذر و برخی از سموم، به‌طور نسیه، پرداخت وام و موارد دیگر است.

داوطلبان کاشت آفتابگردان، در موعد مقرر به یکی از نمایندگیهای این شرکت مراجعه کرده، قرارداد منعقد می‌نمایند. شرکت تولید دانه‌های روغنی در اولین فرصت در زمان کاشت، از مزارع طرف قرارداد بازدید کرده، سطح سبز شده آنها را برآورد می‌نمایند.

در طول دوره داشت شرکت بر حسب درخواست زارعین آفتابگردان آنها را راهنمایی می‌نمایند و در موقع برداشت، کیسه و گونی موردنیاز برای حمل دانه را در اختیار زارعین قرار می‌دهد.

### مقدار بذر مورد نیاز

مقدار بذر مورد نیاز در هر محصول، با توجه به آرایش بوته‌ها (فاصله ردیفها و فاصله بوته‌ها بر روی ردیف)، وزن هزار دانه، و ارزش مصرفی بذر به طریق زیر محاسبه می‌شود:

= مقدار بذر مصرفی (کیلوگرم در هکتار)

ارزش مصرفی بذر × فاصله بوته‌ها در روی ردیف (سانتیمتر) × فاصله ردیفها (سانتیمتر)

$15 \times 65 \times 65 = 65 \times 15$  (فاصله ردیفها ۶۵ و فاصله بوته بر روی ردیف ۱۵ سانتیمتر) کاشته می‌شود و وزن هزار دانه آن معمولاً ۶۵ گرم است و قوه نامیه بذر ۹۵ درصد و خلوص آن ۹۸ درصد می‌باشد میزان بذر مورد نیاز در هکتار به ترتیب زیر محاسبه می‌شود.

ابتدا ارزش مصرفی بذر را محاسبه می‌کنیم:

$$\frac{\text{درصد خلوص} \times \text{قوه نامیه}}{100} = \text{ارزش مصرفی بذر}$$

$$\frac{95 \times 98}{100} = 93/1 = \text{ارزش مصرفی بذر}$$

$$\frac{1000 \times \text{وزن هزار دانه}}{\text{ارزش مصرفی بذر} \times \text{فاصله بوته} \times \text{فاصله ردیفها}} = \frac{65 \times 10000}{65 \times 15 \times 93/1} = 7/16 \text{ kg}$$

و بذر مرغوب تحويل می‌دهد و در طی فصل رشد و نمو گیاه، کارشناسان آن از مزارع بازدید و کشاورزان را راهنمایی می‌نمایند و پس از برداشت محصول، آن را به قیمت مقرر خریداری می‌کنند. این شرکت ضمن دایر نمودن مزارع نمایشی و تهیه کتب، نشریه و پوسترها ترویجی، در ترویج و آموزش کشت دانه‌های روغنی و از آن جمله آفتابگردان، نقش بسیار مهمی دارد. این شرکت نمایندگیهای در گرگان، گنبد، ساری، بابل، بجنورد، ارومیه، اردبیل، اصفهان، قم، شیراز، خرم‌آباد و کرمانشاه دارد و در برخی از شهرها نیز دفاتری دایر نموده است.

**ب – بذر فروشیهای معتبر:** بذر آفتابگردان روغنی منحصراً از سوی شرکت دانه‌های روغنی توزیع می‌شود. بذر آفتابگردانهای آجیلی را می‌توان از بذر فروشیهای معتبر و یا مستقیماً از تولیدکنندگان آنها تهیه نمود.

### زمان و چگونگی انعقاد قرارداد

شرکت توسعه کشت دانه‌های روغنی، هر ساله قبل از شروع فصل کاشت آفتابگردان از طریق نشریات علمی و تخصصی، رادیو وزن هزار دانه بر حسب گرم  $\times 10000$

علاوه بر مقدار به دست آمده از محاسبه فوق، بین ۵ تا ۲۰ درصد بذر اضافه تهیه می‌کنیم تا شرایط نامساعد احتمالی پیش‌بینی نشده؛ مانع تراکم مطلوب در سطح مزرعه نشود. به این مقدار اضافی «ذخیره احتیاطی بذر» می‌گویند.

مثال: با توجه به اینکه آفتابگردان روغنی اغلب با الگوی

عبارت‌اند از:

بهپاک (بهشهر)، اکسیدانه (ورامین)، خاوردهست (گرگان)،  
جهان (کرج)، ناز اصفهان (اصفهان)، مارگارین (شهری)، کشت  
و صنعت شمال (ساری)، فضل (نیشاپور)، پنبه و دانه‌های روغنی  
(خراسان)، اتکا، شهید باهنر، نرگس (شیراز).  
در این کارخانجات از دانه‌های روغنی به روش‌های مختلف  
روغن استحصال می‌شود و حاصل کار، روغن خام نباتی است.

**کارخانجات تصفیه، هیدروژنه کردن و بسته‌بندی روغن**  
در این کارخانجات، روغن خام نباتی حاصل از کارخانجات  
روغن کشی به روش‌های مختلف تصفیه می‌گردد و بعضًا به منظور  
سهولت حمل و نقل یا انطباق آن با سلیقه مصرف‌کنندگان هیدروژنه  
می‌شود. یعنی از حالت مایع به حالت جامد درمی‌آید. سپس  
به روش‌های مختلف بسته‌بندی و وارد بازار مصرف می‌شود.  
کارخانه‌های تصفیه روغن و هیدروژنه کردن و بسته‌بندی عبارت‌اند  
از:

اتکای شماره ۱ (ورامین)، اتکای شماره ۲ (شهری)،  
اتکای شماره ۳ (گنجه و رودبار)، بهشهر (تهران)، پارس (تهران)،  
جهان (کرج)، مارگارین (شهری)، ناب (تهران)، نرگس شیراز  
(شیراز)، ناز اصفهان (اصفهان)، کشت و صنعت شمال (ساری)،  
فضل نیشاپور (نیشاپور)، شکوفه (بابل)، صنعتی شمال (بندر  
ترکمن)، پنبه گرگان (کردکوی)، گلنار (کرمان)، فریکو (سیرجان)  
و گلناب (اراک)

فکر کنید: آیا وجود کارخانجات روغن کشی در منطقه و  
یا نزدیکی آنها به مزارع، تأثیری بر زراعت گیاهان روغنی دارد؟

چگونه؟

گردن علمی و تهییه گزارش: از مراکز تحقیق، تولید و  
توزیع بذور آفتابگردان و نیز صنایع تبدیل و نگهداری فرآورده‌های  
غذایی مرتبط با آفتابگردان در منطقه خود بازدید کرده گزارشی  
تهییه و ارائه نمایید.

چنانچه ۱۰ درصد بذر احتیاطی به آن اضافه کنیم:

$$\text{کیلوگرم} = \frac{1}{10} \times ۷/۱۶$$

$$\text{کیلوگرم} = ۷/۸۷۶$$

۷/۸۷۶ کیلوگرم بذر در شرایطی است که کارنده، با دقت  
بسیار، بذر را در فواصل معین شده بکارد. هر گونه تغییر در این  
وضعیت مقدار بذر مصرفی را افزایش می‌دهد.

مسئله:

مقدار بذر مورد نیاز در زراعت آفتابگردان آجیلی را با

توجه به شرایط زیر، تعیین کنید:

الف - الگوی کاشت  $۳۰ \times ۶۰$  سانتیمتر

ب - وزن هزار دانه ۹۰ گرم

ج - قوه نامیه ۹۴ درصد

د - خلوص بذر ۹۸ درصد

(بذر احتیاطی را ۱۵ درصد در نظر بگیریم.)

فکر کنید: در چه شرایطی بذر احتیاطی را باید بیشترین

حد ممکن در نظر گرفت؟ چرا؟

## جمع‌آوری اطلاعات

- زارعین منطقه شما برای کاشت هر هکتار آفتابگردان

روغنی و آجیلی، چند کیلوگرم بذر در نظر می‌گیرند؟

- آیا آنچه زارعین در نظر می‌گیرند با آنچه شما محاسبه  
کرده‌اید، مطابقت دارد؟- در صورت عدم تطابق، دلایل خود را با نظرخواهی از  
زارعین منطقه و مریبان بررسی کنید.

## صنایع روغن در ایران

صنعت روغن‌بافی کشور، مجموعه‌ای از کارخانه‌های  
روغن کشی، تصفیه، هیدروژنه کردن و بسته‌بندی روغن نباتی را  
دربرمی‌گیرد. کارخانه‌های روغن کشی در کشور ما در حال حاضر

### پاسخ دهید

۱- ارزش غذایی آفتابگردان چگونه است؟

۲- نوع ریشه در آفتابگردان چیست؟

۳- گلهای زبانه‌ای آفتابگردان، نقش غیرمستقیمی در گرده افشاری دارند.

بلی  خیر

۴- تعداد زیاد گل در طبق در همه موارد مطلوب است.

بلی  خیر

۵- در آفتابگردان نوع میوه ..... است.

۱- تخمه ۲- خورجین ۳- فنده ۴- نیام

۶- خصوصیات مطلوب و بازار پسند در انواع آجیلی چیست؟

۷- کدام یک از ارقام زیر برای اغلب مناطق کشور مناسب تشخیص داده شده است؟

۱- رکورد ۲- آرمایرسکی ۳- زاریا ۴- ونیکت ۸۹۳۱

۸- عقد قرارداد تولید و تحويل، با شرکت کشت دانه‌های روغنی چه مزیتی دارد؟

<p>پیمانه مهارتی: شرایط و مناطق کشت آفتابگردان</p> <p>شماره شناسایی: ۲۱۲۱۰۱۱۹-۲</p>	<p>مهارت: کشت آفتابگردان</p> <p>شماره شناسایی: ۲۱۲۱۰۱۱۹</p>
---	---

## پیمانه مهارتی (۲)

# شرایط و مناطق کشت آفتابگردان

### هدف کلی

شناسایی شرایط و مناطق مناسب کاشت آفتابگردان

اهداف رفتاری: در پایان این پیمانه، فرآگیر باید بتواند :

- ۱- عوامل اقلیمی مناسب کاشت آفتابگردان را توضیح دهد.
- ۲- خاکهای مناسب کاشت آفتابگردان را تعیین نماید.
- ۳- نیاز کودی آفتابگردان را توضیح دهد.
- ۴- برنامه تناوب زراعی آفتابگردان را تنظیم کند.
- ۵- مناطق مناسب کاشت آفتابگردان را توضیح دهد.

## پیش آزمون

۱- آیا طول روز در تمام فصول سال در همه مناطق ثابت است؟ چرا؟

۲- به نظر شما درجه حرارت محیط با افزایش ارتفاع سطح دریا و دوری و نزدیکی به آن، چگونه تغییر می‌کند؟

۳- آیا بذور تمام گیاهان زراعی در درجه حرارت معینی شروع به جوانه زدن می‌نمایند؟

۴- صفر پایه یا بیولوژیکی و دمای حداکثر را تعریف کنید.

۵- چه رابطه‌ای بین دمای محیط، تبخیر و تعرّق منطقه و مصرف آب از سوی گیاهان وجود دارد.

۶- آیا بین خصوصیات شیمیایی خاک و نوع محصول رابطه‌ای برقرار است؟ مثال بزنید.

۷- نکات فنی قراردادن گیاهان در یک تناوب زراعی چیست؟ حداقل چهار مورد را نام ببرید.

۸- آیا بین واکنش گیاه نسبت به طول روز و تاریخ کاشت رابطه‌ای برقرار است؟ چگونه؟