

# دستگاه گردش خون

هدف کلی




شناخت دستگاه گردش خون طیور



هدفهای رفتاری

در پایان این فصل هنرجو باید بتواند:

- ۱- دستگاه گردش خون مرغ را تشریح کند.
- ۲- قسمت‌های مختلف دستگاه گردش خون مرغ را نشان دهد.
- ۳- ساختمان و نحوه فعالیت قلب را توضیح دهد.
- ۴- فیزیولوژی دستگاه گردش خون را بیان نماید.
- ۵- قسمت‌های مختلف دستگاه گردش خون طیور را نشان دهد.
- ۶- اعمال خون را در بدن نام ببرد.
- ۷- گردش خون عمومی بدن طیور و گردش خون ششی را تعریف کند.
- ۸- گلbulهای قرمز خون مرغ را مشاهده کند.




پیشآزمون


- ۱- چند نوع رگ در بدن طیور وجود دارد؟
- ۲- قلب طیور مشابه قلب کدام دسته از حیوانات است؟ (خزندگان، پستانداران، آبزیان) .
- ۳- چند نوع گردش خون در طیور وجود دارد؟



شکل ۵-۱ - قلب مرغ و موقعیت آن



شکل ۵-۲ - ساختمان قلب پرنده‌گان



شکل ۵-۳ - دریچه‌ای قلب پرنده‌گان

دستگاه گردش خون، انتقال مواد غذایی، گازهای تنفسی و مواد زائد در بدن طیور را بر عهده دارد. این دستگاه ارتباط بین بافت‌های مختلف بدن با دستگاه گوارش، دستگاه تنفسی و دستگاه دفع ادرار را برقرار می‌نماید.

## ۱-۵- آشنایی با دستگاه گردش خون

دستگاه گردش خون از قلب، خون و رگ‌های خونی تشکیل شده است.

**الف - قلب :** قلب در پرنده‌گان مخروطی شکل و به رنگ قرمز تیره و نسبتاً بزرگ است. (شکل‌های ۱-۵ و ۲-۵) قلب در حفره قفسه سینه و تقریباً در خط میانی بدن به موازات محور طولی قرار دارد. نوک قلب اندکی به سمت راست خمیده است. قاعده قلب که از دهلیزها و تنه رگ‌های بزرگ تشکیل شده است، به سمت پشت متمایل گشته و در سطح دومین دنده قرار دارد.

قلب عضو اصلی دستگاه گردش خون محسوب می‌شود. همانند یک پمپ در دستگاه گردش خون عمل می‌کند و سبب حرکت خون در رگ‌ها می‌شود. قلب به دو قسمت راست و چپ تقسیم می‌شود. هر قسمت نیز دارای یک دهلیز (حفره بالایی) و یک بطن (حفره پایینی) می‌باشد. بدین ترتیب قلب پرنده‌گان نیز شبیه قلب پستانداران چهار حفره‌ای است. بین دهلیز و بطن چپ دریچه دولتی قرار دارد و ارتباط دهلیز و بطن راست بوسیله دریچه سه لثی برقرار می‌شود. هیچ‌گونه ارتباطی بین دهلیزها و نیز بطن‌ها وجود ندارد. (شکل ۳-۵)


وزن قلب در پرندگان نسبت به وزن بدن نسبتاً زیاد

است. (جدول ۱-۵)

بطن چپ نوک قلب را تشکیل داده، از بطن راست بزرگتر بوده و دیواره کلفت‌تری دارد. دهلیز چپ کم حجم‌تر از دهلیز راست است و دارای دیواره ضخیم‌تری است.

جدول ۱-۵ - وزن قلب (درصد از وزن بدن)

کبوتر	بلدرچین	غاز	اردک	بوقلمون	مرغ	
۱-۱/۱	۰/۹	۰/۸	۰/۷۴ - ۰/۸۱	۰/۵	۰/۴۴	وزن قلب



شکل ۱-۵-۱ - ساختمان لایه‌های قلب



شکل ۱-۵-۲ - آبسامه قلب

تأمین انرژی لازم برای سوخت و ساز بدن که حرارتی بین ۴۰ تا ۴۲ درجه سانتی‌گراد دارد و نیز ضربان بسیار تندران، از دلالات بزرگی قلب می‌باشد.

ضربان قلب در ماکیان ۳۰۰ و در گنجشک ۵۰۰ تا ۸۰۰ ضربه در دقیقه است.

مجاورت با نور شدید، استرس و هیجان‌زدگی سبب افزایش ضربان قلب می‌شود. پرندگان کوچک‌تر ضربان قلب سریع‌تری دارند.

#### قلب از سه لایه تشکیل می‌شود :

۱- لایه خارجی<sup>۱</sup> : این پرده دور قلب چسبیده و لایه ماهیچه‌ای را در بر گرفته است.

۲- لایه ماهیچه‌ای<sup>۲</sup> : ماهیچه‌های قلب می‌باشند. ماهیچه‌ها در قسمت بطن‌ها ضخیم‌تر از قسمت دهلیزها می‌باشد.

۳- لایه داخلی<sup>۳</sup> : لایه نازکی است که سطح داخلی لایه ماهیچه‌ای را مفروش می‌سازد. دریچه‌های قلبی از این لایه سرچشم‌می‌گیرند. (شکل ۱-۵-۳)

آبسامه قلب : پرده‌ای است که دور قلب قرار گرفته و دو لایه دارد. لایه داخلی آن روی لایه خارجی قلب چسبیده است. بین دو لایه آبسامه مایع آبسامه وجود دارد که حرکات قلب را تسهیل می‌کند. (شکل ۱-۵-۴)



شکل ۶-۵ - رگ و گلوبولهای قرمز

گره‌ها به واسطه وجود دریچه‌هایی در داخل آنها می‌باشد. دیواره سیاهرگ‌ها معمولاً نازک و تا اندازه‌ای شفاف و انساط‌پذیر است. (شکل ۵-۷)

مجرای سیاهرگ‌ها بطور کلی بین‌تر از سرخرگ‌ها است ولی دیواره آنها نازک‌تر و رنگ آنها کدرتر می‌باشد. دیواره سیاهرگ‌ها نیز از سه لایه درونی، میانی و بیرونی تشکیل شده است. لایه میانی سیاهرگ‌ها که از بافت پیوندی بیشتری ساخته شده و نازک‌تر از لایه میانی سرخرگ‌ها است. از آنجایی که خون سیاهرگی فشار کمتری دارد و برای جلوگیری از پس رفت خون، دریچه‌هایی در این رگ‌ها وجود دارد. (شکل ۵-۷)

سیاهرگ‌ها نیز مانند سرخرگ‌ها دو دسته هستند.


## ب - رگ‌های خونی:

خون برای انجام کلیه وظایف خود از طریق سیستم بسته‌ای به نام رگ‌های خونی در گردش می‌باشد. سرخرگ‌ها، سیاهرگ‌ها و مویرگ‌ها سه نوع از رگ‌های خونی دستگاه گردش خون طیور محسوب می‌شوند. بطور کلی رگ‌هایی که خون را از قلب خارج می‌کنند، سرخرگ و رگ‌هایی که خون را به قلب باز می‌گردانند، سیاهرگ نامیده می‌شوند. (شکل ۶-۶)

سرخرگ‌ها دارای مقطع گرد و به شکل استوانه‌ای می‌باشند و همواره شکل خود را حفظ می‌کنند. دیواره سرخرگ از سه لایه درونی، میانی و بیرونی تشکیل شده است.

سرخرگ‌ها به دو دسته تقسیم می‌شوند. سرخرگ‌های گردش خون عمومی، حاوی خون روشن و سرخرگ‌های گردش خون ششی که حاوی خون تیره می‌باشند. سرخرگ‌ها معمولاً به صورت انشعابات دو شاخه‌ای در می‌آیند و شاخه‌های منشعب شده باریک می‌شوند. آخرین انشعابات بسیار نازک و کوچک بوده و قبل از مویرگ‌ها قرار دارند.

سیاهرگ‌ها موقعی که پر از خون باشند استوانه‌ای شکل هستند و هرگاه کشیده شوند به شکل گرهدار در می‌آیند. این



شکل ۷-۵ - مقطع سرخرگ و سیاهرگ

می‌دهد. اجزای مختلف پلاسما گازهای  $O_2$  و  $CO_2$ , پروتئین، نمک‌های غیر آلی و ویتامین‌ها می‌باشند. پلاسما وسیله‌ای برای انتقال سلول‌های خون و مواد شیمیایی می‌باشد. وظیفه مهم پلاسما ایجاد فشار اسمزی در خون است. پرندگان به کمک فشار اسمزی، انتقال آب از مویرگ‌ها به سلول‌های بدن را تنظیم می‌کنند.

### گلبول قرمز<sup>۲</sup>:


گلبول قرمز برای حمل اکسیژن تخصص یافته است و در پرندگان بیضی شکل و دارای هسته می‌باشد.

هموگلوبین جزء اصلی ساختمان گلبول قرمز است و از پروتئینی به نام گلوبین و ماده معدنی آهن تشکیل می‌شود. هموگلوبین، گلبول‌های قرمز را برای حمل اکسیژن توانا می‌سازد. مهمترین وظیفه گلبول قرمز انتقال اکسیژن است. این عمل نتیجه میل ترکیبی ضعیف آهن موجود در هموگلوبین با اکسیژن می‌باشد. هموگلوبین در گلبول قرمز قرار دارد و میوگلوبین در عضلات جهت ذخیره اکسیژن قرار گرفته است.

نخستین سلول‌های خونی بوسیله دیواره کیسه زرده بوجود می‌آیند. در دوران جنینی کبد و طحال گلبول‌های قرمز را تولید می‌کنند. در پرندگان بالغ این سلول‌ها در مغز استخوان تولید می‌شوند. طحال مخزن گلبول قرمز می‌باشد و محتویات خود را در دستگاه گردش خون تخلیه می‌کند. طول عمر گلبول قرمز از هنگام ورود به خون تا زمان مرگ آن در حدود ۲۱ روز می‌باشد. ولی در طیور به دلیل متابولیسم و فعالیت بیشتر حدود ۴۵ تا ۴۵ روز است.

تعداد گلبول قرمز بر حسب گونه، جنس، سن و ارتفاع محل زندگی متفاوت است. حدود سه میلیون گلبول قرمز در هر میلی‌لیتر مکعب از خون طیور وجود دارد. (تصویر ۵-۹)

سیاهرگ‌های گردش عمومی بدن حاوی خون تیره (دارای  $O_2$  بیشتر) و سیاهرگ‌های ششی که حاوی خون تمیز (دارای  $O_2$  بیشتر) می‌باشند. سیاهرگ‌ها به وسیله شاخه‌های کوچک و بسیار باریکی در دنباله مویرگ‌ها قرار می‌گیرند. سیاهرگ‌های کوچک به یکدیگر ملحق شده و رگ‌های بزرگ‌تری را تشکیل می‌دهند تا این که بوسیله رگ‌های اصلی به دهلیزها منتهی شوند. سرخرگ‌ها و سیاهرگ‌ها به وسیله شبکه‌ای از رگ‌های مویی که مویرگ نامیده می‌شوند به یکدیگر متصل می‌گردند. (تصویر ۸-۵)



شکل ۸-۵- شبکه مویی (مویرگی)

این رگ‌ها ظرف‌ترین دیواره را دارند. مواد غذایی و گازها با عبور از این دیواره بین سلول‌ها و خون جابجا می‌شوند.


### ج - خون :

خون در برگیرنده مایع پلاسما، سلول‌های خونی (گلبول قرمز، گلبول سفید و ترومبوسیت‌ها<sup>۱</sup>، قند، پروتئین، چربی، املاح و هورمون‌ها می‌باشد. رنگ خون سرخرگی که اکسیژن بیشتری دارد سرخ درخشان و بر عکس خون سیاهرگی که اکسیژن کمتری دارد قرمز تیره است. pH خون کمی قلیابی است (۷/۴).

### پلاسما :

قسمت بدون سلول خون لخته نشده یا مایع خون را پلاسما نامند. پلاسما ۵۵ تا ۷۰ درصد حجم خون را تشکیل

گلbul‌های سفید در مغز استخوان و غدد لنفاوی ساخته می‌شوند. اهمیت گلbul‌های سفید در مقابله با عوامل خارجی و عفونت‌ها است. (شکل ۱۰-۵)



شکل ۱۰-۵ - سلول‌های سفید خون


ترومبوسیت‌ها (پلاکت‌ها):  
شکل آنها از بیضی تا گرد متغیر است. در مغز استخوان و طحال تولید می‌شوند و نقش اساسی آنها در جلوگیری از خونریزی است.

#### فشار خون:

همانند انسان در برندگان نیز دو فشار خون سرخرگی و فشار خون برگشتی به قلب اندازه‌گیری می‌شود. فشار خون برندگان با واحد میلی‌متر جیوه بیان می‌شود. (جدول ۵-۲)

#### اعصاب قلب:

اعصاب قلب شامل عصب سینپاتیک و عصب واگ می‌باشد. عصب سینپاتیک افزایش دهنده ضربان قلب و عصب واگ سبب کاهش ضربان آن می‌شود.



شکل ۹-۵ - گلbul‌های قرمز هسته‌دار برندگان

## فعالیت عملی

یک قطره از خون مرغ را روی لام ریخته و لایه نازکی از آن را تهیه نمایید اکنون گلbul‌های قرمز را زیر میکروسکوپ مشاهده نمایید.

#### گلbul سفید<sup>۱</sup>:

تعداد گلbul‌های سفید بسیار کمتر از گلbul‌های قرمز است. این سلول‌ها هسته‌دار بوده و به اشکال مختلف دیده می‌شوند. وظیفه اصلی این سلول‌ها در ارتباط با سیستم‌های دفاعی بدن می‌باشد.

بسیاری از آنها ریزه‌خوار هستند بدین معنی که می‌توانند مواد ریز، مانند باکتری‌ها و قطعات سلول‌های تخرب شده را در خود فرو ببرند. برخی دیگر قادرند در اطراف محل عفونت تجمع کرده و مستقیماً به میکروب‌ها حمله کنند.

<sup>۱</sup> Leukocytes

## جدول ۲-۵ - فشار خون برخی از پرندگان اهلی (میلی متر جیوه)

فشار خون برگشت	فشار خون سرخرگی	
۱۳ - ۱۲۴	۱۴ - ۱۶	مرغ
۱۴۵ - ۱۵	۱۸ - ۱۹۵	خرس
۲	۲۵ - ۲۶	بوقلمون ماده
۲۲ - ۲۳	۲۹ - ۳	بوقلمون نر
۱۸	۱۷	اردک ماده
۱۴۵	۱۸	اردک نر


می‌دهد چرخه قلب نامیده می‌شود. عمل قلب دو مرحله دارد.

لوف:

### ۱- انقباض قلب<sup>۱</sup>:

در این مرحله انقباض دهلیزها و بطن‌ها اتفاق می‌افتد و خون از قلب خارج شده و به درون سرخرگ‌ها رانده می‌شوند. (مرحله ۱ و ۲ شکل ۵-۱۱)


لوف یک سیستم فرعی برای جذب مواد و مایعات بین سلولی به داخل جریان خون می‌باشد. همچنین لوف یکی از راه‌های اصلی جذب مواد (بویشه چربی‌ها) در دستگاه گوارش محسوب می‌شود. مهم‌ترین عمل رگ‌های لنفاوی خارج کردن ذرات بزرگ مواد تخریب شده بافت‌ها از فضای بین سلولی می‌باشد. ترکیب لوف شبیه پلاسمای است با این تفاوت که مقدار پروتئین در آن کمتر است. سیستم لوف در اکثریت طیور از مجرای لنفاوی و غدد لنفاوی تشکیل شده است و تمامی لوف موجود در نهایت به سیستم سیاهرگی می‌رسد. مجرای لنفاوی ابتدا به غدد لنفاوی می‌رسند که مانند صافی عمل کرده و مانع ورود مواد خارجی به جریان خون می‌شوند. در این غدد سلول‌های بیگانه‌خوار وجود دارد که قادر به هضم ذرات خارجی می‌باشند. علاوه بر این غدد لنفاوی قادر به ساختن مواد ایمنی نیز می‌باشند.



شکل ۵-۱۱ - انقباض و انبساط قلب

## ۵-۲ - آشنایی با فیزیولوژی دستگاه گردش خون چرخه قلب

مجموعه اعمالی که بدنبال هم در یک جریان کامل قلب رخ



## ۲- انبساط قلب :

این مرحله، مرحله استراحت عضلات قلب می‌باشد. همان‌طور که در مرحله سوم (شکل ۵-۱۱) مشاهده می‌کنید، ابتدا دهلیزها از خون پرشده و منبسط می‌شوند و سپس در مرحله چهارم بطن‌ها از خون پر می‌شوند که در مجموع انبساط را تشکیل می‌دهند.

### جهت حرکت خون در دستگاه گردش خون :

در هر چرخه قلبی خون اکسیژن‌دار از دهلیز چپ به بطن چپ وارد می‌شود. با انقباض بطن چپ، خون از قلب به سرخرگ آورت می‌رود. سپس با فشار به سرخرگ‌های کوچک و مویرگ‌ها رانده شده و به تمام اعضای بدن منتقل می‌شود. پس از استفاده سلول‌ها از اکسیژن و مواد شیمیایی و دفع  $\text{CO}_2$ ، خون بدون اکسیژن و  $\text{O}_2$  دار از طریق سیاهرگ‌ها به قلب باز می‌گردد. در این هنگام خون به دهلیز راست می‌ریزد. این بخش از گردش خون را **گردش خون عمومی** یا **گردش خون بزرگ** می‌نامند.

سپس خون از دهلیز راست به بطن راست وارد می‌شود و از آنجا به وسیله سرخرگ ششی به طرف ریه‌ها رانده می‌شود. در ریه‌ها پس از تبادلات گازی (دفع  $\text{CO}_2$  و گرفتن  $\text{O}_2$ )، خون به وسیله سیاهرگ ششی به دهلیز چپ وارد می‌شود. این بخش از گردش خون را **گردش خون ششی یا گردش خون کوچک** می‌نامند. در (شکل ۱۱-۵) گردش خون بزرگ و کوچک را مشاهده کنید.

در گردش عمومی، خون اکسیژن را به سلول‌ها رسانده و دی اکسید کربن را دریافت می‌کند و در گردش ششی، خون، دی اکسید کربن را به ریه پس داده و اکسیژن دریافت می‌کند.

### فیزیولوژی خون (اعمال خون) :

خون اعمال متعددی را در بدن طیور بر عهده دارد:

- ۱- اکسیژن را به سلول‌های بدن رسانده و دی اکسید کربن

### ۳-۵ مقایسه دستگاه گردش خون پرنده‌گان و پستانداران

قلب پستانداران و پرنده‌گان ساختمانی مشابه دارد. ولی مرغها به خاطر ظرفیت کم انتقال اکسیژن در خون، نیازهای بافت‌های خود را با بالا بردن عملکرد سیستم قلبی عروقی مثل جریان خون زیاد، افزایش فشار خون سرخرگی و افزایش سرعت قلب حفظ می‌کنند. بنابراین توده بطن چپ قلب در مقایسه با پستانداران بزرگ بوده و دهیز راست که به عنوان یک منبع ذخیره‌ای اصلی بکار می‌رود، نیز بزرگ‌تر از دهیز چپ است. (شکل ۵-۱۴)



شکل ۵-۱۴- مقایسه گردش خون پرنده‌گان و پستانداران با دوزیستان و ماهیان

مویرگ‌های خونی در طیور به مراتب کوچک‌تر از مویرگ‌های پستانداران است ولی دارای حجم بیشتری از خون و نیز دارای افزایش سطح و کارایی بالاتری در تبادل گاز می‌باشند. گلbul قرمز طیور بیضی شکل بوده و دارای هسته است. در خون طیور تعداد گلbul‌های قرمز نسبتاً کم (در حدود نصف تراکم آن در پستانداران) است ولی اندازه آنها بزرگ‌تر است. گلbul قرمز پستانداران فاقد هسته و به شکل دیسکی است که در وسط از دو طرف فرو رفتگی دارد.

در پرنده‌گان همانند پستانداران گردش خون عمومی بدنه با آئورت آغاز می‌شود و گردش خون ششی (کوچک) نیز با سرخرگ ششی شروع می‌گردد.

بسیار ظرف و نازکی در آمده است. سلول‌های دیواره مویرگی در بین خود دارای فواصل نسبتاً ریز و درشتی به منظور تبادلات مایعات و مواد غذایی می‌باشند. هدف وظیفه اصلی مویرگ‌ها، انتشار مواد غذایی و اکسیژن از دیواره آنها به داخل بافت‌ها و خروج مواد زاید و دی اکسید کربن از بافت‌های مویرگ‌ها می‌باشد.

#### گردش خون ششی:

گردش خون در شش‌ها به دلیل نقش آنها در تبادلات گازهای تنفسی از اهمیت خاصی برخوردار است. گازهای تنفسی بین مویرگ‌ها و سلول‌های شش‌ها (با توجه به مقدار فشار آنها در دو طرف دیواره رگ‌ها) جابجا می‌شوند.

در این حالت عملیات انجام شده کاملاً بر عکس تبادل گازها در سلول‌های بدن است و بدین ترتیب دی اکسید کربن به شش‌ها و اکسیژن به جریان خون منتقل می‌شود خون اکسیژن دار بوسیله سیاهرگ ششی به قلب می‌رود.

#### لخته شدن خون:

جلوگیری از خونریزی با لخته شدن خون و انقباض رگ صورت می‌پذیرد. برای لخته شدن ترومبوسیت‌ها به هم می‌چسبند و از طرفی یکی از پروتئین‌های خون به نام فیبرینوژن به رشته‌های فیبرین تبدیل می‌شود و موجب ایجاد یک شبکه توری وایجاد لخته می‌گردد. (شکل ۵-۱۳)



شکل ۵-۱۳- لخته شدن خون

اما بافت‌های لنفاوی اختصاصی در ارتباط با لوله گوارشی وجود دارند. تنها اردک و غاز از پرندگان اهلی غدد لنفاوی دارند.

سیستم لنفاوی طیور از نظر تکاملی بین سیستم‌های لنفاوی دوزیستان و پستانداران قرار می‌گیرد. مرغ‌ها قادر غدد لنفاوی مشخص مانند غدد لنفاوی پستانداران هستند.

## فعالیت عملی

### وسایل و تجهیزات لازم:

میز تشریح - قیچی جراحی دو لبه (تیز، کند) - پنس صحتی - دستکش - روپوش.

۱- با نظر مریبیان، در کلاس گروه‌بندی نمایید.

۲- دستکش‌ها را دست کنید و روپوش پوشید.

۳- مرغ را به پشت بر روی میز بخوابانید به نحوی که پاها به سمت خودتان باشد.

۴- انگشت شست را روی ران و سایر انگشتان را در پشت ران قرار دهید. با فشار انگشت شست ران‌ها را از بدن جدا کرده و پرنده را کاملاً به میز بچسبانید. در این حالت لشه مرغ کاملاً بر روی میز خوابیده باشد.

۵- با استفاده از قیچی دو لبه پوست ناحیه سینه را جدا کنید. در این هنگام عضلات سینه باید دیده شود.

۶- با استفاده از قیچی، دو برش کاملاً موازی دندنه‌ها، به سمت عقب و در کنار قفسه سینه ایجاد کنید. با دست قفسه سینه را به سمت بالا بکشید. اکنون محوطه بطنی در اختیار شماست. (شکل ۵-۱۵)

۷- محتویات محوطه بطنی را تخلیه کنید. برای جدا کردن قسمت صدری (قلب و ریه) باید آنها را از دندنه‌ها کاملاً جدا کنید.


۸- برای جدا کردن قلب با قیچی دو لبه، از ۳ سانتی متر بالاتر از قلب رگ‌های اصلی را برش دهید.

۹- قلب را همراه با سرخرگ‌ها و سیاهرگ‌های متصل به آن از لشه خارج نمایید.

۱۰- برای تهیه نمونه از سرخرگ‌ها و سیاهرگ‌ها آنها را از ناحیه متصل به قلب، از قلب جدا کنید.

۱۱- سرخرگ و سیاهرگ را با یکدیگر مقایسه نمایید.


۱۲- قلب را برش داده و دھلیزها، بطن‌ها و دریچه‌های دولتی و سه لته را مشاهده نمایید.



شکل ۵-۱۵ - محوطه بطنی مرغ

## آزمون پیمانه مهارتی ۵

- ۱- اهمیت دستگاه گردش خون را بیان نمایید.
- ۲- اعمال خون را شرح دهید.
- ۳- کار اصلی آبشارمه قلب چیست؟
- ۴- رگ‌های خونی از چند لایه تشکیل شده است؟
- ۵- وظیفه مهم پلاسمما چیست؟
- ۶- نقش اصلی ترومبوسیت‌ها چیست؟
- ۷- دستگاه گردش خون از ... و ... و ... تشکیل شده است.
- ۸- چرا قلب در پرندگان نسبتاً بزرگ است؟
- ۹- وظیفه اصلی گلbul سفید ... می‌باشد.



# دستگاه تنفس

هدف کلی

شناخت دستگاه تنفس طیور




## هدف‌های رفتاری

در پایان این فصل هنرجو باید بتواند:

۱- ساختمان دستگاه تنفس طیور را بشناسد.

۲- فیزیولوژی دستگاه تنفسی طیور را توضیح دهد.

۳- قسمت‌های مختلف دستگاه تنفس طیور را نشان دهد.




## پیش آزمون

۱- کیسه‌های هوایی در مرغ چند عدد است؟

۲- پرندگان گرمای بدن خود را اغلب به چه صورت خارج می‌سازند؟

۳- بینی طیور در کدام قسمت نوک قرار دارد؟



شکل ۱-۶ - دستگاه تنفس طیور

تنفس واقعی شامل انتقال اکسیژن مورد نیاز به سلول‌های بدن و بازگرداندن دی‌اکسید کربن حاصل از فعالیت سلول‌ها به خارج از بدن می‌باشد. انرژی مورد نیاز در طیور از ترکیب اکسیژن و مواد غذایی بدست می‌آید. در سلول‌های بدن، مواد غذایی مانند قندهای ساده، اکسید شده و انرژی و دی‌اکسید کربن آزاد می‌کنند. دی‌اکسید کربن تولید شده توسط دستگاه تنفس دفع می‌شود.

در تکسلولی‌ها تنفس به سادگی انجام می‌شود زیرا سلول در مجاورت هوا قرار دارد. اما از آنجایی که در طیور سلول‌ها دسترسی مستقیم به هوا ندارند، آنها نمی‌توانند به مکانیسم ساده انتشار برای تبادل گازهای تنفسی بین بافت‌های بدن و محیط، متکی باشند. بدین لحاظ در بدن طیور از مکانیسم پیچیده‌تری استفاده می‌شود که در بخش فیزیولوژی دستگاه تنفس با آن آشنا خواهید شد.

## ۱-۶ - آشنایی با ساختمان دستگاه تنفس

قسمت‌ها مختلف دستگاه تنفس طیور عبارت اند از: بینی، حفره‌های بینی، حنجره، نای، جعبه صوتی، نایزه‌ها، شش‌ها، کيسه‌های هوایی و استخوان‌های خاصی که محتوى هوا هستند. (شکل ۶-۱)

**الف - بینی<sup>۱</sup>**: بر روی نوک بالایی و بصورت دو سوراخ که دارای لبه می‌باشد وجود دارد.

**ب - حفره‌های بینی<sup>۲</sup>**: از لایه‌های ماریچی تشکیل شده که هوا را تا حدودی تصفیه و مهم‌تر از آن گرم می‌کند. (شکل ۶-۲)



شکل ۶-۶ - حفره‌های بینی

در انتهای نای جعبه صوتی قرار دارد. (تصویر ۴-۶) جعبه صوتی محفظه‌ای غضروفی است که نقش عمداتی در تولید صدا در طیور را برعهده دارد.

پس از جعبه صوتی نای به دو نایزه انشعاب می‌یابد. نایزه‌ها پس از ورود به شش‌ها به انشعابات کوچک‌تری به نام نایزک تقسیم می‌شوند (شکل ۶-۴) پرندگان برده دیافراگم ندارند.

#### هــ شش‌ها :

طیور دو شش سبتاً کوچک به رنگ قرمز روشن دارند که در شکل واندازه همانند بوده و شش چپ و راست نامیده می‌شوند.

شش‌ها بافت اسفنجی و نرمی دارند. گستره هر شش در جهت جلو - عقب بین نخستین یا دومین دنده تا آخرین دنده است. شش‌ها در حفره ششی که فضایی کاملاً فرینه دارد و حجم آن با دم یا بازدم اندازی تغییر می‌کند، قرار دارند. نایزه‌های اصلی همراه با رگ‌های خونی به هر یک از شش‌ها وارد می‌شوند. از هر یک از نایزه‌های اصلی چهار نایزه ثانوی منشعب می‌گردد. این نایزه‌ها به قسمت‌های مختلف شش‌ها و بخش‌هایی از کیسه‌های هوایی می‌روند. (شکل ۵-۶)

جــ حنجره<sup>۱</sup> : حنجره مجموعه‌ای غضروفی است که بویژه در هنگام بلع از ورود مواد خارجی به نای جلوگیری می‌کند. حنجره، قلبی شکل بوده و در انتهای حلق قرار دارد، هوا پس از ورود از بینی به حنجره و سپس به نای می‌رود. (شکل ۶-۳)



شکل ۳-۶ - نای، حنجره و موقعیت آن

دــ نای : نای در ادامه حنجره است و در سطح پشتی مری ادامه می‌یابد. نای در ماکیان از سطح پشتی چینه‌دان نیز می‌گذرد و وارد حفره سینه‌ای شده و به دو نایزه اصلی تقسیم می‌شود. (شکل ۶-۴)



شکل ۵-۶ - شش مرغ



شکل ۶-۶ - جعبه صوتی<sup>۲</sup> و نایزه‌ها

## ۶-۲- فیزیولوژی دستگاه تنفس

دستگاه تنفس طیور به عنوان یک سیستم تبادل گازهای تنفسی (اکسیژن و دی اکسید کربن) در بدن عمل می‌نماید. تبادل گاز در مویرگ‌های نشی انجام می‌شود.

بدین ترتیب اکسیژن وارد خون شده و با حرکت از میان دیواره مویرگ‌ها به سلول‌های بدن می‌رسد. گاز دی اکسید کربن مسیر معکوس اکسیژن را طی می‌نماید.

مهم‌ترین وظایف دستگاه تنفس طیور عبارتند از:

- ۱- اکسیژن مورد نیاز بدن را تأمین می‌کند.
- ۲- دی اکسید کربن اضافه بدن را دفع می‌کند.
- ۳- حرارت اضافه بدن را خارج می‌کند.
- ۴- به ایجاد صوت کمک می‌کند.

**دم و بازدم:**

دم به وسیله انساط ماهیچه‌های شکمی و سینه‌ای انجام می‌شود.

این ماهیچه‌ها حفره کلی بدن را منبسط کرده و بدین وسیله هوا را به داخل می‌کشند. در بازدم عادی ماهیچه‌ها دخالت ندارند و حفره بدنی در اثر خاصیت ارتجاعی و رهاشدن به وضعیت اولیه باز می‌گردد.

**تبادل گازها:**

در انتهای مجاری هوایی درون شش‌ها، فاصله بین خون مویرگی و هوا به حداقل می‌رسد (چند میکرون). این ناحیه غنی‌ترین بستر مویرگی را در بین بافت‌های بدن دارا می‌باشد. انتقال گازهای اکسیژن و دی اکسید کربن از مویرگ‌های نشی و همین‌طور از مویرگ به سلول‌های بدن عمدتاً بر اثر قانون انتشار صورت می‌گیرد.

بدین نحو که این گازها از محیط پرسشار یا پر تراکم به محیط کم تراکم انتقال می‌یابند. به طور کلی انتشار دی اکسید کربن به خارج از خون اندکی راحت‌تر از ورود اکسیژن به آن صورت می‌گیرد.


ساختمان شش در طیور بدليل وجود کیسه‌های هوایی به آنها امکان می‌دهد با وجود فضای اندک شش‌ها، تبادلات گازی زیادی داشته باشند. شش‌ها مسئول تبادل گازهای تنفسی و کیسه‌های هوایی مسئول تهویه نشی دم و بازدم می‌باشند.

**و- کیسه هوایی:**

کیسه‌های هوایی یکی از ویژگی‌های دستگاه تنفس طیور می‌باشد. کیسه‌های هوایی به شش‌ها متصل‌اند و در خلال تکامل از آنها بوجود می‌آیند. کیسه‌های هوایی شبکه خون‌رسانی ضعیفی دارند که شاهدی بر عدم دخالت آنها در تبادلات گازی است. بطور کلی کیسه‌های هوایی در کاهش وزن مخصوص طیور دخالت دارد. نخستین وظیفه این کیسه‌ها جبران ظرفیت اندک شش‌ها با کمک از طریق دمیدن هوا برای شش‌ها است. علاوه بر این در تنظیم درجه حرارت بدن و در تولید صدا نیز نقش دارند.

مرغ دارای ۹ کیسه هوایی است، یک جفت در ناحیه شکمی، دو جفت در ناحیه سینه و یک جفت در پایین‌تر از گردن قرار گرفته‌اند. یک کیسه هوایی منفرد در قسمت میانی بدن در نزدیکی ترقوه قرار دارد.

بزرگ‌ترین کیسه هوایی در مرغ کیسه هوایی شکمی و در اردک کیسه هوایی سینه‌ای عقبی می‌باشد. (شکل‌های ۶-۱ و ۶-۶)



شکل ۶-۶- دستگاه تنفسی مرغ (نای، نایزه، شش و کیسه‌های هوایی)

این پدیده کترلی سبب ایجاد تعادل در بدن می‌شود. مرکز تنفس به تغییرات فشار دی اکسیدکربن نسبت به فشار اکسیژن بسیار حساس‌تر است. کاهش اکسیژن در صورتی بر تنفس اثر می‌گذارد که بسیار شدید باشد.

#### عملکرد تنفسی :

از شاخص‌های زیادی برای عملکرد شش‌ها استفاده می‌شود. مرسوم‌ترین این شاخص‌ها سرعت تنفس یا تعداد تنفس در دقیقه است. در جدول ۱-۶ سرعت تنفس در گونه‌های مختلف را مشاهده می‌کنید.

#### تنفس و حرارت اضافی :

تنفس به دو روش در تنظیم حرارت بدن شرکت دارد.

- ۱- روش هدایتی یا جریان مستقیم حرارتی : که طی آن هوای ورودی از اتمسفر تا حد درجه حرارت بدن گرم می‌شود.
- ۲- روش تبخیری : که با تبخیر کردن رطوبت موجود در مجاري هوایی برای کاهش دمای بدن خود استفاده می‌کنند.

در مرغ غدد عرق وجود ندارد، لذا دفع تبخیری حرارت اهمیت بیشتری پیدا کرده است. طیور باله زدن، دفع حرارت از طریق تنفس را افزایش می‌دهند.

#### تنظیم عصبی تنفس :

در حالت عادی فعالیت تنفسی به طور تقریباً غیر ارادی کنترل می‌شود.

مرکز تنفس در بصل النخاع قرار دارد. این مرکز تناوب فعالیت تنفسی شامل مرحله فعل دم و مرحله غیر فعل بازدم را هدایت می‌کند و سرعت و عمق تنفس را نیز تنظیم می‌نماید.

پیام‌هایی که از شش‌ها به مرکز تنفسی ارسال می‌شود موجب افزایش و یا کاهش فعالیت مرکز تنفسی می‌گردد. مرکز تنفسی در بصل النخاع به شدت به پیام‌های رسیده از ترکیب گازهای خونی حساس‌ستند و به آن عکس العمل نشان می‌دهند و در صورت افزایش گاز مضر، تنفس را افزایش می‌دهند.

#### تنظیم شیمیایی تنفس :

هرگاه مقدار دی اکسید کربن خون افزایش یابد، pH خون کاهش می‌یابد که محرك واقعی برای گیرنده‌های شیمیایی دستگاه تنفس می‌باشد و تنفس را افزایش می‌دهد.

در این حالت دفع دی اکسید کربن افزایش و فشار آن در خون کاهش می‌یابد. در نتیجه تحریک گیرنده‌های شیمیایی دی اکسید کربن نیز کاهش می‌یابد.

جدول ۱-۶ - سرعت تنفس در گونه‌های مختلف (تعداد تنفس در دقیقه)

مرغ	اسب	گاو	انسان	سرعت تنفس
۱۲-۲۵	۸-۱۶	۱۲-۲۸	۱۲-۳	

## فعالیت عملی

### وسایل و تجهیزات لازم:

میز تشریح، قیچی جراحی دولبه (تیز، کند)، قیچی استخوانبر، پنس شصتی، دستکش و روپوش.

۱- با نظر مریبیان در کلاس گروه‌بندی شوید.

۲- دستکش‌ها را به دست کنید و روپوش بپوشید.

۳- هر گروه یک مرغ را به پشت روی میز تشریح بخواباند (به نحوی که پاهای به سمت خودتان باشد).

۴- انگشت شست را روی قسمت ران و سایر انگشتان را پشت ران قرار دهید. با فشار انگشت شست ران را از بدن جدا کرده و پرنده را کاملاً به میز بچسبانید. در این حالت باید لاشه مرغ کاملاً بر روی میز خوابیده باشد.

۵- با استفاده از قیچی دو لبه پوست ناحیه سینه را جدا کنید. در این هنگام عضلات سینه باید دیده شود.

۶- با استفاده از قیچی دو برش کاملاً موازی دندنهای به سمت عمق در کنار قفسه سینه ایجاد کنید. با دست قفسه سینه را به سمت بالا بکشید. اکنون محوطه بطنی در اختیار شماست.

۷- برای جدا کردن قسمت صدری (قلب و ریه) باید آنها را کاملاً از اندام‌ها جدا کنید.

۸- ریه‌ها را با استفاده از پنس وبا احتیاط از داخل حفرات دندنهای خارج کنید.

۹- سر مرغ را به یک طرف بخوابانید و با استفاده از قیچی پوست گردن را از کنار گوش برش بدھید.

۱۰- برش را تا محل قفسه سینه ادامه دهید و پوست را از ناحیه گردن جدا کنید. در این حالت باید نای و مری را مشاهده کنید.

۱۱- با استفاده از قیچی استخوانبر، استخوان قفسه سینه را ببرید.

۱۲- نای را از قسمت بالایی با استفاده از قیچی لبه کند جدا کنید و در قسمت پایین از قفسه سینه خارج کنید.

۱۳- جعبه صوتی را در ناحیه تبدیل نای به نایزه مشاهده کنید.

۱۴- ریه و نای و نایزه‌ها را از لاشه مرغ خارج نموده و دقیق‌تر مشاهده کنید.

## آزمون پیمانه مهارتی ۶

- ۱- اهمیت دستگاه تنفس در طیور را شرح دهید؟
  - ۲- قسمت‌های مختلف دستگاه تنفس طیور را نام ببرید؟
  - ۳- وظایف دستگاه تنفس طیور را بیان نمایید؟
  - ۴- تنفس چگونه در تنظیم حرارت بدن شرکت می‌نماید؟
  - ۵- تعداد کیسه‌های هوایی در مرغ چه تعدادی است؟
- الف) ۷      ب) ۸      ج) ۹      د) ۱۰



# دستگاه ادراری

هدف کلی


شناخت دستگاه ادراری طیور



## هدف‌های رفتاری

در بیان این فصل هنرجو باید بتواند:

- ۱- ساختمان دستگاه ادراری را توضیح دهد.
- ۲- وظایف دستگاه ادراری را بیان نماید.
- ۳- قسمت‌های مختلف دستگاه ادراری را نشان دهد.



## پیش آزمون

- ۱- واحد عمل در کلیه‌ها چیست؟
- ۲- سه وظیفه اصلی کلیه چیست؟
- ۳- غدد نمکی در اردک وجود دارد یا مرغ؟

در این پیمانه نقش کلیه در دفع مواد زائد و ایجاد تعادل بین یون‌های سدیم و پتاسیم خون و مایعات خارج سلولی مورد بررسی قرار می‌گیرد.

## ۱-۷- ساختمان دستگاه ادراری



شکل ۱-۷- موقعیت کلیه مرغ در بدن



شکل ۲-۷- کلیه مرغ

دستگاه ادراری طیور از یک جفت کلیه و یک جفت میزانی (حالب) که به حالت متقارن قرار گرفته‌اند، تشکیل شده است. کلیه:

کلیه اندام کشیده‌ای است که در حفره‌های موجود در محل اتصال استخوان‌های لگن قرار دارد.



در تصاویر ۱-۷ و ۲-۷ کلیه مرغ را مشاهده کنید.

وزن کلیه در ماکیان ۵ تا ۶ گرم یا در حدود ۰/۲۱ تا ۰/۲۸ درصد از وزن بدن است. طول آن ۷ تا ۱۰ سانتی‌متر و عرض آن ۱/۳ تا ۱/۵ سانتی‌متر می‌باشد.

سطح شکمی کلیه صاف و سطح پشتی آن برجستگی‌های دارد که ناشی از نزدیکی به ستون مهره‌ها است. علاوه بر قرار گرفتن در حفره استخوان‌ها، این اندام بوسیله رگ‌های خونی که از آن می‌گذرند و شاخه‌های شبکه عصبی کمری و نشیمنگاهی که به درون آن می‌روند، در جایگاه خود ثابت شده است. بدین لحاظ خارج کردن کلیه به صورت سالم دشوار است. رنگ کلیه بسته به مقدار خون آن از صورتی کم رنگ تا قرمز مایل به قهوه‌ای متغیر است.

واحد عمل در کلیه‌ها نفرون می‌باشد. تعداد نفرون‌های پرنده‌گان در مقایسه با پستانداران بسیار زیاد است.

هر کدام از نفرون‌ها از یک جسمک کلیوی و یک لوله تشکیل شده است. جسمک کلیوی در برگیرنده شبکه مویرگی و کپسول گلومرولی است. شبکه مویرگی در میان یک رگ آورنده خون (آوران) و یک رگ برنده خون (وابرا) قرار گرفته است و توسط کپسول گلومرولی دو جداره‌ای احاطه می‌شود. بین لایه درونی ویرونی در کپسول فضایی وجود دارد که ادرار اولیه در آن




شکل ۷-۳ - نفرون و مجرای جمع کننده ادرار در مخروط میانی کلیه طیور

جريان می‌یابد. ادرار از این فضا به درون لوله‌های نفرون می‌ریزد کلیه‌های پرندگان دارای دو نوع نفرون می‌باشند. نفرون‌های ساده (قشری)، لوله بسیار صافی دارند که تنها سه یا چهار بار روی خود تا می‌خورند و در قسمت قشری کلیه قرار دارند.

در نفرون‌های پیچیده‌تر (مرکزی)، طول لوله بیشتر است و این نفرون‌ها دارای قوس هنله می‌باشند. نفرون‌های دارای قوس هنله در قسمت مرکزی کلیه قرار دارند. مجاري جمع‌آوری کننده، ادرار هر دو نوع نفرون‌ها را تحیله می‌کنند. لوله‌های جمع‌کننده ادرار و قوس هنله به صورت موازی با یکدیگر در غلافی قرار می‌گیرند و قسمتی از مخروط میانی را تشکیل می‌دهند. ( تصاویر ۷-۳ و ۷-۵ )



هر یک از مخروط‌ها در انتهای به یکی از شاخه‌های میزانی تبدیل می‌شوند. تعداد مخروط‌ها برای هر گونه از طیور ثابت است و با گونه‌های دیگر بسیار متفاوت می‌باشد. محتويات مجاري



پالایش می کند. بیشتر از ۹۰٪ آب پالایش شده به همراه قندهای ساده والکترولیت ها مجدداً از نفرون ها جذب شده و به خون باز می گرددند. این فرایند موجب می شود که کلیه ها از اعضاء بسیار مهم حفظ تعادل داخلی بدن محسوب گرددند و میزان آب بدن و مواد محلول در آن را در حد نسبتاً ثابتی حفظ کند. در تصویر (۷-۶)



شکل ۷-۵- انواع نفرون



شکل ۶-۷- ساختمان و نحوه عمل نفرون

جمع کننده ادرار به میزنای می ریزد و میزنای ادرار را به قسمت میانی کلواک برای دفع انتقال می دهد. در مقایسه با پستانداران، طیور فاقد مثانه ولگنچه کلیوی هستند. کلیه از سه قسمت (لوب) تشکیل شده است. این سه قسمت شامل لوب های جلویی، میانی و عقبی می باشد. در تصاویر (۷-۲، ۷-۴ و ۷-۱) سه قسمت کلیه را مشاهده نمایید. سه سرخرگ اصلی کلیه سرخرگ های جلویی، میانی و عقبی می باشند. سرخرگ جلویی مستقیماً از آئورت منشأ می گیرند و بخش جلویی کلیه را خون رسانی می کنند سرخرگ های میانی و عقبی به بخش های میانی و عقبی کلیه خون می رسانند. پرندگان دارای سیستم باب کلیوی می باشند. در این سیستم خون توسط سیاهرگ های باب کلیوی به کلیه حمل می شوند.


## ۷-۷- فیزیولوژی کلیه

کلیه سه وظیفه پالایش، باز جذب و ترشح را بر عهده دارد که بر عهده نفرون ها می باشد. یون های سدیم و بتاسیم مهم ترین الکترولیت های بدن محسوب می شوند.


محصول نهایی سوخت و ساز پروتئین ها در طیور نیز اسید اوریک می باشد. در نفرون ها اسید اوریک، الکترولیت ها و قند ساده به همراه مقدار زیادی آب از خون پالایش یا تصفیه می شوند.

لازم است بدانید برخی از مواد بطور کامل پالایش یا تصفیه می شوند اگرچه مقدار آنها در خون بسیار کم باشد. اسید اوریک از جمله این مواد است.

برای انجام عمل پالایش، فشار سرخرگی مورد نیاز باید بیشتر از فشار غشاء گلومرولی باشد. بدین ترتیب راندن مایعات از عروق خونی به داخل نفرون امکان پذیر می شود. در مدت ۲۴ ساعت، کلیه های ماکیان تقریباً ۶ لیتر مایع را



شکل ۷-۷ - کریستال‌های اسید اوریک



شکل ۷-۸ - غدد نمکی در اردک

نحوه عمل نفرون را ملاحظه کنید.


سلول‌های موجود در لوله‌های نفرون برای انجام فعالیت‌های باز جذب نیاز به مصرف انرژی دارند. فعالیت باز جذب حتی در روی موادی که غلظت آنها در خون چندین برابر بیشتر از ادرار است نیز صورت می‌گیرد. بنابراین پدیده باز جذب تنها یک فرایند ساده نیست.

ادرار به شکل غلیظ شده با مدفع آمیخته و دفع می‌شود. در این حالت اسید اوریک به رنگ سفید بر روی مدفع قرار دارد. غلظت اسید اوریک در ادرار بسیار زیاد است و ۵۲ تا ۸۸ درصد کل نیتروژن ادرار را در مرغ و اردک تشکیل می‌دهد.

(شکل ۷-۷)

#### دفع خارج کلیه‌ای نمک:

غده نمکی: غدد خاصی در برخی طیور وجود دارد که آنها را قادر می‌سازد مقدار زیادی نمک دفع کنند. این غدد معمولاً در بینی قرار دارد ولی در برخی گونه‌ها بر روی قسمت فوقانی سر قرار گرفته است. (شکل ۷-۸)



شکل ۷-۹ - ساختمان غده نمکی

اردک، غاز، شترمرغ و کبک دارای این نوع غدد می‌باشند، در طیوری که فاقد این غدد می‌باشند نمک صرفاً توسط کلیه‌ها ترشح، باز جذب و دفع می‌گردد. مرغ و کبوتر فاقد غده نمکی می‌باشند و مقدار نمک بدن آنها توسط کلیه‌ها تنظیم می‌گردد.

غده نمک یک کانال مرکزی دارد. تعدادی مجرای ترشحی به صورت شعاعی از آن جدا می‌شوند که بوسیله سرخرگ و سیاهرگ‌های کوچک احاطه شده و انتهای آنها مسدود است. نمک اضافی از جریان خون خارج و به مجرای ترشحی و در نهایت به کانال مرکزی انتقال می‌باید. (تصویر ۷-۹) ترشحات غدد نمکی تحت تأثیر درجه حرارت قرار دارد و در پاسخ به افزایش حرارت محیط اتفاق می‌افتد.

## فعالیت عملی



- ۱ - لشه مرغ را تشریح کنید.
- ۲ - با خالی کردن امعاء و احساء کلیه‌های مرغ و اتصالات آن پیدا کنید.
- ۳ - اکنون با جدا کردن کلیه‌ها، حالب‌ها (میزانی‌ها) اعصاب و رگ‌های خونی کلیه‌ها به مشاهده آن پردازید.
- ۴ - به دلیل ظرافت اعضاء فوق کار تشریح را با دقت انجام دهید.

## آزمون پیمانه مهارتی ۷

۱- دستگاه ادراری طیور از یک جفت ... و یک جفت ... تشکیل شده است.

۲- کدام پرنده فاقد غدد نمکی می باشد؟

الف) شترمرغ      ب) اردک      ج) مرغ      د) غاز

۳- ساختمان غدد نمکی را توضیح دهید؟

۴- ساختمان نفرون را شرح دهید؟

۵- محصول نهایی سوخت و ساز پروتئین‌ها در طیور چیست؟

۶- کدام ماده بطور کامل در کلیه‌ها پالایش می شود؟

الف) اسید اوریک      ب) قند ساده      ج) سدیم      د) پتاسیم

۷- چرا کلیه یکی از اعضای بسیار مهم حفظ تعادل داخلی بدن محسوب می شود؟

