


نامعادلات درجه اول




اگر گلوله‌ای را به نخی آویزان کنیم، معمولاً نخ گلوله را نگه می‌دارد. اما با افزایش وزن گلوله، جایی می‌رسد که نخ پاره می‌شود. این مقدار وزن مربوط به چگونگی نخ است.


با دانستن قدرت تحمل نخ می‌توانید آن مقادیری از وزن گلوله‌ها را که نخ تحمل می‌کند بنویسید.

نامساوی


حسن آقا یک خواربارفروشی دارد. او برای به دست آوردن وزن اجناس از یک ترازوی دو کفه‌ای به شکل زیر استفاده می‌کند.




اما، معمولاً وزن اجسام، با استفاده از وزنهایی که حسن آقا در اختیار دارد به طور دقیق قابل تعیین نیستند و با هرگونه وزنه‌گذاری روی کفه‌های ترازو، هر دفعه یک طرف سنگین‌تر می‌شود. روزی او برای تعیین وزن بسته‌ای، حدس زد این بسته حدوداً ۳ کیلوگرم وزن دارد و سه وزنه یک کیلوگرمی در یک کفه قرار داد و بسته را در کفه دیگر قرار داد. کفه ترازو در طرف وزنهای، پایین آمد و حسن آقا نتیجه گرفت بسته سبک‌تر است و وزن بسته کمتر از ۳ کیلوگرم است.



اگر وزن بسته را x بنامیم، بیان ریاضی وضعیت ترازو در شکل بالا به صورت $3 < x$ است. در مرحله دوم حسن آقا یک وزنه یک کیلوگرمی در کفه مربوط به بسته قرار داد، و با این عمل، کفه مربوط به بسته پایین رفت.



بیان ریاضی این وضعیت ترازو به صورت $1 + x < 3$ است. اگر از طرفین این ترازو یک وزنه یک کیلوگرمی برداریم، وضعیت ترازو تغییر نمی‌کند و نتیجه می‌شود $x < 2$.



این عمل به معنای آن است که از طرفین نامساوی $1 + x < 3$ عدد ۱ را کم کرده‌ایم و نامساوی به همان شکل برقرار مانده است.

وضعیت ترازو به هر شکلی که باشد، اگر از طرفین ترازو وزن یکسانی را برداریم یا اضافه کنیم، وضعیت ترازو تغییر نمی‌کند. بیان ریاضی این مطلب به صورت زیر است.

$$\begin{aligned} \text{اگر } a + c < b + c, \text{ آن‌گاه } a < b \\ \text{اگر } a - c < b - c, \text{ آن‌گاه } a < b \end{aligned}$$

نامساوی کوچکتر یا مساوی

یک روز، معلم از ناهید خواست فهرست نام همکلاسی‌های خود را که با او هم‌قد هستند یا از او کوتاه‌تر هستند، تهیه کند. پس از این کار، معلم از ناهید خواست، مجموعه این شاگردان را به زبان ریاضی بنویسد. ناهید پس از کمی فکر گفت: اگر مجموعه همه دانش‌آموزان کلاس را با M نشان دهیم، چون قد من ۱۴۷ سانتی‌متر است این مجموعه را به شکل زیر می‌توان نوشت.

$$\{x \in M \mid \text{قد}(x) < 147\}$$

معلم از دانش‌آموزان کلاس پرسید: آیا این مجموعه، همه همکلاسی‌های ناهید که با او هم‌قد هستند یا از او کوتاه‌تر هستند را نشان می‌دهد؟

زهره گفت: خود ناهید در این مجموعه نیست چون قد او ۱۴۷ سانتی‌متر است و هیچ عددی از خودش کمتر نیست.

ناهید گفت: درست است. کسانی که با من هم‌قد هستند در این مجموعه نیستند. تعریف را باید اصلاح کنیم.

بهتر است این مجموعه را به صورت زیر بنویسیم.

$$\{x \in M \mid x < 147\} = \{x \mid x < 147\}$$

معلم گفت: اگرچه تعریف ناهید از این مجموعه درست است. این رابطه‌ای که ناهید آن را به کار برد است نوعی نامساوی است که آن را نامساوی «کوچکتر یا مساوی» می‌نامند. برای بیان کوچکتر بودن یک عدد از عدد دیگر از نماد « \leq » استفاده می‌کردیم. برای بیان «کوچکتر یا مساوی» بودن یک عدد از یک عدد دیگر از نماد « \geq » استفاده می‌شود. برای بیان این که عدد a از عدد b کوچکتر یا مساوی است، می‌نویسیم $b \leq a$. جمله $a \leq b$ ، به معنای آن است که یکی از دو حالت $b < a$ یا $b = a$ برقرار است.



دلیل درستی یا نادرستی هریک از نامساوی‌های زیر را بیان کنید.

الف) $3 \leq 2$ ب) $3 \leq 3$ ج) $3 \leq 4$

مثال: اگر n یک عدد طبیعی باشد به طوری که $n > 1$ آنگاه $n \leq 2$.

مثال: $\{n \in \mathbb{N} \mid n \leq 5\} = \{1, 2, 3, 4, 5\}$

نامعادلات



آقای صالحی می‌خواست خانه‌اش را رنگ کند. او که فقط ۱۰ روز برای این کار وقت داشت با یک نقاش قرارداد بست که حداقل در ۱۰ روز، خانه را رنگ بزند و تحويل دهد.

۱- اگر کار نقاش x روز طول بکشد، بازای چه مقادیری از x ، نقاش به قرارداد عمل کرده است؟



- ۲- اگر کار نقاش ۱۱ روز طول بکشد، آیا او توانسته است به قرارداد عمل کند؟
- ۳- مهلت انجام کار را به صورت ریاضی بنویسید.
- ۴- اگر نقاش حداقل ۶ روز برای انجام کارش نیاز داشته باشد، این مطلب را با نمادهای ریاضی بیان کنید.
در این صورت تحويل کار در چند روز می‌تواند انجام شود تا نقاش به قرارداد هم عمل کرده باشد؟ این مطلب را با نمادهای ریاضی بیان کنید.



در این فصل به حالت‌هایی برخورد کردیم که جواب مسئله فقط یک عدد خاص نبود و مسئله به گونه‌ای بود که بیش از یک جواب برای آن وجود داشت. مسائلی شبیه مسائل بالا را که بیان ریاضی آن‌ها به صورت یک نامساوی بین دو چندجمله‌ای یا دو عبارت گویا باشند را نامعادله می‌نامند. مثلاً، نامساوی‌های زیر نامعادله هستند.

$$2x - 1 < 6 , \quad 5x + 3 < -4x + 5 \leq 2(x + 1)$$

در این فصل فقط در مورد نامعادلاتی بحث خواهیم کرد که به صورت یک نامساوی بین دو چندجمله‌ای حداقل درجه اول از یک متغیر باشند.

جواب‌های یک نامعادله، مقادیری از متغیر هستند که به ازای آن‌ها، نامساوی برقرار شود. همه جواب‌های یک نامعادله یک مجموعه تشکیل می‌دهند که آن را مجموعه جواب آن نامعادله می‌نامند.

مثال: در نامعادله $12 \leq 5x - 1$ کدام‌یک از اعداد ۰، ۱، ۲، ۴ و ۶ از جواب‌های نامعادله هستند؟
مقدار $x = 0, 1, 2, 4$ به ازای $5x - 1 = 12$ کمتر است، پس ۰، ۱، ۲ و ۴ در مجموعه جواب این نامعادله قرار دارند. اما $x = 5$ به ازای $5x - 1 = 24$ بزرگتر است، پس این اعداد در مجموعه جواب این نامعادله قرار ندارند.

روش‌های حل نامعادلات

می‌دانید که اگر به طرفین یک نامعادله عددی را اضافه یا کم کنیم، نامساوی همچنان به همان شکل برقرار می‌ماند. با استفاده از این عمل می‌توان نامعادلات را ساده‌تر کرد.

مثال: نامعادله $5 < x + 1 < 2x - 1$ را حل کنید.

ابتدا به طرفین نامساوی $(x -)$ و سپس ۱ را اضافه می‌کنیم.

$$2x - 1 < x + 5$$

$$2x - 1 - x < x + 5 - x$$

$$x - 1 < 5$$

$$x - 1 + 1 < 5 + 1$$

$$x < 6$$


بنابراین، مجموعه اعداد کمتر از ۶، مجموعه جواب این نامعادله هستند.

همان‌گونه که در حل معادلات دیدیم، بسیار پیش می‌آید که برای حل معادله طرفین تساوی را در عددی ضرب می‌کردیم. در حل نامعادلات نیز بسیار پیش می‌آید که باید طرفین نامعادله را در عددی ضرب کنیم. باید بدانیم که ضرب طرفین یک نامساوی در یک عدد، چه تغییری در نامساوی ایجاد می‌کند. فعالیت زیر، این مسئله را بررسی می‌کند.




فرض کنید x و y دو عدد مثبت هستند که $y < x$ و a یک عدد مثبت است.

- ۱- بسته‌هایی به وزن‌های x و y در نظر بگیرید و آن‌ها را در دو کفه یک ترازو قرار دهید. وضعیت ترازو به چه شکل درمی‌آید؟ شکل آن را بکشید.
- ۲- آیا می‌توان وزنهایی به یکی از دو کفه اضافه کرد تا طرفین هم وزن شوند؟ وزن این وزنه اضافی را z بنامید و بیان ریاضی تساوی به دست آمده را بنویسید.




۳- طرفین تساوی به دست آمده را در a ضرب کنید. تساوی جدید را به صورت وزن بسته‌هایی که در یک ترازو قرار دارند نشان دهید.



۴- اگر بسته به وزن az را از کفه ترازو برداریم وضعیت ترازو به چه شکل در می‌آید؟ کدام نامساوی را می‌توانید نتیجه بگیرید؟

۵- این نامساوی را با نامساوی اول مقایسه کنید.

از این فعالیت نتیجه می‌شود که اگر یک نامساوی بین دو عدد مثبت برقار باشد، می‌توان طرفین نامساوی را در یک عدد مثبت ضرب کرد و نامساوی مجدداً به همان شکل برقار می‌ماند. در فعالیت بالا، برای آن که از ترازو استفاده کنیم، مجبور بودیم دو عدد x و y را مثبت فرض کنیم، ولی مثبت بودن x و y ضروری نیست و حتی اگر x یا y ، یا هر دو، مثبت هم نباشند، برای هر عدد مثبت a ، از $y < x$ می‌توان نتیجه گرفت $ay < ax$. برای اثبات این مطلب تمرين زیر را انجام دهید.



فرض کنید x و y دو عدد باشند که $y < x$ و فرض کنید a عدد مثبتی باشد. دلیل درستی هر مرحله از محاسبه زیر را بیان کنید.

$$\begin{aligned}x &< y \\ \circ &< y - x \\ \circ &< a(y - x) \\ \circ &< ay - ax \\ ax &< ay\end{aligned}$$

به این ترتیب، می‌توانیم نتیجه کلی زیر را بیان کنیم و از آن در حل نامعادله‌ها استفاده کنیم.

اگر x و y دو عدد باشند که $y < x$ ، آنگاه برای هر عدد مثبت a داریم $ay < ax$


در تقسیم طرفین یک نامساوی بر یک عدد مثبت، رابطه مشابهی برقرار است، زیرا تقسیم بر a همان ضرب در $\frac{1}{a}$ است. اگر a عدد مثبت باشد $\frac{1}{a}$ نیز مثبت است، پس با ضرب طرفین یک نامساوی در $\frac{1}{a}$ ، نامساوی به همان شکل برقرار می‌ماند.

اگر x و y دو عدد باشند که $y < x$ ، آنگاه برای هر عدد مثبت a داریم $\frac{y}{a} < \frac{x}{a}$


مثال: اگر از کالایی سه بسته هم وزن داشته باشیم، که وزن دوتای آن‌ها روی هم از ۴ کیلوگرم بیشتر و وزن سه تای آن‌ها روی هم از ۸ کیلوگرم کمتر باشد، هر بسته از این کالا چه وزن‌هایی ممکن است داشته باشد؟ اگر وزن هر بسته را x بنامیم، بیان ریاضی داده‌های مسئله به صورت $2x < 4$ و $3x < 8$ است. با تقسیم طرفین نامعادله اول بر ۲ نتیجه می‌شود $x < 2$. بنابراین، مجموعه جواب این نامعادله به شکل زیر است.




با تقسیم طرفین نامعادله دوم بر ۳ نتیجه می‌شود $x < \frac{8}{3}$. همچنین چون وزن هر بسته عددی مثبت است داریم $x > 0$. بنابراین مجموعه جواب نامعادله دوم به شکل زیر است.



اشتراک این دو مجموعه، مجموعه جواب‌های مشترک هر دو نامعادله است و عبارت است از

$$\left\{ x \in \mathbb{R} \mid 0 < x < \frac{8}{3} \right\}$$





تمرین در کلاس

احمد و اصغر دو دوست هستند که هر کدام تعدادی خرگوش دارند. تعداد خرگوش‌های احمد دو برابر خرگوش‌های اصغر است.

۱- اصغر 10 خرگوش جدید می‌خرد و با این کار، تعداد خرگوش‌هایش از تعداد خرگوش‌های احمد بیشتر می‌شود. این مطلب را با نمادهای ریاضی بیان کنید. چه نتیجه‌ای در مورد تعداد خرگوش‌های اصغر به دست می‌آورید؟

۲- اگر سه تا از خرگوش‌های احمد دو قلو بزایند، مجددًا تعداد خرگوش‌های احمد بیشتر می‌شود. این مطلب را به صورت ریاضی بنویسید. چه نتیجه جدیدی در مورد تعداد خرگوش‌های اصغر به دست می‌آورید؟

۳- آیا می‌توانید بگویید اصغر دقیقاً در ابتدا چند خرگوش داشته است؟



مسائل

نامعادلهای زیر را حل کنید.

$$ج) 1 - 4 < 2x$$

$$ب) 3x - 4 \leq 5x - 8$$

$$الف) 2x + 7 < x - 4$$

$$ه) \frac{x}{4} < \frac{x}{2} - \frac{x}{3}$$

$$د) \frac{x}{3} \leq x - \frac{1}{2}$$

حل یک مسئله

در ایام عید، خانواده زهرا برای مسافرت می‌خواهد با ماشین خودشان از بزد به مشهد بروند. هزینه هر روز اقامت در مشهد برای این خانواده سی هزار تومان است و هزینه رفت و برگشت به مشهد روی هم بیست هزار تومان است. اگر این خانواده در ابتدای سفر چهارصد هزار صد هزار تومان پول به همراه خود بردارند، حداقل چند روز در مشهد می‌توانند بمانند؟

معلم، از اکرم خواست تا در پای تخته این مسئله را حل کند. اکرم گفت: ابتدا باید بینیم مجھول مسئله چیست. در اینجا تعداد روزهایی که خانواده زهرا می‌توانند در مشهد بمانند مجھول است و آن را با x نشان می‌دهیم.

بعد باید فرضیات و اطلاعاتی که در مسئله آمده است را به صورت ریاضی بنویسیم. در اینجا می‌توانیم بگوییم که اگر از چهارصد هزار تومان، هزینه اقامت در مشهد را کم کنیم حداقل به اندازه هزینه رفت و برگشت به مشهد باید باقی بماند، یعنی $30000 - 40000 \leq 40000x$.

معلم، از فرزانه خواست بقیه مسئله را او حل کند. فرزانه گفت: این، یک نامعادله است و برای حل آن به طرفین « -40000 » اضافه می‌کنیم. نتیجه می‌شود $x \leq 30000 - 38000 = 40000 - 20000$. طرفین نامساوی را برابر $30000 - 38000 = \frac{38}{6}x$ تقسیم می‌کنیم و نتیجه می‌شود $x \leq 12/6$ ، یعنی خانواده زهرا می‌توانند بیش از ۱۲ روز در مشهد بمانند.

یکی از دانشآموزان گفت: این جواب قابل قبول نیست زیرا معنای آن این است که این خانواده با چهارصد هزار تومان، می‌توانند تا هر وقت که می‌خواهند در مشهد بمانند.

معلم گفت درست است، حتماً در جایی از حل این مسئله اشتباهی رخداده است. این اشتباه در کجاست؟ باید یکی عملیاتی را که انجام داده‌ایم بررسی کنیم تا اشتباه را به دست آوریم. اکرم گفت من می‌دانم اشتباه در کجاست. بهتر است نامعادله را به صورت زیر حل کنیم.

$$40000 - 30000x \leq 20000$$

$$40000 - 30000x + 30000x \leq 20000 - 30000x + 30000x$$

$$40000 + 30000x \leq 20000$$

$$40000 + 30000x - 20000 \leq 20000 - 30000x$$

$$30000x \leq 38000$$

$$x \leq \frac{38000}{30000} \approx 12/6$$

اکرم گفت: با این جواب، این خانواده حداقل ۱۲ روز می‌توانند در مشهد بمانند و نه بیشتر و این جواب قابل قبول است. این جواب شبهه جواب فرزانه است با این تفاوت که جهت نامساوی برعکس آن است. لابد اشتباه محاسبات فرزانه در آن است که در جایی باید جهت نامساوی را تغییر دهد. این عمل احتمالاً باید به هنگام تقسیم بر « -30000 » انجام شود، زیرا تقسیم بر اعداد مثبت، نامساوی را به همان شکل نگه می‌دارد، ولی تقسیم بر اعداد منفی شاید نامساوی را برعکس می‌کند.

معلم گفت: پس باید بررسی کنیم که ضرب یک عدد منفی در طرفین یک نامساوی چه تغییری در نامساوی ایجاد می‌کند.



تمرین دریافت

فرض کنید x و y دو عدد باشند که $y < x$ و فرض کنید a عددی منفی باشد.

۱- طرفین نامساوی $y < x$ را ابتدا با $-y$ و سپس با $-$ جمع کنید و یک نامساوی جدید به دست آورید.

۲- « $-a$ » عددی مثبت است و طرفین نامساوی به دست آمده را در « $-a$ » ضرب کنید و پس از ساده کردن نتیجه بگیرید.
 $.ay < ax$

از تمرین بالا نتیجه می شود :

اگر طرفین یک نامساوی را در یک عدد منفی ضرب کنیم یا بر یک عدد منفی تقسیم کنیم جهت نامساوی عوض می شود و نامساوی در یک جهت دیگر برقرار می شود.



مساله

۱- نامعادلات زیر را حل کنید و مجموعه جواب آنها را روی محور اعداد مشخص کنید.

$$x \leq \frac{2x - 3}{5} \quad \text{(ب)}$$

$$\frac{3x}{2} - 4 > \frac{2x}{3} + 1 \quad \text{(الف)}$$

$$x(x - 3) < (x - 1)^2 \quad \text{(د)}$$

$$\frac{x}{2} + \frac{x}{3} < \frac{x}{4} + \frac{x}{5} \quad \text{(ج)}$$

$$x - 8 < 2x - 1 \quad , \quad 2x - 1 < -5 \quad \text{(و)}$$

$$\frac{5x}{2} \leq (1-x)^2 - (x+3)^2 \quad \text{(ه)}$$

$$x - 1 < 2x - 3 \quad , \quad 2x - 3 < -\frac{x}{2} + 1 \quad \text{(ز)}$$


۲- در عبارت های زیر در \square یکی از نمادهای « $<$ » یا « $>$ » یا « $=$ » را قرار دهید.

(الف) اگر $a < 1$ ، آنگاه $a^3 < 1$.

(ب) اگر $a < 0$ و $1 < a$ ، آنگاه $a^3 < a$.

(ج) اگر $0 < a < 1$ آنگاه $a^3 < a$.

۳- کدام یک از شکل‌های زیر مربوط به مجموعه جواب نامعادله $x - 1 \leq 2(x - 1)$ است؟

- (الف) 
- (ب) 
- (ج) 
- (د) 

۴- یک شرکت سازنده میزهای تحریر، برای پرداخت حقوق کارگران و مخارج دستگاه‌ها، ۳۲۰۰۰۰۰ تومان


هزینه هفتگی دارد. هزینه مواد اولیه برای هر میز ۲۰۰۰۰ تومان، و قیمت فروش هر میز ۳۰۰۰۰ تومان است.

الف) اگر تعداد میزهای تولید شده در یک هفته را x بنامیم، مقدار هزینه انجام شده در یک هفته را به صورت یک عبارت جبری بنویسید.

ب) با فرضیات قسمت (الف)، درآمد به دست آمده در یک هفته را بنویسید.

ج) تفاضل هزینه از درآمد را سود می‌نامند. این شرکت حداقل چند میز در هفته باید بفروشد تا سود بیرد؟

$$5- \text{از طریق شکل زیر نشان دهید برای هر دو عدد مثبت } a \text{ و } b \text{ داریم: } \frac{a^2}{2} + \frac{b^2}{2} \geq ab$$



۶- هزینه تولید x متر سیم بر حسب تومان از رابطه $C = 60x + 17000$ محاسبه می‌شود. اگر قیمت فروش هر متر سیم ۴۰۰ تومان باشد، چه مقداری از سیم باید به فروش برسد تا کارخانه ضرر نکند؟

تمرین های تکمیلی

فصل اول - اعداد و نمادها:

۱- عدد $1 - \sqrt{5}$ را روی محور نمایش دهید.

۲- الف) عبارت «حاصل ضرب عدد يک دوم در خودش کوچکتر از يک دوم است» را به زبان ریاضی بنویسید.

ب) عبارت قسمت (الف) را برای عدد دلخواه به زبان فارسی و ریاضی بنویسید.

۳- عبارت $2 \div 6 \times 4 - 6 \times 2 + 2 \div 5 \times 3$ را در نظر بگیرید علی و حسن دو دانشآموز هستند که ترتیب‌های زیر را برای بهدست آوردن عبارت فوق مشخص کرده‌اند که هر دو درست است:

$$2 \times 3 + 2 \div 5 \times 2 + 6 \times 4 \div 2$$

تریب پیشنهادی علی

تریب پیشنهادی حسن

الف) یک ترتیب درست دیگر برای انجام عملیات فوق ذکر کنید.

ب) کدام ویژگی از اعمال است که نشان می‌دهد ترتیب علی و حسن درست است؟

فصل دوم - مجموعه ها:

۱- در هر کدام از قسمت های زیر،

اگر A و B و C زیر مجموعه هایی از اعداد طبیعی باشند در هر کدام از قسمت های زیر A و B و C را طوری مشخص کنید که شرایط ذکر شده را داشته باشد :

الف) $B \subset C$ و $A \subset B$ (ج) $A \cap B = C$ (د) $B \subset A$ و $C \subset A$ (هـ) $B \cap C = \emptyset$

فصل سوم- توان رسانی و ریشه‌گیری:

۱- ریشه‌های دوم اعداد زیر را به دست آورید.

الف) $\frac{1}{49}$ ب) $1^{\circ} 4$ ج) b⁴

۲- ریشه سوم اعداد زیر را محاسبه کنید.

الف) ٨٠٠٪ ب) a³ ج) $\frac{a^6}{b^4}$

۳- حاصل عبارت‌های زیر را به دست آورید.

$$\text{(الف)} \quad \sqrt[3]{64}$$

$$\text{(ب)} \quad \sqrt{36}$$

$$\text{(ج)} \quad \sqrt{\frac{36}{49}}$$

$$\text{(د)} \quad \sqrt[3]{-125}$$

$$\text{(ه)} \quad \sqrt[3]{\frac{b^6}{c^3}}$$

۴- عبارت‌های زیر را ساده کنید.

$$\text{(الف)} \quad \sqrt[3]{\frac{-64}{27}}$$

$$\text{(ب)} \quad \sqrt[3]{18a^3}$$

$$\text{(ج)} \quad \sqrt[3]{\frac{a^{\frac{1}{3}}b^2}{24c^3}}$$

۵- حاصل ضرب‌های زیر را به دست آورید و آن‌ها را ساده کنید.

$$\text{(الف)} \quad 3\sqrt{2} \times 2\sqrt{3}$$

$$\text{(ب)} \quad -5\sqrt{6} \times (-2)\sqrt{18}$$

$$\text{(ج)} \quad \sqrt{2} \times \sqrt{18}$$

$$\text{(د)} \quad 2\sqrt[3]{a^4 b^3} \times \sqrt[3]{a^2 b}$$

$$\text{(ه)} \quad 2\sqrt[3]{4} \times (-3)\sqrt[3]{2}$$

۶- مخرج اعداد و عبارت‌های زیر را گویا کنید و آن‌ها را به ساده‌ترین صورت بنویسید.

$$\text{(الف)} \quad \frac{1}{\sqrt[3]{4}}$$

$$\text{(ب)} \quad \frac{1}{\sqrt{a}}$$

$$\text{(ج)} \quad \frac{1}{\sqrt[3]{a^2}}$$

$$\text{(د)} \quad \frac{1}{\sqrt[3]{4x}}$$

$$\text{(ه)} \quad \sqrt[3]{\frac{4a}{3b^3c}}$$

۷- حاصل عبارت‌های زیر را به دست آورید.

$$\text{(الف)} \quad 4\sqrt{2} - 2\sqrt{2}$$

$$\text{(ب)} \quad 4\sqrt[3]{5} + \sqrt[3]{40}$$

$$\text{(ج)} \quad \sqrt[3]{\frac{16}{81}} - \sqrt[3]{\frac{25}{3}}$$

$$\text{(د)} \quad 5\sqrt[3]{6} - 2\sqrt[3]{6}$$

$$\text{(ه)} \quad a\sqrt{b} + c\sqrt{b}$$

$$\text{(و)} \quad \sqrt[3]{8y} - \sqrt[3]{y^4}$$

$$\text{(ز)} \quad \sqrt{a^2 b^4} - \sqrt{a^2 c}$$

۸- به جای \square عدد مناسب قرار دهید.

$$\text{(الف)} \quad \sqrt{5} + \sqrt{20} + \square = 7\sqrt{5}$$

$$\text{(ب)} \quad \sqrt[3]{12} + \sqrt[3]{96} - \square = \sqrt[3]{12}$$

فصل چهارم- چندجمله‌ای‌ها و اتحادها:

۱- حاصل عبارت‌های زیر را به دست آورید.

(الف) $(x^2 - y^2) + (x^2 + 2y^2)$

(ب) $(4y + ax) + (x + y)$

(ج) $\frac{1}{2}x^2 - 4x - \frac{1}{3}x + \frac{3}{2}x - 1$


۲- حاصل عبارت‌های زیر را به ساده‌ترین صورت بنویسید.

(الف) $3x(y - z)$

(ج) $(a + b)(x + y)$

(ب) $4x^3(x + y + 1)$

(د) $(a + b)(a + c)$



۳- با استفاده از شکل روی‌برو فرمول مساحت ذوزنقه را از طریق مساحت مثلث‌ها به دست آورید.

۴- کدام یک از تساوی‌های زیر اتحاد هستند؟

(الف) $3x + y = x + 3y$

(ب) $y^2 + 1 = y$

(ج) $(x + 1)(x - 1)(x^2 + x + 1) = x^6 - 1$

۵- با استفاده از اتحادها حاصل عبارت‌های زیر را بنویسید.

(الف) $(4x + 5)(4x + 3) =$

(ب) $(\frac{1}{3} - 2x)(\frac{1}{3} - x) =$

(ج) $(a^2 - b^2)(a^2 + b^2) =$

(د) $(2a - 3)(2a + 3) =$

۶- به کمک اتحادها عبارت‌های زیر را تجزیه کنید.

(الف) $x^3 + 8x + 15 =$

(ب) $x^3 + x + \frac{1}{4} =$

(ج) $x^3 + 2x - 8 =$

۷- حاصل عبارت‌های زیر را به کمک اتحادها به دست آورید.

(الف) $(x - \frac{1}{2})(x^2 + \frac{1}{2}x + \frac{1}{4}) =$

(ب) $(2a - 3b)(4a^2 + 6ab + 9b^2) =$

(ج) $(x + \frac{1}{3})^3 =$

(د) $(ax - 1)^3 =$

۸- به کمک اتحادها، عبارت‌های زیر را به صورت ضرب دو یا چند عبارت بنویسید.

(الف) $27x^3 - y^3 =$

(ب) $a^3 - \frac{1}{8} =$

(ج) $b^3 + \frac{8}{27} =$


۹- چندجمله‌ای‌های زیر را تجزیه کنید.

(الف) $x^9 + 1$

(ب) $x^5 - x$

فصل پنجم - معادلات درجه اول و معادله خط:

۱ - دو منبع آب A و B به شکل زیر در اختیار داریم.



گنجایش منبع A، 12° لیتر و گنجایش منبع B، 7° لیتر است. این دو منبع را پر از آب می‌کنیم و در لحظه $t = 0$ شیر هر دو همزمان باز می‌کنیم. در هر ثانیه از شیر منبع A، ۳ لیتر آب و از شیر منبع B، ۲ لیتر آب خارج می‌شود.

الف) کدام منبع زودتر خالی می‌شود و چند ثانیه زودتر خالی می‌شود؟

ب) آیا زمانی می‌رسد که حجم آب در دو منبع مساوی شود؟

ج) آیا زمانی می‌رسد که حجم آب در منبع B نصف حجم آب در منبع A شود؟

۲ - دوست شما به دلیل بیماری در جلسه درس معادلات درجه اول غایب بوده است. در یک برگه کاغذ چگونگی حل معادله $17 = 3x - 32$ را برای او توضیح دهید.

۳ - دو نقطه روی محور x ها باید به طوری که فاصله آن‌ها چهار باشد و یکی از این نقاط روی نیم خط منفی و نقطه دیگر روی نیم خط مثبت باشد. این مسئله چند جواب دارد؟

۴ - نقطه A به عرض ۳ را روی محور y ها در نظر بگیرید. دو نقطه B و C را روی محور x ها باید به طوری که مثلث ABC در رأس A متساوی الساقین باشد ($AB=AC$). مسئله چند جواب دارد؟

آیا می‌توانید دو نقطه روی محور x ها باید که مثلث ABC متساوی الاضلاع باشد؟ مسئله چند جواب دارد؟

۵ - با رسم محورهای مختصات سه نقطه $A = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix}$ و $B = \begin{bmatrix} -2 \\ 1 \end{bmatrix}$ و $C = \begin{bmatrix} 0 \\ -1 \end{bmatrix}$ را در صفحه مشخص کنید.

الف) شبیه خط‌هایی که اضلاع مثلث ABC را می‌سازند حساب کنید.

ب) نقطه C را طوری تغییر دهید تا شبیه همه اضلاع مثلث ABC مثبت شود.


ج) نقطه A را طوری تغییر دهید تا شبیه همه اضلاع مثلث ABC منفی شود.

۶ - معادله خطی را بنویسید که از محل تقاطع دو خط $6 = 3x + 2y$ و $3 = x - 2y$ بگذرد و بر خط $1 = x$ عمود باشد.

۷ - معادله خطی را بنویسید که از محل تلاقی دو خط $1 = x + 7y$ و $3 = x - 7y$ می‌گذرد و با خط $5 = 4x + y$ موازی است.



فصل ششم-نسبت های مثلثاتی:

۱- در مثلث زیر مقادیر x و y و z را به دست آورید.




۲- یک عدد مثبت انتخاب کنید و آن را a بنامید. یک زاویه حاده θ بسازید که $\tan \theta = a$

۳- هواپیمایی در ارتفاع 3000 متری در حال پرواز است. این هواپیما وقتی به فاصله 5 کیلومتری باند فرود می‌رسد، روی یک خط شروع به پایین آمدن می‌کند تا در ابتدای باند به زمین برسد. تانژانت زاویه‌ای که مسیر این هواپیما با سطح زمین می‌سازد چقدر است؟ از روی تانژانت این زاویه با رسم مثلث و استفاده از نقاله تعیین کنید هواپیما با چه زاویه‌ای به زمین رسیده است؟



۴- نرده‌بانی به طول 8 متر به دیواری تکیه داده شده است. زاویه نرده‌بان با سطح زمین 75 درجه است. نوک نرده‌بان تا زمین چقدر فاصله دارد؟ (راهنمایی: یکی از نسبت‌های مثلثاتی زاویه 75 درجه را با استفاده از نقاله و رسم مثلث قائم‌الزاویه و اندازه‌گیری با خط‌کش حساب کنید).

۵- در شکل زیر مثلث ABC در رأس B و مثلث AEF در رأس E قائمه هستند و طول اضلاع های AC و AE برابر ۱ می باشند و زاویه رأس A را θ می نامیم.



الف) طول اضلاع AB، BC و EF را بحسب یکی از نسبت های مثلثاتی زاویه θ حساب کنید.

ب) طول اضلاع AF را از طریق تساوی $\frac{AF}{AE} = \frac{AC}{AB}$ بحسب نسبت های مثلثاتی زاویه θ حساب کنید.

ج) طول اضلاع AF را از طریق قضیه فیثاغورس به دست آورید و نتیجه بگیرید $\frac{1}{\cos^2 \theta} = 1 + \tan^2 \theta$.

فصل هفتم- عبارت های گویا:

۱- مخزن آبی دو شیر دارد. اگر یکی از این شیرها را باز کنیم در 90° دقیقه 100 لیتر آب را تخلیه می کند. اگر دو شیر را با هم باز کنیم 100 لیتر آب در 20° دقیقه تخلیه می شود. اگر شیر دوم را به تنها بی باز کنیم، در چند دقیقه 100 لیتر آب تخلیه خواهد شد؟

۲- مستطیلی در نظر بگیرید که طول و عرض آن اعداد x و y باشند. دایره ای در نظر بگیرید که محیط آن برابر محیط این مستطیل باشد. نسبت مساحت این دایره را به مساحت این مستطیل بنویسید و به عنوان یک عبارت جبری گویا بودن یا نبودن آن را تعیین کنید. در حالتی که این مستطیل، یک مربع باشد، این نسبت به چه شکل در می آید؟

۳- قاعده متوازی الاضلاعی برای عددی مانند x برابر $2 - x$ و مساحت آن برابر $2 - 3x - x^3$ است. ارتفاع این متوازی الاضلاع را بحسب x به دست آورید.

۴- حاصل عبارت رو به رو را ساده کنید.

$$\frac{x+1}{x^2-4} \div \frac{x^2-1}{x-2}$$

۵- نشان دهید چندجمله ای $(5 - 3a)x^3 - 5ax^2 - x + a$ بر $x - a$ بخش پذیر است.

۶- خارج قسمت و باقیمانده تقسیم زیر را به دست آورید.

$$x^2 + x^4 - 2 \left| \begin{array}{r} 2+x^2 \\ \hline \end{array} \right.$$

۷- کدام عبارت جبری در $\sqrt{a} + \sqrt{b}$ ضرب شود، حاصل برابر $a - b$ می‌شود؟

۸- اگر $x = 2 + \sqrt{3}$ باشد حاصل $\sqrt{x + \frac{1}{x}}$ چیست؟

فصل هشتم- معادلات درجه دوم و حل آنها:

۱- با روش مربع کامل معادله زیر را حل کنید.

$$x^2 - \frac{x}{5} = \frac{6}{5}$$


۲- کدام یک از معادلات زیر فقط یک جواب دارند؟ جواب آن را بیابید.

$$x^2 + 3x + 4 = 0$$

۳- با استفاده از فرمول کلی جواب معادلات درجه دوم، معادله زیر را حل کنید.

$$x^2 - (\sqrt{2} + 1)x + \sqrt{2} = 0$$

۴- در شکل زیر در کنار زمینی مربعی شکل به طول 8° متر با چهار ای به ابعاد $x + 3$ و $x + 3$ درست کرده‌ایم اگر باقیمانده مساحت زمین 49° مترمربع باشد مقدار x چیست؟



۵- عددی طبیعی بیابید که مربع آن ۳۴۲ واحد بیشتر از خود عدد باشد.

فصل نهم- نامعادلات درجه اول:

۱- مقدار a را چنان بیابید که نقطه $A(a+2, 3-6a)$ در ربع دوم صفحه مختصات باشد.

۲- حدود m را چنان بیابید که معادله درجه دوم $x^2 - 3x + m - 1 = 0$ دارای ریشه حقیقی نباشد.

- ۱- مجموعه مقالات کمیته فرهنگ و تمدن اسلام و ایران، دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی
 - ۲- ریاضیات ۱ چاپ ۱۳۸۶، علی رضا مدقالچی، اسماعیل بابلیان.
- ۳- FUNCTIONS, STATISTICS AND TRIGONOMETRY SHARON, L. SENK
AND OTHERS.
- ۴- MATHEMATICS, SCOTT FORESMAN, ADDISON WESLEY.
- ۵- MATHEMATICS FOR STUDENTS, J.L.MARTIN, MCMILLAN.
- ۶- MATHEMATICS FOR TEACHERS, J.L.MARTIN, MCMILLAN.
- ۷- MATHEMATICAL IDEAS, CHARLES D.MILLER, SEVENTH EDITION,
HARPER COLLINS PUBLISHER.
- ۸- MIDDLE GRADES MATH TOOLS FOR SUCCESS PRENTICE HALL.
- ۹- PRINCIPLES & STANDARDS FOR SCHOOL MATHEMATICS N.C.T.M.
- ۱۰- REAL LIFE MATHEMATICS, EVERYDAY USE OF MATHEMATICS
CONCEPTS, EVAN M.GLAZER , JOHN W. MCCONNELL GREENWOOD
PRESS.
- ۱۱- WWW. TIMSS/RELEASED ITEMS/ MATHEMATICS /08
(TIMSS 2008). سوالات قابل انتشار ۲۰۰۳



معلمان محترم، صاحب نظران، دانش آموزان عزیز و اولیاسی آنان می توانند نظر اصلاحی خود را درباره مطابق

این کتاب از طریق نامه ب نشری تهران - صندوق پستی ۱۵۸۵۵/۳۶۳ - کروه دسی مربوط و یا پیام نکار (Email)

ارسال نمایند.

دفتر تایف کتاب های دسی ابتدایی و متوسطه قدری