

فصل



گوارش




روزانه این وال به حدود ۲ تن می‌رسد. بنابراین غذای بزرگ‌ترین جانور از ریزترین جانوران تأمین می‌شود.

وال‌ها بزرگ‌ترین جانوران کره زمین هستند. وال کوژپشت که تصویر آن را در شکل ۴-۱ می‌بینید، از نظر اندازه، متوسط است. این وال ۱۶ متر درازا دارد.

گوارش غذا در جانوران مختلف، متفاوت است
نوع غذا و روش‌های گوارش آن در جانوران مختلف، متفاوت است. کرم کدو نواری شکل است و به صورت انگل در روده انسان زندگی می‌کند، دهان و لوله گوارشی ندارد، و از پوست بدن خود مواد غذایی گوارش یافته را که درون روده وجود دارد، جذب می‌کند. جانوران دیگر کيسه گوارشی، یا لوله گوارش دارند و مواد غذایی را می‌بلغند.

گاو، گوسفند، آهو، گوزن، گوریل و بعضی از جانوران آبزی گیاه‌خوار هستند. بعضی دیگر از جانوران گوشت‌خوار هستند. شیر، کوسه، عقاب، عنکبوت و مار گوشت‌خوار هستند. گروهی از جانوران، هم مواد گیاهی و هم مواد جانوری می‌خورند. این جانوران همه‌چیز‌خوار نام دارند. انسان جانداری

وال کوژپشت جهت تأمین ماده و انرژی برای بدن ۷۲ تُنی خود نیاز به غذای فراوان دارد. غذای این جانور ماهی‌های کوچک و خرچنگ‌های ریز ساکن دریاهاست. وال کوژپشت به جای دندان چند ردیف اندام شانه مانند در دو طرف آرواره بالای خود دارد. این جانور، برای غذا خوردن، نخست دهان و گلوی خود را باز می‌کند و مقدار زیادی آب به همراه جاندارانی که در آن شنا می‌کنند، وارد دهان و گلوی خود می‌کند. هنگامی که وال دهان خود را می‌بندد، آب از دهان خارج می‌شود، اما ذرات موجود در آب در لای اندام‌های شانه مانند او گیر می‌کند. در این هنگام جانور این مواد را می‌بلعد و وارد معده خود می‌کند. پس از آن معده وال کوژپشت که در هر وعده می‌تواند در حدود نیم تُن مواد غذایی را در خود جای دهد، گوارش را آغاز می‌کند. وزن غذای



شکل ۴-۱ - تغذیه وال کوژپشت

غذا بین سلول‌های جاندار می‌پردازد. هیدر می‌تواند ذرات غذایی بسیار بزرگ تراز سلول‌های خود را بیلعد.


شکل ۲-۴، مراحل اصلی گوارش و جذب غذا را در بدن هیدر نشان می‌دهد. هیدر جانداری صیاد است و صید خود را (که در این جانوعی سخت پوست کوچک است) با نیش‌های زهری خود می‌کشد. جاندار با کمک بازوی‌های خود شکار را وارد دهان خود می‌کند. هنگامی که طعمه درون کيسه گوارشی هیدر قرار می‌گیرد، بعضی سلول‌های پوشاننده کيسه، آنزیم‌های هیدرولیز کننده ترشح می‌کنند. تازک‌هایی که از بعضی سلول‌ها بیرون زده‌اند، غذا را با آنزیم‌های گوارشی مخلوط می‌کنند. آنزیم‌ها بخش نرم بدن صید را به ذرات کوچک تر تجزیه می‌کنند. هنگامی که بعضی بخش‌های بدن شکار به ذرات کاملاً ریز تبدیل شد، این ذرات وارد سلول‌های پوشاننده کيسه گوارشی می‌شوند و بقیه مراحل گوارشی خود را درون سلول‌ها می‌گذرانند. باقی مانده بدن صید که گوارش نیافته است، از راه دهان خارج می‌شود. بنابراین گوارش هیدر ابتدا برونو سلولی و سپس

همه‌چیزخوار است.

هر جاندار برای تغییر دادن و جذب و استفاده از غذا باید محیطی برای عمل کردن آنزیم‌های گوارشی ایجاد کند. این محیط باید در جای مجزایی باشد تا آنزیم‌های گوارشی به مولکول‌های زیستی خود جاندار آسیب نرسانند.

جانداران تک سلولی نیز برای گوارش مواد غذایی، در درون خود، واکوئل‌های خاصی دارند. مثلاً آمیب، واکوئل گوارشی دارد که غذا را درون آن گوارش می‌دهد. بسیاری از اسفنج‌ها نیز که پرسلوی هستند به همین شیوه غذا را گوارش می‌دهند. آمیب و اسفنج فقط گوارش درون سلولی دارند. بسیاری از جانداران، درون بدن خود، جایگاه خاصی برای گوارش غذا دارند. این جایگاه خاص در خارج از محیط داخلی، یعنی در خارج از خون و سلول‌های بدن است.

جانوران ساده و ابتدایی، مانند هیدر که از کيسه تنان است، کيسه گوارشی دارند. این کيسه فقط یک راه به خارج دارد و آن دهان جاندار است. کيسه گوارشی به گوارش و توزیع



شکل ۲-۴— گوارش غذا در بدن هیدر

روده که جایگاه اصلی گوارش و جذب غذاست، بین معده


و مخرج قرار دارد. در جانوران مختلف، براساس نوع جانور و نوع غذایی که می خورند، بخش های مختلف لوله گوارشی متفاوت است. در شکل ۳-۴، دستگاه گوارش سه نوع جاندار که غذاهای متفاوتی می خورند، نشان داده شده است.

کرم خاکی جانوری همه چیزخوار است. این جانور درون خاک حرکت می کند و خاک سر راه خود، همراه با مواد آلی درون آن را می بعده. این مواد از دهان به مری و از آنجا به چینه دان جانور برده می شوند. درون سنگ دان غذا به کمک سنگ ریزه هایی که وارد لوله گوارشی شده اند، آسیاب می شود. در روده، مواد آلی غذایی گوارش می یابند و مواد قابل جذب آن، جذب می شوند. در شکل ۳-۴ مشاهده می کنید که دیواره

درون سلوی است.

بسیاری از جانوران لوله گوارشی دارند. لوله گوارشی از دهان آغاز و به مخرج ختم می شود. جهت حرکت غذا نیز درون لوله گوارشی، یک طرفه و از سوی دهان به سوی مخرج است، بخش های مختلف لوله گوارشی برای انجام کارهای اختصاصی، شکل و عمل اختصاصی پیدا کرده اند. مثلاً غذا از دهان به گلو و از آنجا، از راه مری، به معده می رود. لوله گوارش بعضی جانوران دارای چینه دان و سنگ دان نیز هست.

چینه دان محل نرم تر شدن و ذخیره موقتی غذاست. معده و سنگ دان نیز محل ذخیره موقتی غذایند، اما ماهیچه های آنها بسیار قوی تر از ماهیچه های چینه دان است و می توانند غذا را تا حدودی خرد و آسیاب کنند.



شکل ۳-۴—لوله گوارشی سه نوع جانور مختلف، کرم خاکی، ملخ و گنجشک

شبیه طرح دستگاه گوارش دو جانداری است که مورد بررسی قرار گرفت. چینه دان پرندگان آنها را قادر می‌سازد تا غذای را که با سرعت بلعیده‌اند، درون آن ذخیره کنند. گوارش شیمیایی و مکانیکی غذاها درون معده آغاز می‌شود. بسیاری پرندگان همراه با غذا، سنگ‌ریزه نیز می‌خورند. این سنگ‌ریزه‌ها سنگ‌دان را توانا می‌سازند تا به آسیاب کردن غذا پردازد. پرندگان دندان ندارند و به جای آن سنگ‌دان آسیاب کردن غذاها را عهده‌دار است. گوارش شیمیایی غذا درون روده پرندگان را ادامه می‌یابد. مواد غذایی و آب از روده جذب می‌شوند و مواد گوارش نیافته از مخرج خارج می‌شوند.

بعضی پرندگان، مانند گنجشک و مرغ خانگی همه چیزخوارند و از حشرات، دانه‌ها و میوه‌ها تغذیه می‌کنند؛ اما بعضی دیگر، مانند عقاب و جغد گوشت خوارند و از راه شکار موش، پرندگان کوچک، مار و حشرات تغذیه می‌کنند.

روde کرم خاکی برجسته است. این برجستگی سطح تماس روده را با غذا افزایش می‌دهد؛ بدین وسیله تعداد سلول‌هایی که در تماس با غذا قرار می‌گیرند، افزایش می‌یابد و کارایی روده بیشتر می‌شود. مواد گوارش نیافته، خاک و سنگ‌ریزه‌ها از مخرج کرم خارج می‌شوند.

ملخ جانوری گیاه‌خوار است. صفحه‌های آرواره مانندی که در اطراف دهان ملخ قرار دارد، برای خرد کردن غذا که عمدها برگ‌ها و بخش‌های تازه و نرم گیاهی هستند، به کار می‌رود. ملخ نیز مانند کرم خاکی چینه دان و سنگ‌دان دارد. غذایی که به ذرات ریز خرد شده است، از سنگ‌دان وارد معده می‌شود. معده جایگاه گوارش شیمیایی غذاست. در اطراف معده ملخ تعدادی کیسه وجود دارد که به درون معده راه دارند. جذب مواد غذایی در معده ملخ انجام می‌شود. نقش روde ملخ جذب آب و فشرده‌تر کردن باقی مانده مواد برای خارج کردن آنها از مخرج است.

طرح دستگاه گوارش پرندگانی مانند گنجشک نیز بسیار

خودآزمایی ۴-۱

- ۱- مراحل اصلی تغذیه و گوارش را در جانوران نام ببرید.
 - ۲- انواع گوارش را نام ببرید و هر یک را توضیح دهید.
 - ۳- منظور از گوارش درون سلولی چیست؟ جانورانی را نام ببرید که گوارش درون سلولی دارند.
 - ۴- در جاهای خالی کلمه‌های مناسب قرار دهید.
- کرم خاکی : مواد غذایی ← دهان ← ← مری ← ← روده ← ←
- گنجشک : مواد غذایی ← ← مری ← ← معده ← ← مخرج

دستگاه گوارش انسان شامل لوله گوارشی و غده‌های گوارشی است (شکل ۴-۴-الف). غده‌های گوارشی، یعنی غده‌های برازی، غده‌های دیواره معده و روده، پانکراس و جگر آتزیم‌ها و مواد لازم را به این لوله می‌ریزند. لوله گوارشی، شامل دهان، حلق، مری، معده، روده باریک، روده بزرگ و راست روده است.

ساختران لوله گوارش : دیواره لوله گوارش، تقریباً در تمام طول آن، به ترتیب از خارج به داخل، شامل لایه‌های پیوندی،

دستگاه گوارش انسان به تأمین آب و مواد غذایی مورد نیاز بدن کمک می‌کند

اغلب مواد غذایی مورد استفاده بدن به صورت مولکول‌های درشتی هستند که قبل از تغییرات فیزیکی و شیمیایی نمی‌توانند وارد خون شوند. این مواد در لوله گوارش خرد می‌شوند (گوارش مکانیکی) و با کمک شیره‌های گوارشی به مولکول‌های ساده‌تر تبدیل (گوارش شیمیایی) و سپس جذب می‌شوند.


تماس مخاط و مواد غذایی را افزایش می‌دهند.

ماهیچه‌های روده غذا را به جلو می‌رانند

حرکات لوله گوارش به صورت‌های دودی و موضعی (قطعه‌ای) است. حرکات دودی با انقباض ماهیچه‌ها و انتقال حرکت به تارهای ماهیچه‌ای جلوتر مواد را در طول روده به جلو می‌رانند. این حرکت‌ها هنگام پایان یافتن گوارش درون معده، به حدی شدید می‌شوند که موجب تخلیه آن می‌گردد. حرکات دودی در روده باریک ضعیف است و این حرکات مواد موجود در روده را، در هر نوبت فقط 15° سانتیمتر، به جلو می‌برند؛ به طوری که رسیدن غذا به انتهای روده باریک چند ساعت طول می‌کشد. اتساع لوله گوارش باعث تحریک اعصاب دیواره آن و در نتیجه راه اندازی حرکات دودی می‌شود.

حرکات موضعی به صورت انقباض‌های جدا از یکدیگر محتویات روده را به قطعات جدا از یکدیگر تقسیم می‌کنند. تکرار این حرکات در ابتدای روده باریک بیش از انتهای آن است و این اختلاف باعث به جلو رانده شدن مواد می‌شود.

ماهیچه‌ای طولی، ماهیچه‌ای حلق‌قی، زیر مخاطی و مخاطی (بافت پوششی که مواد موکوزی ترشح می‌کند) است (شکل ۴-۴-ب). لایه پیوندی خارجی در حفره شکمی بخشی از پرده صفاقی یا روده‌بند را تشکیل می‌دهد که اندام‌های موجود در حفره شکمی را از خارج به هم وصل می‌کند. ماهیچه‌های دیواره لوله گوارش، در ناحیه دهان و ابتدای حلق از نوع مخططف و ارادی هستند و در قسمت‌های دیگر از نوع صاف‌اند و به صورت غیرارادی به انقباض در می‌آیند. انقباض ماهیچه‌های لوله گوارش موجب خرد و نرم شدن مواد و حرکت آنها به سوی جلو می‌شود. در زیر مخاطی یک لایه پیوندی با رگ‌های خونی فراوان مخاط را از ماهیچه‌ها جدا می‌کند. مخاط لوله گوارش از بافت پوششی با آستری پیوندی ساخته شده است. نوع بافت پوششی آن به گونه‌ای است که با کار آن هماهنگی زیادی دارد. این پوشش در دهان از نوع سنگفرشی چند لایه‌ای و در روده و معده از نوع استوانه‌ای یک لایه‌ای است. در مخاط لوله گوارش، سلول‌های ترشحی برون‌ریز و نیز سلول‌های پوششی جذب کننده مواد قرار دارند. در سطح داخلی لوله گوارش در اکثر نواحی چین‌های ریزی وجود دارد که سطح



شکل ۴-۴ - الف. دستگاه گوارش انسان. ب. لایه‌های بافتی آن

سلولی باکتری‌های بیماری‌زا را از بین می‌برد و باعث ضد عفونی کردن حفره دهان می‌شود. ترشح دائمی بزاق محیط درون دهان را پیوسته مرطوب نگاه می‌دارد، به احساس چشایی کمک می‌کند، حرکت زبان و لب‌هارا در هنگام سخن گفتن سهیل می‌کند. ترشح بزاق در هنگام خواب بسیار کاهش می‌یابد.

بلغ، غذا را از دهان به معده می‌رساند


بلغ انتقال لقمهٔ غذایی جویده شده از دهان به معده است که به وسیلهٔ مرکز عصبی آن انجام می‌شود. غذا پس از جویده شدن با بالا آمدن زبان و چسبیدن به کام، به سوی گلو رانده می‌شود و گیرنده‌های مکانیکی دیواره گلو را تحریک و انعکاس بلع را ایجاد می‌کند. در هنگام بلع زبان کوچک به سمت بالا می‌رود و دهانه راه پینی را می‌بندد. راه نای نیز با بالا آمدن حنجره و پایین رفتن اپی‌گلوت بسته و غذا وارد مری می‌شود (شکل ۴-۶). مرکز بلع با اثر خود بر مرکز تنفس باعث قطع تنفس در هنگام بلع می‌شود. لقمهٔ غذا پس از ورود به مری با حرکات دودی مری حرکت می‌کند و به معده می‌رسد. نیروی جاذبه در حرکت لقمهٔ نقش مهمی ندارد. ماهیچه‌های حلقوی بخش انتهایی مری (کاردیا) در حالت عادی منقبض است و از ورود محتویات معده به مری جلوگیری می‌کنند؛ ولی با رسیدن هر موج دودی به این ناحیه، انقباض ماهیچه‌ها از بین می‌رود و ورود غذا به معده تسهیل می‌شود. همراه با بلع آب و مواد غذایی مقداری هوا نیز وارد معده می‌شود.

غذا مدتی در معده می‌ماند

مواد غذایی قبل از ورود به روده، در معده بر اثر حرکات معده و آنزیم‌های شیره آن ریز، نرم و به طور نسبی هضم می‌شوند و به صورت ماده‌ای خمیری شکل به نام کیموس درمی‌آیند. کیموس سپس به تدریج به دوازدهه (قسمت ابتدایی روده باریک) (شکل ۴-۷) وارد می‌شود. سطح داخلی معدهٔ خالی چین‌خوردگی‌های زیادی دارد. این چین‌خوردگی‌ها با پرشدن معده از بین می‌روند. ماهیچه‌های صاف حلقوی (داخلی) و طولی (خارجی) دیوارهٔ معده، در نزدیکی پیلور (دریچه انتهایی معده) قطورتر از نواحی بالایی معده هستند و انقباض شدیدتر دارند.

در شکل گیری حرکات دودی و موضعی، هر دو نوع ماهیچه طولی و حلقوی نقش دارند.

گوارش در دهان : حرکات جویدن و اثر آنزیم‌های موجود در بزاق بر مواد غذایی باعث گوارش مکانیکی و شیمیایی غذاها در دهان می‌شود. دندان‌ها در گرفتن لقمهٔ غذا و خرد کردن آنها نقش اصلی را دارند (شکل ۴-۵). ماهیچه‌های مخصوص جویدن که فک پایین را حرکت می‌دهند، در هنگام جویدن در بین دندان‌های دو آرواهه نیروی شدیدی ایجاد می‌کنند. این نیرو در انسان تا حدود ۱۰۰ کیلوگرم بر سانتیمتر مربع می‌رسد.



شکل ۴-۵ - دندان‌های کامل یک انسان

بزاق کارهای مختلفی انجام می‌دهد

بزاق مخلوطی از ترشحات سه جفت غدهٔ بناگوشی، زیرآرواره‌ای و زیرزبانی و نیز غده‌های کوچک ترشح کننده موسین است. ترشح غده‌های بناگوشی رقيق‌تر و بیشتر از غده‌های دیگر است و در آن یک آمیلاز ضعیف به نام پتیالین وجود دارد که گوارش کربوهیدرات‌های غذا را آغاز و نشاسته را به مالتوز تبدیل می‌کند. مادهٔ دیگری، به نام موسین، در بزاق یافت می‌شود که پس از جذب آب محلولی چسبناک به نام موکوز به وجود می‌آورد. موکوز باعث به هم چسباندن ذرات جویده شده و لغزنه و مناسب شدن آن برای انجام عمل بلع می‌شود. غده‌های ترشح کننده موسین در سراسر طول لولهٔ گوارش وجود دارند. لیزوزیم موجود در بزاق دیواره

ترکیب شیمیایی و حجم کیموس موجود در دوازده ماه ترین عامل مؤثر بر تخلیهٔ معده است.

در معده مواد مختلفی ترشح می‌شود


سلول‌های ترشح کننده موسین در سراسر سطح داخلی معده وجود دارند و با ترشح خود یک لایهٔ ضخیم چسبنده و قلیایی موکوزی ایجاد می‌کنند. این ماده سطح معده را لفزنده و مخاط آن را از اثر شیرهٔ معده محافظت می‌کند. علاوه بر آن در دیوارهٔ معده تعداد زیادی غدهٔ ترشح کنندهٔ شیرهٔ معده وجود دارد که آنزیم‌ها، اسید کلریدریک و فاکتور داخلی معده را می‌سازند و ترشح می‌کنند. غده‌هایی که به پیلور نزدیک‌ترند، آنزیم‌های شیرهٔ معده را می‌سازند و غده‌های بالاتر علاوه بر آنزیم، ترشح اسید کلریدریک و فاکتور داخلی معده را نیز به عهده دارند.

فاکتور داخلی معده برای حفظ ویتامین B₁₂ و جذب آن

در روده ضروری است و با توجه به نقشی که این ویتامین در زایش طبیعی گلبول‌های قرمز خون دارد، برداشتن معده یا آسیب دیواره آن باعث کاهش تعداد گلبول‌های قرمز خون می‌شود.

آن‌زیم‌ها از سلول‌های اصلی (پیتیک)، اسید کلریدریک و فاکتور داخلی معده از سلول‌های حاشیه‌ای موجود در غدد دیواره معده ترشح می‌شوند.


آن‌زیم‌های شیرهٔ معده شامل چند پروتئاز است که به نام کلی پیسینوژن خوانده می‌شوند. این مواد پس از تماس با اسید کلریدریک به مولکول‌های کوچک‌تر تبدیل می‌شوند و به صورت پیسین فعال درمی‌آیند. همان‌گونه که در شکل ۴-۷ مشاهده می‌کنید، پیسین خود با اثر بر پیسینوژن، تبدیل آن را سریع‌تر می‌کند. پیسین پروتئین‌ها را به مولکول‌های کوچک‌تر پیتیدی تجزیه می‌کند. در شیرهٔ معده نوزادان آدمی و بسیاری از پستانداران آنزیم دیگری به نام رنین یافت می‌شود که پروتئین شیر (کازئین) را رسوب می‌دهد. از رنین به عنوان مایهٔ پنیر در پنیرسازی استفاده می‌شود. ماده‌ای به نام گاسترین که به وسیلهٔ غده‌های مجاور پیلور به خون می‌ریزد، محرك ترشح اسید کلریدریک و تا حدی آنزیم‌های شیرهٔ معده است.



شکل ۶-۴ - گلو در هنگام بلع

حرکت معده به دو منظور صورت می‌گیرد

چند دقیقه پس از ورود غذا به معده انقباض‌های ضعیفی در ماهیچه‌های آن ظاهر می‌شود این انقباض‌ها که به تدریج شدیدتر و تعداد آنها بیشتر می‌شود، به صورت امواج دودی از زیر کارديا شروع می‌شود و در طول معده به سوی پیلور به پیش می‌روند. انقباض‌های دودی در مجاورت پیلور شدیدتر و باعث نرم شدن مواد غذایی و مخلوط شدن آنها با شیرهٔ معده می‌شوند. در پایان گوارش معده، شدت این انقباض‌ها به حدی می‌رسد که در هر حرکت، بخشی از کیموس معده را به درون دوازده‌هه می‌راند و بقیهٔ کیموس به علت بسته شدن مجدد پیلور به معده بازمی‌گردد. هرچه حجم کیموس بیشتر و کشیدگی دیوارهٔ معده شدیدتر باشد، حرکات تخلیه‌ای معده نیز با شدت بیشتر صورت می‌گیرند، ولی



شکل ۷-۴ - غده های معده

ممکن است این انعکاس را ایجاد کنند. استفراغ با یک دم عمیق

و بسته شدن حنجره و بالا رفتن زبان کوچک آغاز می شود و با انبساط ماهیچه های شکم و سینه و افزایش فشار وارد بر معده، محتویات آن را از راه دهان خالی می کند.

استفراغ یک عمل دفاعی است

استفراغ یک انعکاس دفاعی است که هدف آن خالی کردن محتویات معده و بخش بالایی روده باریک، از راه دهان است. تحریک ناحیه گلو و گیرنده های معده و روده و بیماری های مختلف

مشکل های معده

عفونت های باکتریایی موجب زخم معده می شوند

شیره گوارشی همراه با اسید بسیار قوی در معده، به ما کمک می کند تا بتوانیم انواع مختلف غذاها را گوارش دهیم. قدرت اسیدی بودن شیره گوارش به قدری است که قادر است فولاد را در خود حل کند. اما معمولاً پوشش موکبزی، دیواره معده را از اثر تخریب کننده شیره گوارش محافظت می کند؛ گرچه این اثر محافظتی صدر صد نیست. وقتی محافظت کامل از دیواره معده به عمل نیاید، به دیواره معده آسید وارد می شود و زخم هایی در آن به وجود می آید. این زخمهای زخم معده نام دارند. از علایم زخم معده معمولاً درد آزاردهنده در بخش بالایی معده است که ممکن است تا چند ساعت پس از صرف غذا، ادامه پیدا کند. تاکنون تصور بر این بوده است که زخمهای معده بر اثر تولید بیش از حد پیسین، یا اسید، یا ترشح بسیار کم موکبز به وسیله پوشش معده، ایجاد می شود؛ ولی امروزه، شواهدی در دست است که یک باکتری مارپیچی شکل به نام *ھلیکوباکتر پیلوری*^۱ علت اصلی این بیماری محسوب می شود. pH پایین معده، اکثر میکروب ها را به جز معده دیگر نمی بینند و از جمله *ھلیکوباکتر پیلوری* را می کشند. این باکتری خود را به پوشش معده

۱ - *Helicobacter pylori*


می‌چسباند و به نظر می‌رسد که اسیدیته اطراف خود را با ترکیبات قلیایی خود خشی می‌کند. ظاهراً رشد باکتری در بی کاهش موضعی موکوز و آسیب پوشش معده آغاز می‌شود. در این حالت انواع مختلف گلbul های خونی برای از بین بردن عفونت به سوی دیواره مهاجرت می‌کنند. محققان تخمین می‌زنند که ۵۰٪ از جمعیت جهان به هلیکوباتریسیلوری آلوهه هستند. شواهد، نشان می‌دهند که هلیکوباتریسیلوری در انواع خاصی از سلطان معده نیز، دخالت دارد. زخم‌های معده را معمولاً با ترکیبی از آنتی‌بیوتیک‌ها که باکتری‌هارا از بین می‌برند، درمان می‌کنند. همچنین، داروهایی که اسیدیته معده را کاهش می‌دهند، نیز در این مورد مفیدند. هنگامی که غذای هضم شده معده را ترک می‌کند مقداری شیره معده با خود دارد، بنابراین احتمال دارد که در اولین بخش از روده کوچک که دوازدهه نامیده می‌شود، نیز زخم‌هایی ایجاد شود.

صفرا نیز به همین ناحیه از دوازدهه می‌ریزد (شکل ۹-۴). در شیره پانکراس، علاوه بر آنزیم‌ها مقدار زیادی بیکربنات سدیم برای از بین بردن اثر اسیدی کیموس معده و قلیایی کردن محیط روده وجود دارد که بیشترین قسمت آن در روده دوباره جذب می‌شود. هورمون سکرتین محرك مؤثری بر ترشح بیکربنات شیره پانکراس است. آنزیم‌های شیره پانکراس و عمل آنها در جدول ۱-۴ خلاصه شده است. پروتئازهای این شیره در پانکراس به صورت غیرفعال هستند و پس از ورود به روده به صورت فعال درمی‌آیند. عوامل عصبی و هورمونی ترشح شیره پانکراس را تنظیم می‌کنند.


روده باریک مکان اصلی گوارش شیمیایی و جذب غذاست

گوارش شیمیایی مواد در روده با اثر آنزیم‌های قوی شیره پانکراس و با کمک صفرا و آنزیم‌های آزاد شده از سلول‌های دیواره روده به پایان می‌رسد. دیواره داخلی روده باریک چین خورده‌گی‌های زیادی دارد که روی آنها پرزهای متعدد دیده می‌شود. این پرزها و چین خورده‌گی‌ها سطح تماس روده را با مواد غذایی افزایش می‌دهند.

شیره پانکراس: بخش برون‌ریز پانکراس قوی‌ترین آنزیم‌های لوله گوارش را ترشح و به ابتدای دوازدهه وارد می‌کند.



شکل ۸-۴—ساختار بخشی از روده باریک



شکل ۹-۴— ارتباط جگر و پانکراس با روده باریک

سنگ‌های صفرا را ایجاد می‌کند. ورود رنگ‌های صفرا به خون که ممکن است بر اثر سنگ‌های صفرا یا بیماری‌های خونی و کبدی صورت گیرد، باعث بیماری یرقان یا زردی می‌شود.

عمل صفرا : صفرا یک مادهٔ قلیایی است و جگر آن را می‌سازد و ترشح می‌کند. صفرا پس از ورود به روده باعث پراکنده شدن ذرات ریز چربی در آب و ایجاد یک امولسیون پایدار می‌شود و اثر لیپاز پانکراس را بر آنها آسان‌تر می‌کند. املاح صفرا حرکات دودی روده را شدت می‌دهند و قلیایی بودن صفرا به ختنی کردن کیموس کمک می‌کند. در ترکیب صفرا، رنگ‌ها، املاح، کلسترول و لستین (نوعی لیپید) وجود دارد. صفرا ابتدا به کیسه صفرا می‌رود و در آنجا غلیظتر می‌شود. در صفرا دو مادهٔ رنگی به نام‌های بیلی وردین و بیلی روبيین وجود دارد که از تجزیه هموگلوبین گویچه‌های قرمز مرده به وجود می‌آیند. بخشی از مواد رنگی صفرا در روده دوباره جذب خون و از راه ادرار دفع می‌شود. رنگ زرد ادرار به همین علت است. بخشی دیگر از این مواد رنگی صفرا بر اثر آنزیم‌های گوارشی تغییر می‌کند و رنگ قهوه‌ای مدفع ع را می‌سازد. رسوب کلسترول در کیسه صفرا یا مجاری خروج آن،

پیشگیری از آنها

جدول ۱-۴— مواد موجود در شیره پانکراس و کارهای آنها

نتیجه عمل آنزیم	مادهٔ غذایی مورد اثر	نام آنزیم
جدا کردن ارتباطات پیتیدی	پروتئین	تریپیسین
جدا کردن آمینواسید از انتهای زنجیره	پروتئین و پیتید	کربوکسی پیتیداز
ایجاد گلیسرول و اسید چرب	لیپید	لیپاز
ایجاد فندهای ساده	کربوهیدرات‌ها (پلی‌ساقاریدها)	گلوسیدازها (آمیلاز، لاکتاز، ساکاراز)
جدا کردن مونونوکلئوتیدهای آزاد از اسیدهای نوکلئیک	اسید ریبونوکلئیک	ریبونوکلئاز دزکسی ریبونوکلئاز

و پس از کنده شدن از دیواره روده به درون آن می‌افتد و آنزیم‌های درونی آنها آزاد می‌شود.

جذب ورود مواد از لوله گوارش به خون است
مواد غذایی پس از گوارش به مولکول‌های کوچک قابل

ترشحات غده‌های دیواره روده : در دیواره روده باریک، علاوه بر غدد ترشح کننده موکوز غده‌های دیگری وجود دارد که مایعی نمکی ترشح و حرکت مواد در روده را آسان می‌کنند. منشأ آنزیم‌هایی که در روده وجود دارند، اما از پانکراس ترشح نشده‌اند، سلول‌های پوششی دیواره روده است. عمر این سلول‌ها کوتاه است

لنجفی این لایه وجود ندارد. ویتامین های محلول در چربی (A, D, E, K) همراه با ذرات چربی جذب، اما سایر ویتامین ها به خون منتشر می شوند. ویتامین B₁₂ مولکول درشتی است که جذب آن به کمک یک پروتئین حامل (فاکتور داخلی معده) صورت می گیرد. ترکیبات معدنی روده از راه انتشار و یا انتقال فعال جذب می شوند. جذب آب در روده منحصرآ از قوانین اسمز تعیت می کند.

روده بزرگ : ابتدای روده بزرگ روده کور نام دارد و به زایدآ آپاندیس ختم می شود(شکل ۱-۴). روده بزرگ شامل سه قسمت تقریباً مستقیم به نام های کولون بالارو (در سمت راست)، کولون افقی و کولون پایین رو (در سمت چپ) است. کولون پایین رو به راست روده و ماهیچه های حلقوی داخلی و خارجی مخرج ختم می شود که اولی از ماهیچه های صاف (غیرارادی) و دومی از ماهیچه های مخطط (ارادی) ساخته شده است. موادی که وارد روده بزرگ می شوند، شامل آب و املاح، مقدار کمی مواد غذایی گوارش نیافته مانند سلولز و بقایای ترشحات غده های گوارشی است. دیواره روده بزرگ آب و املاح را جذب می کند و بدین طریق باعث غلیظ تر شدن مدفوع می شود. باکتری هایی که در روده بزرگ زندگی می کنند، برخی مواد مانند سلولز را تجزیه و از گلوکز ایجاد شده برای تغذیه خود استفاده می کنند. مقدار کمی ویتامین های B و K نیز به وسیله این باکتری ها ساخته می شود و جذب خون می گردد. بخشی از گاز های روده، مانند هیدروژن، متان و سولفید هیدروژن مربوط به عمل تجزیه ای باکتری های روده است. مقدار کمی پتاسیم و موکوز از غده های دیواره روده بزرگ ترشح و دفع می شود. روده بزرگ تحرک زیادی ندارد.


جذب تبدیل می شوند. فرآیند شیمیابی اصلی در این تغییرات هیدرولیز است. در پایان گوارش، کربوهیدرات ها به مونوساکارید، پروتئین ها به آمینواسیدها و چربی ها به گلیسرول و اسیدهای چرب تبدیل می شوند. جذب مواد غذایی در روده صورت می گیرد ولی برخی مواد دارویی از مخاط دهان و معده نیز جذب می شوند. وجود چین ها و پرز های درشت و ریز در مخاط روده، سطح جذب را چندین برابر افزایش می دهد. هر سلول پوشش مخاط روده صدها ریزپر ز دارد، به طوری که مساحت جذب در روده به حدود ۲۵۰ مترمربع می رسد. جذب مواد در روده با پدیده های انتشار و اسمز و انتقال فعال صورت می گیرد.

جذب اغلب قندهای ساده با انتقال فعال به وسیله سلول های پوششی مخاط و همراه با جذب سدیم و به کمک آن صورت می گیرد. جذب آمینواسیدها با انتقال فعال صورت می گیرد و وجود سدیم در روده برای انتقال برخی از آنها لازم است. آمینواسیدهایی که از روده جذب می شوند از گوارش پروتئین های غذا و پروتئین های موجود در ترشحات لوله گوارش و سلول های مرده و جدا شده بافت پوششی روده حاصل می شوند.

چربی ها که پس از گوارش به مونو گلیسریدها، دی گلیسریدها و اسیدهای چرب تبدیل می شوند، به سهولت وارد سلول های پوششی مخاط روده می شوند و مجدداً به صورت تری گلیسرید در می آیند و آنگاه وارد مویرگ های لنفی می شوند. علت آنکه مواد چربی برخلاف سایر مواد آلی از راه لنفی جذب می شوند، این است که سطح خارجی مویرگ های خونی دیواره روده، مانند سایر مویرگ ها با لایه ای از پلی ساکاریدها پوشیده شده است که مانع ورود مولکول های چربی می شود. در حالی که در مویرگ های

پیشتر پنجه ایمپ

جذب غذا : فرض کنیم در غذای روزانه یک فرد بالغ در حدود ۵۰۰ گرم کربوهیدرات، ۲۰۰ گرم مواد پروتئینی و ۸۰ گرم چربی وجود دارد که حجم آن همراه با املاح و آب و ترشحات لوله گوارش، به حدود ۹ لیتر می رسد. از این مقدار فقط در حدود ۵/۰ لیتر باقی مانده به روده بزرگ وارد می شود و بقیه در روده باریک جذب خون می شود.



شکل ۱۰-۴- محل اتصال روده کوچک به روده بزرگ

پیشخوان

مسلمانان نوآور

ابوالقاسم خلف ابن العباس زهراوی یکی از معروف‌ترین جراحان مسلمان در زمان او ج تمدن اسلامی بود. رساله‌های پزشکی او را اساس علم جراحی کنونی در اروپا می‌دانند. زهراوی پیش از ۲۰۰ ابزار جراحی را طراحی کرد و خودش آنها را ساخت. ابزارهای جراحی و بخیه‌زنی امروزی با ابزارهای ساختهٔ او فرق چندانی ندارند.

زهراوی نخستین کسی بود که از نخ‌های تهیه شده از رودهٔ جانوران برای جراحی استفاده کرد. این نخ تنها مادهٔ طبیعی است که بدن آن را می‌پذیرد و در بدن تجزیه می‌شود.

ابوالحسن احمد بن محمد طبری پزشک و دانشمند ایرانی سدهٔ چهارم هجری و مؤلف کتاب «المعالجات البقراطیه» برای اولین بار در تاریخ پزشکی برای شستت و شوی معده افرادی که دچار مسمومیت می‌شدند، از لوله استفاده می‌کرد.

است. علاوه بر آن طولانی‌تر شدن روده سطح تماس پوشش درونی روده را با غذا افزایش می‌دهد و می‌دانیم که غلظت مواد غذایی قابل جذب در غذاهای گیاهی کمتر از مواد جانوری است (شکل ۱۱-۴).

نوزاد قورباغه که آب‌زی است گیاه‌خوار، اما قورباغه بالغ حشره‌خوار است. سبب طول روده نوزاد قورباغه به طول بدن بسیار بیشتر از این نسبت در قورباغه بالغ است. هنگام دگردیسی و تبدیل نوزاد قورباغه به قورباغه بالغ رشد روده نسبت به سایر اندام‌ها اندک است.


سازش دستگاه گوارش علف‌خواران

طرح کلی دستگاه گوارش انسان را بررسی کردیم؛ اما دستگاه گوارش مهره‌داران با یکدیگر تفاوت‌هایی دارد. این تفاوت‌ها برای حداقل استفاده از غذا و کارایی دستگاه گوارش ایجاد شده است.


طول لوله گوارش نشان دهنده نوع غذایی است که جاندار می‌خورد. طول روده گوشت‌خواران کوتاه‌تر از سایر جانوران است. بلندتر بودن طول روده فرصت بیشتری به آن می‌دهد تا مواد غذایی موجود در مواد گیاهی را بیشتر جذب کند. می‌دانیم که گوارش مواد گیاهی دشوارتر از گوارش گوشت و مواد جانوری

دستگاه گوارش نشخوارکنندگان، مانند گاو و گوزن برای استفاده از سلولز موجود در مواد غذایی سازگاری پیدا کرده است (شکل ۱۲-۴). معده این جانوران چهاربخشی است: جانور ابتدا مواد گیاهی را نیمه جوییده می‌بلع و وارد سیرابی و نگاری خود می‌کند. باکتری‌های تجزیه کننده سلولز در سیرابی و نگاری جانور زندگی می‌کنند و مقدار قابل توجهی از سلولز موجود در مواد گیاهی را تجزیه می‌کنند. جانور هنگام استراحت غذای موجود در سیرابی و نگاری را بار دیگر وارد دهان خود می‌کند و آن را دوباره می‌جود و بار دیگر می‌بلع. غذا این بار وارد هزارلا می‌شود و آب آن جذب می‌شود. پس از آن غذا به شیردان وارد می‌شود. در شیرidan آنزیم‌های گوارشی جانور، موجب گوارش شیمیایی غذا می‌شوند. در این جا غذا همراه با باکتری‌هایی که با آن وارد شده‌اند گوارش می‌یابد و مقدار زیادی از مواد غذایی آماده جذب می‌شوند. باکتری‌ها با سرعت بسیار تولید مثل می‌کنند و بنابراین مقدار آنها تقریباً همیشه در لوله گوارشی جانور ثابت می‌مانند.

دستگاه گوارش نشخوارکنندگان به علت سازگاری بیشتری که برای زندگی باکتری‌های تجزیه کننده سلولز و گوارش کامل غذا پیدا کرده است، نسبت به علف‌خواران دیگر، مانند اسب و فیل کارآئی بیشتری دارد.



شکل ۱۱-۴- مقایسه طول لوله گوارش در جانور گیاه‌خوار با جانور گوشت‌خوار
پستانداران گیاه‌خوار عموماً رووده بسیار طویلی دارند. در بعضی از گیاه‌خواران، میکروب‌های تجزیه کننده سلولز، در رووده بزرگ یا رووده کور زندگی می‌کنند. دستگاه گوارش فیل و اسب از این نوع است. رووده کور و رووده بزرگ این جانوران مواد حاصل از گوارش سلولز در رووده باریک این جانوران انجام از آنجا که گوارش سلولز در رووده باریک این جانوران انجام نمی‌شود، بسیاری از مواد غذایی موجود در رووده آنها به صورت مدفوع دفع می‌شود.



شکل ۱۲-۴- دستگاه گوارش گاو، یک جانور نشخوارکننده

- ۱- ماهیچه‌های دیواره لوله گوارش در چه قسمت‌هایی از نوع ارادی و در چه قسمت‌هایی از نوع غیرارادی هستند؟
- ۲- داخلی‌ترین بافت لوله گوارشی از چه نوع بافتی است؟
- ۳- در هنگام بلع غذا چگونه راه نای و بینی بسته می‌شود؟
- ۴- نتیجه حرکات معده چیست؟ توضیح دهید.
- ۵- شیره معده از چه موادی درست شده است؟
- ۶- فاکتور داخلی معده چه اهمیتی دارد و از چه سلول‌هایی ترشح می‌شود؟
- ۷- گوارش نهایی مواد غذایی در کدام بخش از لوله گوارش انجام می‌گیرد؟ چرا؟
- ۸- صفراء از چه موادی درست شده است و چه کاری انجام می‌دهد؟
- ۹- نحوه جذب قندها، اسیدهای آمینه و اسیدهای چرب را در روده باریک بنویسید.
- ۱۰- دستگاه گوارش نشخوار کنندگان چه سازگاری‌هایی دارد؟

۴-۱ فعالیت ✓

- ۱- علت هر یک از موارد زیر را بیان کنید :
- الف) اگر لقمه‌ای نان را در دهان خود مدتها پیش از حد معمول نگه داریم، شیرینی مزه می‌شود.
- ب) هنگامی که لقمه‌ای را می‌بلعیم، لقمه معمولاً از انتهای دهان وارد حفره بینی نمی‌شود.
- ۲- نوعی بیماری در گاو مشاهده می‌شود که در آن چین‌خوردگی‌های درون روده جانور ازین می‌روند و سطح روده از درون صاف می‌شود. در اثر این بیماری جانور لاغر می‌شود، فکر می‌کنید علت چیست؟
- ۳- گفته می‌شود بزاقی که هنگام غذا خوردن ترشح می‌شود، نسبت به بزاقی که قبل از غذا خوردن ترشح می‌شود، آن‌تیم بیشتری دارد. آزمایشی طراحی کنید که این موضوع را تأیید یا رد کند.