

## ۴-۲- دامنهٔ تابع با ضابطه

دامنهٔ توابع را در چند حالت بررسی می‌کنیم.

### ۱-۴- دامنهٔ توابع چند جمله‌ای از $x$ ، اعداد حقیقی

می‌باشد.

$$f(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x + a_0,$$
$$a_n, \dots, a_0 \in \mathbb{Z}$$

$$D_f \subseteq \mathbb{R}$$

به بیان دیگر:

مثال: در زیر دو تابع داده شده‌اند، دامنهٔ آن‌ها را بباید.

(الف)  $D_f \subseteq \mathbb{R}$

$$f(x) = 4x^5$$

(ب)  $D_f \subseteq \mathbb{R}$

$$f(x) = 3x^4 - 5x^7$$

$$f(x) = \frac{p(x)}{q(x)}$$

## ۲-۴- دامنهٔ توابع کسری

دامنهٔ توابع کسری به صورت  $f(x) = \frac{p(x)}{q(x)}$  (که  $p(x)$  و  $q(x)$  چندجمله‌ای بر حسب  $x$ ) عبارت است از

مجموعهٔ اعداد حقیقی منتهای ریشه‌های مخرج کسر (زیرا به ازای ریشه‌های مخرج کسر، تابع تعریف نشده است)

$$f(x) = \frac{p(x)}{q(x)}$$

$$D_f = \mathbb{R} - \{x | q(x) = 0\}$$

$$f(x) = \frac{3x+1}{5x-1}$$

مثال ۱: دامنهٔ تابع مقابل را بباید.

$$g(x) = \frac{5x^4}{x^2 + \sqrt{x} + 6}$$

حل: ریشه‌ی مخرج کسر را پیدا می‌کنیم:

$$D_f = \mathbb{R} - \left\{ \frac{1}{5} \right\}$$

- دامنهٔ تابع برابر است با:

مثال ۲: دامنهٔ تابع مقابل را بباید.

$$g(x) = \frac{(x+1)(x+6)}{x^2 + 7x + 6}$$

$$x^2 + 7x + 6 = (x+1)(x+6) = 0$$

حل: مخرج کسر را برابر صفر قرار می‌دهیم:

$$\begin{aligned} & x+6=0 \Rightarrow x=-6 \\ & x+1=0 \Rightarrow x=-1 \end{aligned}$$

- ریشه‌های مخرج عبارتند از:

$$D_g = \mathbb{R} - \{-1, -6\}$$

- دامنهٔ تابع برابر است با:

مثال ۳: دامنه‌ی تابع مقابل را بنویسید.

$$k(x) = \frac{x^3}{x^2 - 2x - 3}$$

$$x^2 - 2x - 3 = 0 \Rightarrow (x+1)(x-3) = 0$$

حل: مخرج کسر را مساوی صفر قرار می‌دهیم:

$$x+1 = 0 \Rightarrow x = -1$$

$$x-3 = 0 \Rightarrow x = 3$$

$$D_k = \mathbb{R} \setminus \{-1, 3\}$$

- ریشه‌های مخرج عبارتند از:

دامنه‌ی تابع  $k$  برابر است با:

تذکر: در تابع با ضابطه‌ی  $f(x) = \frac{p(x)}{q(x)}$ ، برای پیدا کردن دامنه نباید عبارت کسری را ساده کنیم (مثال ۳).

## تمرین

$$f(x) = \frac{5x^2 \cdot x}{x^2 - 2x}$$

دامنه‌ی تابع با ضابطه‌ی مقابل را بیابید.

## ۴-۲-۴-۳ دامنه‌ی تابع‌های شامل رادیکال (به)

این گونه توابع، توابع اصم نیز می‌گوییم: دامنه‌ی تابع رادیکالی را در دو حالت با فرجه‌ی فرد و با فرجه‌ی زوج بررسی می‌کنیم.

$$f(x) = \sqrt[n]{f(x)}$$

دامنه‌ی تابع اصم با فرجه‌ی فرد:

$$f(x) = \sqrt[k]{p(x)}, k \in \mathbb{N}$$

- دامنه‌ی تابع  $f$  برابر است با:

$$D_f = D_p$$

مثال ۱: دامنه‌ی تابع داده شده را بیابید.

$$f(x) = \sqrt[3]{1-5x} \quad (\text{الف})$$

$$f(x) = \sqrt[3]{\frac{1-5x}{x^2-16}} \quad (\text{ب})$$

$$\therefore D_f = \mathbb{R} \setminus [-4, 4]$$

$$f(x) \cdot \sqrt[k]{p(x)}, k \in \mathbb{N}$$

دامنه‌ی تابع اصم با فرجه‌ی زوج

$$D_f : x|x \in \mathbb{R}, p(x) \neq 0$$

هرگاه آنگاه:  $k \in \mathbb{N} \quad f(x) \cdot \sqrt[k]{p(x)}$

$$g(x) = \sqrt{1-x}$$

مثال ۲: دامنه‌ی تابع مقابله‌ی را پیدا کنید.

$$D_g : x|x \in \mathbb{R}, 1-x \neq 0 \quad -\dots, 1.$$

حل: چون فرجه‌ی زوج است دامنه برابر است با:

$$k(x) = \sqrt{3x-8}$$

مثال ۳: دامنه‌ی تابع مقابله‌ی را بایابد.

$$D_k : x|x \in \mathbb{R}, 3x-8 \neq 0$$

حل: چون فرجه‌ی زوج است، پس:

$$3x-8 \neq 0 \quad 3x \neq 8 \quad x \neq \frac{8}{3}$$

نامعادله‌ی مقابله‌ی را حل می‌کنیم:

$$D_k : x|x \in \mathbb{R}, x \neq \frac{8}{3} \therefore \left( \frac{8}{3}, \dots \right)$$

دامنه‌ی تابع  $k$  برابر است با:

$$f(x) = \sqrt{\frac{7-2x}{3x-8}}$$

مثال ۴: دامنه‌ی تابع مقابله‌ی را بایابد.

$$D_f : x|x \in \mathbb{R}, \frac{7-2x}{3x-8} \neq 0$$

حل: چون فرجه‌ی زوج است، پس:

$$\frac{7-2x}{3x-8} \neq 0$$

برای پیدا کردن  $D_f$  نامعادله‌ی مقابله‌ی را حل می‌کنیم.

$$7-2x = 0 \quad 7 = 2x \quad x = \frac{7}{2}$$

ریشه‌های صورت و مخرج کسر را به دست می‌آوریم.

$$3x-8 = 0 \quad 3x = 8 \quad x = \frac{8}{3}$$

جدول ۲-۱۲

$x$	$-\frac{8}{3}$	$\frac{7}{2}$	$\frac{8}{3}$	$+\infty$
$7-2x$	+	0	-	-
$3x-8$	-	0	+	+
$\frac{7-2x}{3x-8}$	0	+	0	+

با توجه به ریشه‌های نامعادله، جدول ۲-۱۲ را تعیین

علامت می‌کنیم.

با توجه به جدول ۲-۱۲ دامنه را می‌یابیم، پس:

## فعالیت ۹-۲

تابع مقابله مفروض است.

$$f(x) = \sqrt{\frac{3-4x}{x^2-9}}$$

الف) ریشه‌ی عبارت  $3-4x$  را به دست آورید.

ب) ریشه‌های عبارت  $x^2-9$  را به دست آورید.

ج) به ازای چه مقادیری از  $x$  تابع  $f$  تعریف نشده است؟

د) دامنه‌ی تابع  $f$  را بیابید.

مثال ۶: دامنه تابع مقابله را به دست آورید.

$$g(x) = \sqrt{\frac{5-7x}{x^2-x-12}}$$

حل: ریشه‌ی صورت کسر را به دست می‌آوریم.

$$5-7x = 0 \Rightarrow x = \frac{5}{7}$$

- مخرج کسر را به حاصل ضرب دو عامل تبدیل می‌کنیم.

$$x^2 - x - 12 = (x-4)(x+3)$$

- ریشه‌های مخرج کسر را به دست می‌آوریم.

$$\begin{array}{l} x-4 = 0 \Rightarrow x=4 \\ x+3 = 0 \Rightarrow x=-3 \end{array}$$

- دامنه‌ی  $g$  برابر است با:

$$D_g = \{x | x \in \mathbb{R}, \frac{5-7x}{x^2-x-12} \neq 0\}$$

- با توجه به ریشه‌های صورت و مخرج کسر، جدول ۲-۱۳

جدول ۲-۱۳

را تعیین علامت می‌کنیم.

$x$	-	-3	$\frac{5}{7}$	4	..
$5-7x$	.	.	0-	-	-
$x^2-x-12$	-	0	.	-	0
$\frac{5-7x}{x^2-x-12}$	تعیین نشده	تعیین نشده	جواب	جواب	/

$$D_g = \{x | x \in \mathbb{R}, 3 \leq x < 4\}$$

- دامنه‌ی تابع  $g$  برابر با:

**مثال ۷:** دامنهٔ تابع مقابله را محاسبه کنید.

$$f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$$

$$f(x) = 3x^2 - 5x - 4$$

**حل:** دامنهٔ توابع چندجمله‌ای برابر اعداد حقیقی  $\mathbb{R}$

$$D_f \subset \mathbb{R}$$

$$f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$$

$$f(x) = \sqrt{64 - x^2}$$

$$D_f = \{x | x \in \mathbb{R}, 64 - x^2 \geq 0\}$$

**حل:** چون فرجه‌ی رادیکال زوج است، داریم :

– عبارت زیر رادیکال را برابر صفر قرار داده، ریشه‌های


$$64 - x^2 = 0 \Rightarrow x^2 = 64 \Rightarrow x = \pm 8$$

آنرا به دست می‌آوریم.

– ریشه‌ها را به ترتیب صعودی در جدول ۲-۱۴ می‌نویسیم

و عبارت زیر رادیکال را تعیین علامت می‌کنیم.

جدول ۲-۱۴



$$D_f = \{x | x \in \mathbb{R}, -8 \leq x \leq 8\}$$

با توجه به جدول ۲-۱۴ دامنه برابر است با :

$$f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$$

$$f(x) = \sqrt{64 - x^2}$$

**مثال ۹:** دامنهٔ تابع مقابله را به دست آورید.

$$D_f = \{x | x \in \mathbb{N}, -12 \leq x \leq 8\}$$

**حل:** با توجه به حل مثال ۸ دامنهٔ تابع  $f$  برابر است با :

$$D_f = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}$$

– با شرط  $x \in \mathbb{N}$ ، دامنهٔ تابع  $f$  برابر است با :

$$f(x) = \sqrt{3x^2 - 5x - 2}$$

**مثال ۱۰:** دامنهٔ تابع مقابله را به دست آورید.

**حل:** چون فرجه‌ی رادیکال زوج است، دامنه برابر است با :

$$D_f = \{x | x \in \mathbb{R}, 3x^2 - 5x - 2 \geq 0\}$$

- برای تعیین ریشه‌ها، عبارت را مساوی صفر قرار

$$3x^2 - 5x - 2 = 0 \quad 3x^2 - 5x - 2 = 0$$

می‌دهیم :

- با توجه به ضرایب  $a, b, c$  میان معادله را تشکیل می‌دهیم :


چون  $x_1$  و  $x_2$  معادله دارای دو ریشه‌ی  $x_1$  و  $x_2$  است.

$$x_1 = \frac{-b + \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} = \frac{-(-5) + \sqrt{49}}{2(3)}$$

- ریشه‌های  $x_1$  و  $x_2$  برابر است با :

$$\begin{aligned} & x_1 = \frac{5 + 7}{6} = \frac{12}{6} = x_1 = 2 \\ & x_2 = \frac{5 - 7}{6} = \frac{-2}{6} = x_2 = -\frac{1}{3} \end{aligned}$$

### جدول ۲-۱۵



$$x \in \left( -\frac{1}{3}, 2 \right)$$

$$D_f = \{x | x \in \mathbb{R}, x \neq -\frac{1}{3}, x \neq 2\}$$

$$D_f = \dots, -\frac{1}{3}, 3, \dots$$

- ریشه‌ها را به ترتیب تزولی به صعودی در جدول ۲-۱۵

می‌نویسیم سپس عبارت  $3x^2 - 5x - 2 < 0$  را تعیین علامت می‌کنیم.

- با توجه به علامت نامعادله جواب مورد قبول برابر است

با :

- دامنه‌ی تابع  $f$  به صورت مجموعه برابر است با :

- به صورت بازه، دامنه برابر است با :

**مثال ۱۱:** دامنه‌ی تابع مقابله را به دست آورید.

$$Z(x) = \frac{3x^2}{x^2 - 5x}$$

حل: ریشه‌ها را محاسبه می‌کنیم :

$$x^2 - 5x = x(x - 5) = 0 \quad : x = 0, x = 5$$

دامنه  $Z$  برابر با :

$$D_Z = \mathbb{R} \setminus \{0, 5\}$$

**مثال ۱۲:** رابطه‌ی  $f$  به صورت مقابله مفروض است.

$$f(x, y) = x \cdot 3y^2 + 27, x, y \in \mathbb{R}$$

آیا  $f$  یک تابع است؟ چرا؟

حل: به ازای  $x$  چون دو مقدار برای  $y$  به دست می‌آید

$$x \cdot 0 = 3y^2 + 27 \quad y^2 = 9 \quad y = \pm 3$$

پس  $f$  یک تابع نیست.

مثال ۱۳: دامنه‌ی تابع مقابله را به دست آورید.

$$f(x) = \frac{3x+1}{\sqrt{9-x^2}}$$

حل: چون فرجه زوج و عبارت زیر رادیکال مخرج کسر

$$D_f = \{x | x \in \mathbb{R}, 9 - x^2 \neq 0\}$$

است، پس:

$$9 - x^2 \neq 0 \Rightarrow x^2 \neq 9 \Rightarrow |x| \neq 3 \Rightarrow x \neq \pm 3$$

نامعادله‌ی مقابله را حل می‌کیم:

$$D_f = (-3, 3)$$

دامنه‌ی تابع  $f$  برابر است با:

نکته: تابع  $f$  به صورت چند ضابطه‌ای در مقابله مفروض است دامنه‌ی تابع  $f$  برابر با اجتماع  $D_1$  و  $D_2$  و ... است، یعنی:

$$\begin{aligned} f_1(x) & , x \in D_1 \\ \vdots f_2(x) & , x \in D_2 \\ f(x) & . \\ \vdots & \\ \vdots f_{n-1}(x) & , x \in D_{n-1} \\ \vdots f_n(x) & , x \in D_n \end{aligned}$$

$$D_f = D_1 \cup D_2 \cup D_3 \cup \dots \cup D_n$$

بنابراین، دامنه‌ی تابع  $f$  برابر است با:

مثال ۱۴: دامنه‌ی تابع مقابله را به دست آورید.

$$f(x) = \begin{cases} 5 & , 0 \leq x < 4 \\ -5 & , x \geq 4 \end{cases}$$

حل: دامنه‌ی تابع  $f$  برابر با اجتماع دامنه‌های تک‌تک

$$D_f = \{x | x \in \mathbb{R}, 0 \leq x < 4\} \cup \{x | x \in \mathbb{R}, x \geq 4\}$$

آن‌هاست، یعنی:

$$\{x | x \in \mathbb{R}, x \geq 0\} \cup \{x | x \in \mathbb{R}, x \geq 4\}$$

دامنه‌ی  $f$  برابر با:

$$f(x) = \begin{cases} x & , x \neq 0 \\ -x & , x = 0 \end{cases}$$

مثال: الف) دامنه‌ی تابع مقابله را بیابید.

ب) مقادیر  $f(0)$  و  $f(-1)$  را بیابید.

ج) تابع  $f$  را رسم کنید.

حل:

الف) هرگاه  $f_1(x) = -x$  و  $f_2(x) = x^3$  دامنه‌ی  $\mathbb{R}$  برابر است با:

ب)  $x$  را در ضابطه‌ی  $x^3$  قرار می‌دهیم،

پس:

۱.  $-x$  را در ضابطه‌ی  $3$  قرار می‌دهیم،

$f(-1) = -(-1) = 3$

يعني:


ج) با توجه به شرط‌های تابع، به ازای مقادیر دلخواه  $x$

مقادیر  $f(x)$  را برای هر ضابطه به دست می‌آوریم (جدول ۲-۱۶-۲).

الف و ب).

جدول ۲-۱۶

$x \#$	$f(x)$	$x \#$	$f(x)$
۰	۰	۰	۳
۱	۱	-۱	۴
۲	۴	-۲	۵
(الف)		(ب)	




شکل ۲-۸۳

— مقادیر جدول ۲-۱۶(الف) و (ب) را در دستگاه محورهای مختصات مشخص می‌کنیم و نمودار هریک را رسم می‌کنیم (شکل ۲-۸۳).


تمرین ۱: تابع رو به رو مفروض است.

$$U(x) = \begin{cases} x^3 & : x \neq 0 \\ 1 & : x = 0 \end{cases}$$



شکل ۲-۸۴

$$\begin{array}{c} 1 \quad x \neq 0 \\ g(x) : \quad \circ \quad x \circ \\ \vdots \\ -1 \quad x \circ \end{array}$$



شکل ۲-۸۵

الف) نمودار تابع  $U$  را رسم کنید.

ب) دامنهٔ تابع  $U(x)$  را تعیین کنید.

تمرین ۲: دامنهٔ تابع با ضابطهٔ مقابل را به دست آورید.

مثال ۱۶: اگر شکل ۲-۸۵ نمایش مجموعهٔ تابع  $f$  باشد،

$$f: A \dots B$$

یعنی:

به سوال‌های زیر پاسخ دهید:

الف) مقادیر  $f(10), f(9), f(5), f(7)$  را

محاسبه کنید.

$$f(3) = 4, f(5) = 4, f(7) = 4,$$

$$f(9) = 4, f(10) = 4$$

$$f \dots (10, 4), (3, 4), (5, 4), (7, 4), (9, 4)$$

ب) تابع  $f$  را به صورت زوج مرتب نمایش دهید.

سپس دامنه و برد آن را مشخص کنید.

ج)  $D_f \cap R_f$  را بیابید.

د)  $D_f \cup R_f$  را پیدا کنید.

ه) آیا می‌توانید ضابطه‌ای برای تابع  $f$  بنویسید؟

- پس بازای هر  $x$  از  $A$  ، داریم :

نکته: تابع بالا را تابع ثابت می‌نامیم که در ادامه مطالب، معرفی می‌گردد.

مثال ۱۷: تابع مقابله مفروض است. مقادیر زیر را محاسبه کنید.

$$f(x) = x^3$$

الف)  $f(4)$  : به جای  $x$ ، عدد ۴ را قرار می‌دهیم، پس :

$$f(4) = 4^3 = 64$$

ب)  $f(x \dots x)$  : به جای  $x$ ،  $x \dots x$  را قرار می‌دهیم،

$$f(x \dots x) = (x \dots x)^3$$

$$\text{ج) } f(x \dots x) - f(x)$$

تفاضل برابر است با :

$$f(x \dots x) - f(x) = x^3 - x^3 = 0$$

مثال ۱۸: تابع با ضابطه مقابله مفروض است. مقادیر زیر را محاسبه کنید.

الف)  $f(2)$  : در تابع  $f$  به جای  $x$ ، عدد ۲ را قرار می‌دهیم، پس :

$$f(2) = 3(2)^3 - 5(2) = 12 - 10 = 2$$

$$\text{ب) } f(2 + h) - f(2)$$

در تابع  $f$  به جای  $x$  مقدار  $2 + h$  را قرار می‌دهیم، یعنی :

$$f(2 + h) = 3(2 + h)^3 - 5(2 + h) = 3(8 + 12h + 6h^2 + h^3) - 10 - 5h = 24 + 36h + 18h^2 + 3h^3 - 10 - 5h = 14 + 31h + 18h^2 + 3h^3$$

- مقدار  $f(2 + h)$  برابر است با :

- با توجه به مقادیر  $f(2)$  و  $f(2+h)$ ، تفاضل  $f(2+h) - f(2)$  را محاسبه کنید.

$$f(2+h) - f(2) = \frac{3h^2 + 5h}{x^2 + 4x} \quad \forall h \in \mathbb{R}$$

$f(2+h) - f(2)$  برابر با:


جدول ۲-۱۷

$x < -2$	$x = -2$
$x$	$g(x)$
-2	
-3	
-4	

(الف)

$x < -2$	$x = -2$
$x$	$g(x)$
-2	
-1	
0	

(ب)



شکل ۲-۸۶

جدول ۲-۱۸

5	□	1	2	3	4
$f(5)$	4	□	6	□	□

$$f(1) = 4, f(2) = 6, f(3) = 5, f(4) = ?$$

### تمرین

۱- تابع با صابطه  $y = g(x) = \frac{3x^2 + 5x}{x^2 + 4x}$  مفروض است.

کارهای زیر را انجام دهید:

الف) جدول ۲-۱۷ (الف) و (ب) را تکمیل کنید.

ب) نمودار تابع  $y = g(x)$  را با توجه به مقادیر بدست آمده از جدول ۲-۱۷ (الف) و (ب) رسم کنید.

۲- هرگاه  $f(5) = 5$  و  $f(4) = 4$  باشد.

باشد.

الف) جدول ۲-۱۸ را تکمیل کنید.

ب) مؤلفه‌ی دوم تابع  $f$  را بنویسید.

ج) آیا می‌توان گفت  $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 5$ ؟

## آزمون پایانی (۴)

### محل پاسخ به سؤالات آزمون پایانی (۴)

۱- دامنه‌ی هریک از توابع زیر را بنویسید :

$$1) f(x) = 5x^4 - 4x + 1$$

$$2) f(x) = \frac{-4x + 1}{x^4 - 7x + 12}$$

$$3) f(x) = \sqrt[3]{\frac{3x - 1}{5 - 7x}}$$

$$4) f(x) = \frac{7x + 1}{5x^4 + 8}$$

$$5) f(x) = x - \sqrt{1-x^2}$$

$$6) f(x) = \sqrt{\frac{3x - 1}{x^2 - 1}}$$

۲- تابع  $f(x)$  و  $D_f$  در مقابل مفروض‌اند :

- تابع  $f$  را به صورت زوج مرتب و جدول نوشته و برد آن را بنویسید.

۳- تابع چندضابطه‌ای  $f$  در مقابل مفروض است

دامنه و برد تابع  $f$  را بنویسید.

$$D_f = \mathbb{R}, f(x) = \begin{cases} \frac{6}{x}, & x < 0 \\ \frac{6}{x}, & 0 < x < 2 \\ \frac{6}{x}, & x > 2 \end{cases}$$

$$f(x) = \begin{cases} -2, & x < -2 \\ 2x^2, & -2 \leq x < 0 \\ 32x^3, & 0 \leq x < 2 \\ 52x^5, & 2 \leq x \end{cases}$$