

فصل هفتم

ماتریس و دترمینان

هدف‌های رفتاری: در پایان این فصل، از فرآگیرنده انتظار می‌رود:

- ۱- ماتریس، انواع و کاربردهای آن را بیان کند و جبر ماتریس‌ها را نشان دهد.
- ۲- جمع ماتریس‌ها، خصوصیات آن‌ها، ضرب ماتریس در عدد و کاربرد آن را توضیح دهد.

۳- ضرب ماتریس‌ها و کاربرد آن را انجام دهد.

۴- دترمینان را تعریف و مقدار آن را محاسبه کند و خواص آن را توضیح دهد.

۵- معکوس ماتریس دو در دو و سه در سه و کاربرد آن را در مسائل انجام دهد.

۷- ماتریس و دترمینان

مقدمه

برای فهم ساده‌تر ریاضیات، گاهی از نمادها و قراردادهایی استفاده می‌شود. از آن جمله ماتریس است که به ما در حل بسیاری از مشکلات کمک کند.

مثلاً برای به حداقل رساندن سود یک شرکت، با توجه به محدودیت‌هایی، مثل نیروی انسانی، ساعت کار، اعتبارات بانکی، مواد اولیه، عرضه و تقاضا، می‌توان از ماتریس استفاده کرد یا برای به حداقل رساندن هزینه‌ی یک بیمارستان یا یک مؤسسه دولتی ماتریس و معکوس ماتریس به کار می‌رود. امروزه در اکثر بنگاه‌های خصوصی و دولتی از برنامه‌ریزی خطی، سیمپلکس، ماتریس تصمیم‌گیری و مدل شبکه، مدل تخصیصی کار و حمل و نقل، که القابی همه‌ی آن‌ها ماتریس است، استفاده فراوان می‌گردد.

برای مثال، فرض کنید شرکت نفت ایران سه انبار در محلهای A، B و C دارد و سه پمپ بنزین باید از طریق این انبارها تغذیه شوند. اگر P_1 ، P_2 و P_3 پمپ‌های بنزین باشند و فاصله‌ی آن‌ها تا انبارهای مزبور به شرح زیر باشد:

کیلومتر است	۴۰	P_1	تا	A	فاصله‌ی
کیلومتر است	۲۵	P_2	تا	A	فاصله‌ی
کیلومتر است	۲۰	P_3	تا	A	فاصله‌ی
کیلومتر است	۳۰	P_1	تا	B	فاصله‌ی
کیلومتر است	۱۵	P_2	تا	B	فاصله‌ی
کیلومتر است	۳۵	P_3	تا	B	فاصله‌ی
کیلومتر است	۱۵	P_1	تا	C	فاصله‌ی
کیلومتر است	۳۰	P_2	تا	C	فاصله‌ی
کیلومتر است	۴۵	P_3	تا	C	فاصله‌ی

این اطلاعات را می‌توانیم در کروشهای به این شکل نشان دهیم. در بعضی از کتاب‌ها به جای کروشه از پرانتز هم استفاده می‌گردد.

$$\begin{matrix} P_1 & P_2 & P_3 \\ \begin{matrix} A \\ B \\ C \end{matrix} & \begin{matrix} 40 & 25 & 20\# \\ 30 & 15 & 35\% \\ 15 & 30 & 45\% \end{matrix} & \end{matrix}$$

محل تلاقی خطوط افقی و قائم، فاصله‌ی انبار تا پمپ بنزین را نشان می‌دهد.
این آرایه‌ی اعداد مثالی از یک ماتریس است. به آرایه‌ای از اعداد در شکل زیر دقت کنید.
هر کدام از این آرایه‌ها را یک ماتریس می‌نامند.

$$A = \begin{matrix} 5 & 1\# \\ . & \% \\ ! & 2\% \end{matrix}$$

$$B = \begin{matrix} 2\# \\ . \% \\ ! 3\% \end{matrix}$$

$$C = \begin{matrix} \& 3 & 5 & 7 & 9 \end{matrix}.$$

$$D = \begin{matrix} & 1 & 2 \\ 1 & . & \% \\ & 1 & 4 \% \\ & . & \% \\ & 2 & 5 \% \end{matrix}$$

$$E = \begin{matrix} 1 & 3 & 2 & 4 \\ 1 & 3 & 5 & 1 & 2 \end{matrix} \%$$

نام هر ماتریس را با حروف بزرگ الفبای لاتین نشان می‌دهند مانند ماتریس A، B، C، D، E و

۱- سطر یک ماتریس

هر یک از اعداد داخل کروشه را یک درایه‌ی یا یک عضو ماتریس می‌نامند.
درایه‌هایی را که در امتداد یک خط افقی قرار گیرند، یک سطر ماتریس می‌نامند. مانند ۶، ۵، ۴، ۳، ۲، ۱ در ماتریس A.

$$A = \begin{matrix} 2 & 5 & 6 \\ . & 2 & 1 \\ 1 & 0 & 3 \end{matrix} \%$$

۲- ستون یک ماتریس

درایه‌هایی را، که در امتداد یک خط قائم قرار گیرند، یک ستون ماتریس می‌نامند، مانند ۲، ۱، ۰ یا ۲، ۱، ۰ در همان ماتریس A.

بنابراین، این ماتریس دارای ۳ سطر و ۳ ستون است.
بدیهی است ۶، ۵، ۲ را سطر اول، ۱، ۰، ۰ را سطر دوم و ۳، ۰، ۱ را سطر سوم ماتریس می‌نامند.

همچنان ۲ را ستون اول، ۵ را ستون دوم و ۰ را ستون سوم می‌نامند.
به ماتریسی مانند A، که m سطر و n ستون داشته باشد، یک ماتریس m در n گفته می‌شود و آن را به صورت $A_{m \times n}$ نشان می‌دهند.

ستون سوم ستون دوم ستون اول

$$A = \begin{matrix} 2 & 7 & 1\# \\ 4 & 0 & \% \\ \cdot & \cdot & \% \end{matrix}$$

سطر دوم

مثال ۱ — ماتریس

$$A_{2 \times 3}$$

را یک ماتریس ۲ در ۳ می‌نامند.

$$B = \begin{matrix} \& 2 & 3 & 4 \end{matrix}.$$

مثال ۲ — ماتریس

$$B_{1 \times 4}$$

یک ماتریس یک در چهار است.

۷—۳ آدرس درایه

هر درایه معمولاً با حرف کوچک الفبای لاتین نشان داده می‌شود.

بعلاوه آدرس هر درایه را به صورت اندیس در کنار آن می‌نویسیم.

رقم سمت چپ نشان‌دهنده‌ی سطر درایه و رقم سمت راست آن نشان‌دهنده‌ی ستون درایه است. به عبارت دیگر آدرس هر درایه عبارت است از سطر و ستونی که آن درایه در ماتریس دارد.

مثال ۳ — در ماتریس A، که یک ماتریس 3×2 است، آدرس درایه‌ی ۳ را مشخص کنید.

$$A = \begin{matrix} 1 & 3 & 4\# \\ . & \% & \% \\ 2 & 1 & 5\% \end{matrix} \quad a_{12} = 3$$

به طور کلی، هر درایه به صورت a_{ij} نشان داده می‌شود که نشان‌دهنده‌ی درایه‌ی سطر iام و ستون jام ماتریس است.

و زاز اعداد طبیعی هستند.

۷—۴ قطر اصلی ماتریس مربع

اگر در یک ماتریس، در درایه‌هایی که در آن $j=i$ باشد دقّت کنیم، مشخص می‌شود که همگی این درایه‌ها روی یک خط راست قرار گرفته‌اند و آن را قطر اصلی ماتریس مربع می‌نامند.

$$A = \begin{matrix} 1 & 2 & 3 & 1\# \\ . & 4 & 2 & 5 & 1\% \\ . & . & 1 & 2 & 3\% \\ . & . & 2 & 3 & 4 & 3\% \end{matrix}$$

مثال ۴ — در ماتریس مربع 4×4

$a_{11}, a_{12}, a_{21}, a_{22}, a_{31}, a_{32}$ و قطر اصلی را تشکیل می‌دهند که به ترتیب عبارت‌اند از: ۱، ۲، ۳ و ۲، ۱.

توضیح: دو درایه از دو ماتریس را زمانی متناظر گویند که آدرس آن‌ها (محل سطر و ستون) یکی باشد.

۷_۵ انواع ماتریس‌ها

۱_۵_۵ ماتریس صفر: به ماتریسی که کلیه درایه‌های آن صفر باشد، ماتریس صفر گویند.

مثال ۵_۵ ماتریس A و B و C نمونه‌ای از ماتریس صفر هستند.

$$A = \begin{matrix} & & \# \\ & \% & \\ ! & & \end{matrix} \quad B = \begin{matrix} & & \# \\ & \% & \\ ! & & \end{matrix} \quad C = \begin{matrix} & & . \\ & & \end{matrix} .$$

۲_۵_۵ ماتریس مربع: اگر در یک ماتریس $m \times n$ داشته باشیم $m = n$ ، این ماتریس را ماتریس مربع مرتبه n یا m گویند. به عبارت دیگر، ماتریس مربع ماتریسی است که تعداد سطرهای و ستون‌های آن با هم برابر باشند.

مثال ۶_۵ ماتریس $C_{2 \times 2}$ یک ماتریس مربع است.

مثال ۷_۵ ماتریس $D_{3 \times 3}$ یک ماتریس مربع است.

۳_۵_۵ ماتریس سط्रی: اگر در یک ماتریس $m \times n$ داشته باشیم $n = 1$ ، این ماتریس را ماتریس سطري می‌نامند.

مثال ۸_۵ ماتریس E را یک ماتریس سطري گویند.

$$E = \begin{matrix} & & \# \\ & \% & \\ ! & & \end{matrix} .$$

۴_۵_۵ ماتریس ستونی: اگر در یک ماتریس $m \times n$ داشته باشیم $m = 1$ ، این ماتریس را ماتریس ستونی می‌نامند.

مثال ۹_۵ ماتریس F را یک ماتریس ستونی می‌نامند.

$$F = \begin{matrix} & & \# \\ & \% & \\ . & \% & \\ . & \% & \\ ! & \% & \end{matrix} .$$

۵-۷ ماتریس بالا مثلثی: به ماتریس مربعی که در آن کلیه‌ی درایه‌های زیر قطر اصلی صفر باشند ماتریس بالا مثلثی می‌گویند.

مثال ۱۰ - ماتریس M را یک ماتریس بالا مثلثی گویند.

$$M = \begin{matrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 6 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \end{matrix} \%$$

۶-۷ ماتریس پایین مثلثی: به ماتریس مربعی که در آن کلیه‌ی درایه‌های بالای قطر اصلی صفر باشند ماتریس پایین مثلثی گویند.

مثال ۱۱ - ماتریس N را یک ماتریس پایین مثلثی گویند.

$$N = \begin{matrix} 2 & 0 & 0 \\ 1 & 3 & 0 \\ 0 & 4 & 1 \end{matrix} \%$$

۷-۵ ماتریس قطری: به ماتریس مربعی که درایه‌های آن به جز درایه‌های روی قطر اصلی صفر باشند، ماتریس قطری گویند، مانند ماتریس B .

$$B = \begin{matrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{matrix} \%$$

۸-۵ ماتریس واحد: یک ماتریس قطری است که کلیه درایه‌های روی قطر اصلی آن یک باشد. به ماتریس واحد، ماتریس یکانی نیز گفته می‌شود. معمولاً ماتریس واحد (یکانی) را با I_n نشان می‌دهند که در آن n تعداد سطرها یا ستون‌های ماتریس است، مانند ماتریس I_3 .

$$I_3 = \begin{matrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{matrix} \%$$

۹-۷ ماتریس ترانهاده یا برگردان

هرگاه جای تمام سطرها و ستون‌های یک ماتریس مانند A را با هم عوض کنیم ماتریس جدیدی به دست می‌آید که آن را ماتریس ترانهاده‌ی ماتریس A می‌نامند و به صورت (A^t) نمایش داده می‌شود.

مثال ۱۲ — ترانهاده یا برگردان ماتریس $A = \begin{matrix} 2 & 3 & 1 \\ 15 & 8 & 7 \end{matrix}$ را به دست آورید.

$$A^t \text{ یا } A^{\text{tr}} = \begin{matrix} 2 & 5\# \\ . & \% \\ . & 3 & 8\% \\ . & \% \\ . & 1 & 7\% \\ . & \% \\ . & 4 & 6\% \end{matrix}$$

۷-۷ دو ماتریس مساوی

دو ماتریس را زمانی مساوی یکدیگر گویند که اولاً تعداد سطرها، ثانیاً تعداد ستونها، ثالثاً درایه‌های متناظر هر دو ماتریس مساوی باشند، یعنی $a_{11} = b_{11}$ و $a_{12} = b_{12}$ و $a_{21} = b_{21}$ و ... و $a_{22} = b_{22}$

مثال ۱۳ — دو ماتریس A و B با هم مساوی هستند؛ زیرا

$$A = \begin{matrix} 1 & 2\# \\ . & \% \\ . & 3 & 4 \end{matrix} \quad B = \begin{matrix} \frac{3}{3} & \frac{6}{3} & \# \\ . & \% \\ . & 9 & 2 \times 2 \% \\ . & \% \end{matrix}$$

هر دو ماتریس 2×2 می‌باشند و درایه‌های متناظر با هم مساوی هستند.

$$\begin{aligned} 1 &= \frac{3}{3} & 2 &= \frac{6}{3} \\ 3 &= \frac{9}{3} & 4 &= 2 \times 2 \end{aligned}$$

۷-۸ جمع ماتریس‌ها

باید توجه داشت دو ماتریس در صورتی می‌توانند با هم جمع شوند که تعداد سطرها و ستون‌های هر دو با هم مساوی باشند. در غیر این صورت، نمی‌توان آن‌ها را با هم جمع نمود.

$$A_{m \times n} + B_{m \times n} = C_{m \times n}$$

حاصل مجموع دو ماتریس، خود یک ماتریس است.

مثال ۱۴ — ماتریس A، که دارای ۲ سطر و ۳ ستون است، با ماتریس B که آن نیز دارای

۲ سطر و ۳ ستون است، قابل جمع کردن هستند، ولی ماتریس A با C را نمی‌توان جمع نمود، زیرا ماتریس C، دارای ۳ سطر و ۳ ستون است.

$$A = \begin{matrix} 2 & 1 & 0 \\ . & ! & 2 \\ 1 & 2 & 3\% \end{matrix} \quad B = \begin{matrix} 1 & 2 & 1 \\ . & ! & 4 \\ 1 & 0 & 1\% \end{matrix} \quad C = \begin{matrix} 1 & 3 & 2 \\ . & 2 & 0 \\ 1 & 4 & 2\% \end{matrix}$$

اگر دو ماتریس A و B، $m \times n$ باشند، مجموع آن‌ها نیز یک ماتریس $m \times n$ مانند C است، به طوری که هر درایه‌ی آن مساوی مجموع درایه‌های متناظرش در A و B است.
مثال ۱۵ — مجموع دو ماتریس A و B را به دست آورید.

$$A = \begin{matrix} 1 & 2 & 3 \\ . & ! & 2 \\ 2 & 0 & 1\% \end{matrix} \quad B = \begin{matrix} 3 & 1 & 2 \\ . & ! & 1 \\ 1 & 0 & 2\% \end{matrix} \quad A + B = \begin{matrix} 1+3 & 2+1 & 3+2 \\ . & ! & 2+1 \\ 2+1 & 0+0 & 1+2\% \end{matrix}$$

چون هر دو ماتریس 3×2 می‌باشند، پس جمع آن‌ها شدنی است و نتیجه، ماتریس C می‌شود که یک ماتریس 3×2 است.

$$C = \begin{matrix} 4 & 3 & 5 \\ . & ! & 3 \\ 3 & 0 & 3\% \end{matrix}$$

مثال ۱۶ — شرکتی انواع کولر را با حجم‌های کوچک، متوسط و بزرگ در مدل‌های عادی و لوکس تولید می‌نماید. اگر تولید آن در شش ماهه‌ی اول و دوم سال به ترتیب جدول زیر باشد، تعیین کنید شرکت در یک سال چند کولر با حجم‌ها و انواع مختلف تولید می‌کند.

شش ماهه‌ی اول		شش ماهه‌ی دوم		
حجم کولر	نوع عادی	نوع لوکس	نوع عادی	نوع لوکس
کوچک	۲۰۰۰	۱۴۰۰	۲۰۰۰	۱۶۰۰
متوسط	۴۱۰۰	۲۱۰۰	۴۳۰۰	۲۰۰۰
بزرگ	۵۲۰۰	۱۵۰۰	۴۰۰۰	۱۱۰۰۰

$$A + B = C$$

ماتریس A را تولید در شش ماهه‌ی اول و ماتریس B را تولید در شش ماهه‌ی دوم سال فرض می‌کنیم.

$$A = \begin{matrix} 2000 & 2700 \\ 4100 & 4300 \end{matrix} \quad B = \begin{matrix} 1600 & 1400 \\ 2000 & 2100 \end{matrix} \quad C = \begin{matrix} 3600 & 4100 \\ 6100 & 6400 \end{matrix}$$

$$\begin{matrix} \% & \% \\ \% & \% \end{matrix} \quad \begin{matrix} \% & \% \\ \% & \% \end{matrix} \quad \begin{matrix} \% & \% \\ \% & \% \end{matrix}$$

$$\begin{matrix} 1500 & 5200 \\ 1100 & 4000 \end{matrix} \quad \begin{matrix} 2600 & 9200 \\ 2600 & 9200 \end{matrix}$$

درنتیجه ماتریس C، که مجموع A و B است، تولید کولر در یک سال را مشخص می‌نماید.

مثال ۱۷ — ماتریس A و B را با هم جمع کنید.

$$A = \begin{matrix} 1 & 2 \\ 3 & 1 \end{matrix} \quad B = \begin{matrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{matrix}$$

به دلیل این که تعداد سطر و ستون دو ماتریس با هم یکی نیست، پس جمع آن‌ها امکان‌پذیر نیست.

۹—۷ ضرب عدد حقیقی در ماتریس

اگر k عددی حقیقی و A ماتریس $m \times n$ باشد، حاصل ضرب k در A ماتریسی خواهد بود، که کلیه‌ی درایه‌های آن برابر با درایه‌های ماتریس A ضربدر k است.

$$k \times A = k \times \begin{matrix} a & b \\ c & d \end{matrix} = \begin{matrix} ka & kb \\ kc & kd \end{matrix}$$

مثال ۱۸ — اگر $A = \begin{matrix} 1 & 2 \\ 3 & 1 \end{matrix}$ باشد، حاصل ضرب عدد ۵ را در A بیابید.

$$5 \times A = 5 \times \begin{matrix} 1 & 2 \\ 3 & 1 \end{matrix} = \begin{matrix} 5 & 10 \\ 15 & 5 \end{matrix}$$

مثال ۱۹ — فرض کنید فروش فروردین ماه ۳ نوع محصول شرکت ایران خودرو (سمند، پژو ۲۰۶ و پارس) در شهر تهران و اصفهان به صورت زیر است :

پارس پژو ۲۰۶ سمند

$$F = \begin{matrix} 110 & 70 & 90 \\ 60 & 100 & 140 \end{matrix}$$

اگر پیش‌بینی شود، فروش این شرکت در اردیبهشت ماه ۱۰٪ افزایش یابد، ارقام مربوط به

میزان فروش ماه اردیبهشت این شرکت در ۲ شهر تهران و اصفهان را به صورت ماتریس بنویسید.

٪۱۰ افزایش فروش فروش فوردهن فروش اردیبهشت

$$F_2 = F_1 + \frac{1}{1} F_1 = \frac{1}{1} F_1 = \frac{1}{1} \begin{pmatrix} 110 & 70 & 90 \\ 160 & 100 & 140 \end{pmatrix}$$

پارس پژو ۲۰۶ سمند

$$F_2 = \begin{pmatrix} 121 & 77 & 99 \\ 166 & 110 & 154 \end{pmatrix} \begin{matrix} \# \\ \# \\ \% \end{matrix}$$

تهران اصفهان

۷-۱ ضرب یک ماتریس سطحی در یک ماتریس ستونی

برای درک بهتر موضوع به مثال زیر توجه کنید.

مثال ۲۰- در سال گذشته، شرکتی سه نوع کولر رومیزی، آبی و گازی را به تعداد ۵,۰۰۰ و ۴,۰۰۰ و ۳,۰۰۰ به فروش رسانده است. اگر قیمت هر دستگاه کولر به ترتیب برابر با ۲۵۰,۰۰۰ و ۳۰۰,۰۰۰ و ۲۵۰,۰۰۰ ریال باشد، فروش شرکت را در سال قبل تعیین کنید.

تعداد کولرهای رومیزی را می‌توان با یک ماتریس سطحی A نمایش داد.

$$A_{1 \times 3} = \begin{pmatrix} \text{گازی} & \text{آبی} & \text{رومیزی} \\ 3,000 & 4,000 & 80,000 \end{pmatrix}$$

همچنان، بهای فروش هر دستگاه را می‌توان با یک ماتریس ستونی نشان داد.

بهای کولر رومیزی

بهای کولر آبی

بهای کولر گازی

$$B_{3 \times 1} = \begin{pmatrix} 140,000 \\ 250,000 \\ 300,000 \end{pmatrix} \begin{matrix} \% \\ \% \\ \% \end{matrix}$$

حاصل ضرب این دو ماتریس برابر است با :

$$A \times B = 80,000 \times 140,000 + 4,000 \times 250,000 + 3,000 \times 300,000 = 140,000 \#$$

$$= 80,000,000 + 1,000,000,000 + 900,000,000 = 8,600,000,000 .$$

$$= 8,600,000,000 .$$

همان‌گونه که ملاحظه می‌شود، اولین درایه‌ی ماتریس سط्रی را در اولین درایه‌ی ماتریس ستونی، سپس دومین درایه‌ی ماتریس سطري را در دومین درایه‌ی ماتریس ستونی و بالأخره سومین درایه‌ی ماتریس سطري را در سومین درایه‌ی ماتریس ستونی ضرب می‌کنیم. سرانجام حاصل ضرب های به دست آمده را با هم جمع می‌کنیم تا نتیجه، که یک ماتریس 1×1 است، به دست آید.

دقت کنید که ضرب یک ماتریس سطري A، در یک ماتریس ستونی B فقط وقتی شدنی است که تعداد ستون‌های ماتریس A مساوی با تعداد سطرهای ماتریس B باشد.

بنابراین، اگر A یک ماتریس $n \times 1$ و B یک ماتریس $1 \times n$ باشد، برای پیدا کردن حاصل ضرب

$A \times B$ به صورت زیر عمل می‌کنیم :

اولین درایه‌ی ماتریس سطري را در اولین درایه‌ی ماتریس ستونی ضرب می‌کنیم. سپس دومین درایه‌ی ماتریس سطري را در دومین درایه‌ی ماتریس ستونی ضرب می‌نماییم. پس از آن سومین درایه‌ی ماتریس سطري را در سومین درایه‌ی ماتریس ستونی ضرب می‌نماییم و بالأخره آخرین درایه‌ی ماتریس سطري را در آخرین درایه‌ی ماتریس ستونی ضرب می‌نماییم.

حاصل ضرب های به دست آمده را با هم جمع می‌کنیم تا نتیجه حاصل گردد.

مثال ۲۱

$$A = \begin{matrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{matrix} \quad B = \begin{matrix} 1 \\ 2 \end{matrix}$$

$$A \times B = 1 \cdot 1 + 2 \cdot 2 = 5$$

$$A \times B = \begin{matrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{matrix} \quad B = \begin{matrix} 1 \\ 2 \end{matrix}$$

$$A \times B = \begin{matrix} 1 \cdot 1 + 2 \cdot 2 \\ 3 \cdot 1 + 4 \cdot 2 \end{matrix} = \begin{matrix} 5 \\ 11 \end{matrix}$$

چون ماتریس A، 3×1 و ماتریس B، 2×1 است، لذا ضرب آن‌ها عملی نیست.

۱۱-۷ ضرب ماتریس‌ها

اگر دو ماتریس A و B مفروض باشند، تنها شرطی که بتوان ماتریس A را در ماتریس B ضرب نمود ($A \times B$)، این است که تعداد ستون‌های ماتریس A برابر با تعداد سطرهای ماتریس B باشد.

اگر ماتریس A یک ماتریس $p \times m$ و یک ماتریس $n \times p$ باشد، برای به دست آوردن ماتریس

A \times B که یک ماتریس $m \times n$ خواهد بود به صورت زیر عمل می‌کنیم.
 اولاً، ماتریس B را به n ماتریس ستونی تجزیه می‌کنیم. ثانیاً، ماتریس A را طبق روش قبلی در هریک از این ماتریس‌های ستونی ضرب می‌نماییم. ثالثاً، ضرب‌های بدست آمده را که به صورت ماتریس‌های ستونی هستند از چپ به راست ستون‌های اول تا m ماتریس حاصل ضرب قرار می‌دهیم.
مثال ۲۳ – حاصل ضرب A \times B را پیدا کنید.

$$A = \begin{matrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{matrix} \quad B = \begin{matrix} 2 & 3 \\ 4 & 1 \end{matrix}$$

$$A \times B = \begin{matrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{matrix} \begin{matrix} 2 & 3 \\ 4 & 1 \end{matrix} = \begin{matrix} 1 \times 2 + 2 \times 4 & 1 \times 3 + 2 \times 1 \\ 3 \times 2 + 4 \times 4 & 3 \times 3 + 4 \times 1 \end{matrix} = \begin{matrix} 10 & 5 \\ 13 & 12 \end{matrix}$$

چون هر دو ماتریس 2×2 هستند، پس ضرب آن‌ها شدنی است و نتیجه، یک ماتریس 2×2 خواهد بود.

در این مثال می‌توان A \times B را محاسبه نمود. چون هر دو ماتریس 2×2 هستند.
 ضرب ماتریس‌ها خاصیت جابه‌جایی ندارد.

A \times B . B \times A

$$B \times A = \begin{matrix} 2 & 3 \\ 4 & 1 \end{matrix} \begin{matrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{matrix} = \begin{matrix} 2 \times 1 + 3 \times 3 & 2 \times 2 + 3 \times 4 \\ 4 \times 1 + 1 \times 3 & 4 \times 2 + 1 \times 4 \end{matrix} = \begin{matrix} 11 & 16 \\ 7 & 12 \end{matrix}$$

$$\begin{matrix} 10 & 11 & 16 \\ 12 & 13 & 12 \end{matrix}$$

ملاحظه می‌شود حاصل ضرب A \times B با B \times A برابر نیست.

مثال ۲۴ – دو ماتریس A \times B مفروض است. حاصل ضرب A \times B را پیدا کنید.

چون تعداد ستون‌های ماتریس A برابر با تعداد سطرهای ماتریس B است، پس این ضرب شدنی است.

$$A \times B = \begin{matrix} 2 & 3 \\ 1 & 5 \end{matrix} \begin{matrix} 1 & 3 \\ 2 & 4 \end{matrix} = \begin{matrix} 2 & 3 \\ 5 & 6 \end{matrix}$$

$$(2 \times 2) \quad (2 \times 3) \quad \text{زیرا } 2 = 2$$

ستون اول حاصل ضرب

$$2 \ 3\# \ 1\# \quad 2 \times 1 + 3 \times 2\# \quad 8\# \\ !^{\circ} \ 5\% \times !^{\circ} 2\% = !^{\circ} 1 \times 1 + 5 \times 2\% = !^{\circ} 1\%$$

ستون دوم حاصل ضرب

$$2 \ 3\# \ 3\# \quad 2 \times 3 + 3 \times 4\# \quad 18\# \\ !^{\circ} \ 5\% \times !^{\circ} 4\% = !^{\circ} 0 \times 3 + 5 \times 4\% = !^{\circ} 2\%$$

ستون سوم حاصل ضرب

$$2 \ 3\# \ 5\# \quad 2 \times 5 + 3 \times 6\# \quad 28\# \\ !^{\circ} \ 5\% \times !^{\circ} 6\% = !^{\circ} 0 \times 5 + 5 \times 6\% = !^{\circ} 3\%$$

به طور خلاصه

$$A \times B = \begin{matrix} 8 & 18 & 28\# \\ !^{\circ} 10 & 20 & 30\% \end{matrix}$$

دقت کنید که در این مثال $A \times B$ را نمی‌توان محاسبه نمود؛ زیرا

$$B \times A = \begin{matrix} 1 & 3 & 5\# & 2 & 3\# \\ !^{\circ} 2 & 4 & 6\% & !^{\circ} 10 & 5\% \\ 2 \times 3) & 2 \times 2 \end{matrix} \quad 2.3$$

۱۲- تفریق ماتریس‌ها

تفریق ماتریس‌ها نیز مانند جمع آن‌هاست، با درنظر گرفتن این مطلب که تفریق حالت خاصی از جمع است، لذا برای انجام عمل تفریق $B - A$ ، که در آن A و B دو ماتریس هم مرتبه‌ی دلخواه‌اند، در ابتدا تمام اعضای ماتریس B را در ۱ - ضرب می‌کنیم و سپس عمل جمع $(-B) + A$ را انجام می‌دهیم.

مثال ۲۵ - اگر

$$A = \begin{matrix} 5 & 3 & 2\# \\ !^{\circ} 1 & 4\% \end{matrix}$$

و

$$B = \begin{matrix} 3 & 2 & 3\# \\ !^{\circ} 2 & 1 & 3\% \end{matrix}$$

باشد، آن‌گاه $A - B$ را محاسبه کنید.

$$(-1) \times B = -B = \begin{matrix} -3 & -2 & -3\# \\ !^{\circ} -2 & -1 & -3\% \end{matrix}$$

$$A - B = A + (-B) = \begin{vmatrix} 5 & 3 & 2\# \\ 1 & 4\% & -2 \\ -2 & -1 & -3\% \end{vmatrix}$$

$$= \begin{vmatrix} 5-3 & 3-2 & 2-3\# \\ -2 & 1-1 & 4-3\% \end{vmatrix} \quad A - B = \begin{vmatrix} 2 & 1 & -1\# \\ -2 & 0 & 1\% \end{vmatrix}$$

۱۳-۷ دترمینان

فقط برای ماتریس مریع می‌توان عددی به نام دترمینان به دست آورد و برای ماتریس‌هایی که سطر و ستون آن‌ها مساوی نباشد، محاسبه‌ی دترمینان امکان ندارد. دترمینان ماتریس مریع $A, n \times n$ است،

به صورت $|A|$ نمایش داده می‌شود. اگر $A = \begin{vmatrix} a & b\# \\ c & d \end{vmatrix}$ یک ماتریس 2×2 باشد، عدد حقیقی $|A|$ برابر

با $ad - bc$ را دترمینان ماتریس A می‌نامیم.

$$\det A = |A| = \begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} = ad - bc$$

اگر A یک ماتریس 3×3 باشد، دترمینان A را به شکل زیر محاسبه می‌کیم.

$$A = \begin{vmatrix} a & b & c\# \\ d & e & f\% \\ g & h & i\% \end{vmatrix}$$

$$|A| = \begin{vmatrix} a & b & c\# \\ d & e & f\% \\ g & h & i\% \end{vmatrix} = a \begin{vmatrix} e & f \\ h & i \end{vmatrix} - b \begin{vmatrix} d & f \\ g & i \end{vmatrix} + c \begin{vmatrix} d & e \\ g & h \end{vmatrix}$$

روشن است که برای محاسبه‌ی دترمینان، ابتدا درایه‌ی a_{11} را در دترمینان ماتریس A با حذف سطر اول و ستون اول آن ضرب می‌کنیم. سپس، منفی درایه‌ی a_{12} را در دترمینان ماتریس A ، با حذف سطر اول و ستون دوم آن ضرب می‌کنیم و بالآخره درایه‌ی a_{13} را در دترمینان ماتریس A ، با حذف سطر اول و ستون سوم آن ضرب می‌نماییم تا از حاصل جمع این سه عدد، دترمینان A به دست آید.

$$|A| = a(ei - fh) - b(di - fg) + c(dh - eg)$$

$$= aei - afh - bdi + bfg + cdh - ceg$$

$$|A| = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 2 & 2 & 1 \\ 1 & 0 & 2 \end{vmatrix}$$

مثال ۲۶— دترمینان ماتریس A را به دست آورید.

$$|A| = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 2 & 2 & 1 \\ 1 & 0 & 2 \end{vmatrix} = 1 \times \begin{vmatrix} 3 & 1 \\ 0 & 2 \end{vmatrix} - 2 \times \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} + 2 \times \begin{vmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 0 \end{vmatrix} =$$

$$1 \times (6 - 0) - 3 \times (4 - 1) + 2 \times (0 - 3) = 6 - 9 - 6 = -9$$

اگر A یک ماتریس 4×4 باشد، برای پیدا کردن دترمینان A با توجه به مطالبی که گفته شد، به شرح زیر عمل می‌کنیم.

$$A = \begin{vmatrix} a & b & c & d \\ e & f & g & h \\ i & j & k & l \\ m & n & o & p \end{vmatrix}$$

$$|A| = \begin{vmatrix} a & b & c & d \\ e & f & g & h \\ i & j & k & l \\ m & n & o & p \end{vmatrix} = a \times \begin{vmatrix} f & g & h \\ j & k & l \\ n & o & p \end{vmatrix} - b \times \begin{vmatrix} e & g & h \\ i & k & l \\ m & o & p \end{vmatrix} +$$

$$c \times \begin{vmatrix} e & f & h \\ i & j & l \\ m & n & p \end{vmatrix} - d \times \begin{vmatrix} e & f & g \\ i & j & k \\ m & n & o \end{vmatrix}$$

دقت کنید که علامت ضرب a_{ij} با استفاده از دستور $(-1)^{i+j}$ به دست آمده است.
به طور کلی، برای پیدا کردن دترمینان A، که یک ماتریس $n \times n$ است، به این صورت عمل می‌کنیم.

$$|A| = |a_{ij}| = \begin{vmatrix} a_{11} & \dots & a_{1j} & \dots & a_{1n} \\ a_{n1} & \dots & a_{nj} & \dots & a_{nn} \end{vmatrix} = \sum_{j=1}^n a_{ij} \cdot A_{ij}$$

در این رابطه a_{ij} عبارت از درایه‌ی یک سطر یا یک ستون از ماتریس A است و \dot{A}_{ij} را همسازه‌ی (کوفاکتور یا زیر ماتریس) درایه‌ی a_{ij} گویند.

بنابراین، دترمینان ماتریس A عبارت است از حاصل ضرب داخلی درایه‌ی یک سطر با یک

ستون ماتریس A در همسازه‌های \dot{A}_{ij} .

مقدار \dot{A}_{ij} برابر با $(-1)^{i+j} \det(A_{ij})$ ضریب در دترمینان ماتریس حاصل از A با حذف سطر i و ستون j است.

مثال ۲۷— دترمینان ماتریس B را که 4×4 است، پیدا کنید.

$$B = \begin{vmatrix} -1 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & -1 & 2 \\ 1 & 0 & 0 & -3 \end{vmatrix} \quad |B| = \begin{vmatrix} -1 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & -1 & 2 \\ 1 & 0 & 0 & -3 \end{vmatrix}$$

$$= -1 \times \begin{vmatrix} -1 & 2 & 1 \\ 0 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & -3 \end{vmatrix} - 2 \times \begin{vmatrix} 0 & 2 & 1 \\ -1 & 2 & 1 \\ 1 & 0 & -3 \end{vmatrix} + 0 \times \begin{vmatrix} 0 & -1 & 1 \\ 0 & 2 & 1 \\ 1 & 0 & -3 \end{vmatrix} - 0 \times \begin{vmatrix} 0 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & -1 \\ 1 & 0 & 0 \end{vmatrix}$$

$$= -1 \times \begin{vmatrix} -1 & 2 & 1 \\ 0 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & -3 \end{vmatrix} - 2 \times \begin{vmatrix} 0 & 2 & 1 \\ -1 & 2 & 1 \\ 1 & 0 & -3 \end{vmatrix} + 0 + 0$$

سپس دترمینان‌های مرتبه‌ی ۳ را بر حسب ستون‌های اول آن‌ها بسط می‌دهیم.

$$|B| = (-1)(-1) \begin{vmatrix} -1 & 2 \\ 0 & -3 \end{vmatrix} + (-2)(1) \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 2 \end{vmatrix} =$$

$$1(3 - 0) - 2(4 + 1) = 3 - 10 = -7$$

۱۳-۷ ماتریس الحاقی: فرض کنیم $A_{ij} \neq 0$ یک ماتریس مربع $M \times M$ باشد. آن‌گاه

بنا بر تعریف، ماتریس الحاقی برای ماتریس مربع A ، که با $\text{adj } A$ نمایش داده می‌شود، عبارت است از برگردان ماتریس حاصل از A ، به‌طوری که در آن به‌جای عناصر a_{ij} ، همسازه‌های آن‌ها یعنی A_{ij} قرار گرفته‌اند. به عبارت دیگر ماتریس الحاقی $\text{adj } A$ برابر است با برگردان ماتریس مربعی که به‌جای هر عنصر آن a_{i+j-1} برابر دترمینان زیر ماتریس حاصل از همان عنصر قرار گرفته باشد.

$$A = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}$$

مثال ۲۸ - فرض کنیم

ماتریس الحاقی آن برابر است با

$$\text{adj } A = \begin{vmatrix} A_{11} & A_{21} & A_{31} \\ A_{12} & A_{22} & A_{32} \\ A_{13} & A_{23} & A_{33} \end{vmatrix}$$

که در آن A_{ij} همسازه‌ی a_{ij} است، مثل

$$A_{11} = (-1)^{1+1} \begin{vmatrix} a_{22} & a_{23} \\ a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}$$

و یا

$$A_{12} = (-1)^{1+2} \begin{vmatrix} a_{21} & a_{23} \\ a_{31} & a_{33} \end{vmatrix}$$

$$A = \begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix}$$

مثال ۲۹ - ماتریس الحاقی

را به‌دست آورید.

$$\text{adj}A = \begin{vmatrix} d & -b^{\#} \\ -c & a \end{vmatrix}$$

$$A = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3^{\#} \\ 1 & 3 & 4\% \\ 1 & 4 & 3\% \end{vmatrix}$$

$$\text{adj}A = \begin{vmatrix} 3 & 4 & -2 & 3 & 2 & 3 & 3^{\#} \\ 4 & 3 & 4 & 3 & 3 & 4 & \% \\ 1 & 4 & 1 & 3 & 1 & 3 & \% \\ 1 & 3 & 1 & 3 & 1 & 4 & \% \\ 1 & 3 & 1 & 2 & 1 & 2 & \% \\ 1 & 4 & 1 & 4 & 1 & 3 & \% \end{vmatrix}$$

$$\text{adj}A = \begin{vmatrix} -7 & 6 & -1^{\#} \\ 1 & 0 & -1\% \\ 1 & -2 & 1\% \end{vmatrix}$$

مثال ۳۰— ماتریس الحاقی

را به دست آورید.

۷- خواص دترمینان‌ها

۱— هرگاه جای تمام سطرهای و ستون‌های یک ماتریس را با یکدیگر عوض کنیم، دترمینان آن ماتریس تغییر نمی‌کند.

$$\begin{vmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{vmatrix}$$

۲— از تعویض دو سطر (یا دو ستون) یک ماتریس مربع با یکدیگر، تنها علامت دترمینان آن تغییر می‌یابد.

$$\begin{vmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \end{vmatrix} = - \begin{vmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \end{vmatrix}$$

۳- هرگاه دو سطر (یا دو ستون) یک ماتریس مساوی باشد، دترمینان آن ماتریس صفر خواهد بود.

$$\begin{vmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \end{vmatrix} = 0$$

۴- هرگاه تمام درایه‌های یک سطر یا یک ستون یک ماتریس در عددی مانند k ضرب شود، دترمینان آن ماتریس نیز در k ضرب می‌شود.

$$\begin{vmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ ka_2 & kb_2 & kc_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{vmatrix} = k \times \begin{vmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{vmatrix}$$

۵- هرگاه تمام درایه‌های یک سطر یا یک ستون ماتریس صفر باشد، دترمینان آن برابر صفر خواهد بود.

$$\begin{vmatrix} 0 & 0 & 0 \\ a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \end{vmatrix} = 0$$

۶- هرگاه به سطر (یا ستون) یک ماتریس، مضرب‌هایی از سطرهای دیگر (یا از ستون‌های دیگر) اضافه کنیم، دترمینان ماتریس حاصل با دترمینان ماتریس قبلی مساوی است. مرتبه‌ی یک ماتریس مربع: به تعداد سطراها یا ستون‌های یک ماتریس مربع، مرتبه‌ی ماتریس نیز می‌گویند.

۷- هرگاه A و B دو ماتریس مربع هم مرتبه باشند، داریم :

$$|A \cdot B| = |A| \cdot |B|$$

یعنی دترمینان حاصل ضرب دو ماتریس، برابر است با حاصل ضرب دترمینان‌های آن دو ماتریس.

مثال ۳۱- دترمینان ماتریس B و A را پیدا کنید.

$$|A| = 0$$

در ماتریس A چون سطر اول صفر است، پس دترمینان آن صفر است.

$$B = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 \\ 0 & 3 & 1 \\ 1 & 2 & 4 \end{pmatrix}$$

$$|B| = 0$$

در ماتریس B چون ستون اول صفر است، پس دترمینان آن صفر است و نیازی به محاسبه ندارد.

مثال ۳۲— دترمینان ماتریس A و B را محاسبه و با هم مقایسه کنید.

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 2 \\ 0 & 2 & 3 \\ 1 & 0 & 2 \end{pmatrix} \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 2 \\ 0 & 4 & 6 \\ 1 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

$$|A| = \begin{vmatrix} 1 & 3 & 2 \\ 0 & 2 & 3 \\ 1 & 0 & 2 \end{vmatrix} = 1 \times \begin{vmatrix} 3 & 1 \\ 0 & 2 \end{vmatrix} - 3 \times \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} + 2 \times \begin{vmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 0 \end{vmatrix}$$

$$1 \times (6 - 0) - 3 \times (4 - 1) + 2 \times (0 - 3) = 6 - 9 - 6 = -9$$

$$|B| = \begin{vmatrix} 1 & 3 & 2 \\ 0 & 4 & 6 \\ 1 & 0 & 2 \end{vmatrix} = 1 \times \begin{vmatrix} 6 & 2 \\ 0 & 2 \end{vmatrix} - 3 \times \begin{vmatrix} 4 & 2 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} + 2 \times \begin{vmatrix} 4 & 6 \\ 1 & 0 \end{vmatrix}$$

$$|B| = 1(12 - 0) - 3(4 \times 2 - 1 \times 2) + 2(4 \times 0 - 1 \times 6)$$

$$|B| = 12 - 3(8 - 2) + 2(-6) = 12 - 18 - 12 = -18$$

ملاحظه می‌شود که تنها تفاوت ماتریس A و B در آن است که سطر دوم ماتریس B همان سطر دوم ماتریس A است، که در عدد ۲ ضرب شده است. بنابراین، با توجه به خاصیت (۴) دترمینان ماتریس B برابر است با همان دترمینان ماتریس A ضرب در عدد ۲. چون دترمینان ماتریس A، -۹ بوده است، پس دترمینان ماتریس B برابر با $2^{-9} = 18$ است.

۷-۱۵ معکوس یک ماتریس

اگر برای یک ماتریس مرّبع $A_{n \times n}$ ، یک ماتریس هم مرتبه با آن، مانند B وجود داشته باشد، به طوری که حاصل ضرب آن‌ها ماتریسی واحد باشد، چنین ماتریسی (B) را معکوس ماتریس A می‌نامند.

$$A_{n \times n} \times B_{n \times n} = I_n = B_{n \times n} \times A_{n \times n}$$

$$B_{n \times n} = A_{n \times n}^{-1} \quad \text{و به این صورت نشان می‌دهند.}$$

ماتریس مرّبع با هر مرتبه، تنها هنگامی دارای معکوس است که دترمینان آن مخالف صفر باشد.
برای روشن‌تر شدن موضوع به مثال زیر توجه فرمایید.

$$A = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} \quad \text{مثال ۳۳— معکوس ماتریس } A \text{ را پیدا کنید.}$$

فرض می‌کنیم معکوس ماتریس A ، ماتریس مانند B باشد. بنابراین، طبق آن‌چه قبلاً گفته شد

$$A \times B = I$$

و یا

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} \begin{vmatrix} b_{11} & b_{12} \\ b_{21} & b_{22} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{vmatrix}$$

$$\begin{vmatrix} a_{11}b_{11} + a_{12}b_{21} & a_{11}b_{12} + a_{12}b_{22} \\ a_{21}b_{11} + a_{22}b_{21} & a_{21}b_{12} + a_{22}b_{22} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{vmatrix}$$

درنتیجه داریم :

$$a_{11}b_{11} + a_{12}b_{21} = 1 \quad (1)$$

$$a_{11}b_{12} + a_{12}b_{22} = 0 \quad (2)$$

$$a_{21}b_{11} + a_{22}b_{21} = 0 \quad (3)$$

$$a_{21}b_{12} + a_{22}b_{22} = 1 \quad (4)$$

برای پیدا کردن درایه‌های ماتریس B به شکل زیر عمل می‌کنیم.

$$b_{11} = \frac{a_{22}}{a_{11}a_{22} - a_{21}a_{12}} \quad \text{از حل دستگاه (1) و (3) نتیجه می‌شود :}$$

$$b_{21} = \frac{-a_{21}}{a_{11}a_{22} - a_{21}a_{12}} \quad \text{و}$$

و از حل دستگاه (۲) و (۴) نتیجه می‌شود :

$$b_{12} = \frac{-a_{12}}{a_{11}a_{22} - a_{21}a_{12}}$$

و

$$b_{22} = \frac{a_{11}}{a_{11}a_{22} - a_{21}a_{12}}$$

توجه کنید که مخرج هریک از این روابط، برابر با دترمینان A است.

$$\det A = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} = a_{11}a_{22} - a_{21}a_{12}$$

بنابراین، اگر $|A| = 0$ باشد ماتریس B نامعین و A^{-1} وجود ندارد. پس، هر ماتریس مربع فقط زمانی دارای معکوس است که دترمینان آن مخالف صفر باشد.

مثال ۳۴— معکوس ماتریس A را پیدا کنید.

$$A = \begin{vmatrix} -1 & 6 \\ 4 & 3 \end{vmatrix} \quad \det A = -3 - 24 = -27 = |A|$$

چون $|A| \neq 0$ پس معکوس آن وجود دارد.

$$b_{11} = \frac{3}{-27} = -\frac{1}{9}$$

$$b_{12} = \frac{-6}{-27} = \frac{2}{9}$$

$$b_{21} = \frac{-4}{-27} = \frac{4}{27}$$

$$b_{22} = \frac{-1}{-27} = \frac{1}{27}$$

پس،

$$\begin{vmatrix} -1 & 6 \\ 4 & 3 \end{vmatrix}^{-1} = \begin{vmatrix} -\frac{1}{9} & \frac{2}{9} \\ \frac{4}{27} & \frac{1}{27} \end{vmatrix} = A^{-1}$$

توجه کنید که :

$$\begin{matrix} -1 & 6\% & -\frac{1}{9} & 2\% \\ \frac{1}{4} & 3\% & \frac{1}{27} & 1\% \end{matrix} \quad \begin{matrix} 1 & 0\% \\ 1\% \end{matrix} \quad A \times A^{-1} = I$$

مثال ۳۵— معکوس ماتریس A را پیدا کنید.

$$A = \begin{matrix} -3 & 15\% \\ 1 & -5\% \end{matrix}$$

$$\det A = 15 - 15 = 0$$

چون دترمینان آن مساوی صفر است، پس، ماتریس A معکوس ندارد. یک ماتریس، زمانی دارای معکوس است که اولاً، این ماتریس مربع باشد و ثانياً، دترمینان آن یعنی $|A|$ مخالف صفر گردد.

۷— پیدا کردن ماتریس معکوس به روش عملیات رديفی

چون استفاده از روش قبلی در محاسبه‌ی معکوس یک ماتریس، همیشه عملی نیست و ممکن است محاسبات به طول انجامد، روش عملیات رديفی نیز قابل استفاده است. این روش بر سه اصل عمده‌ی زیر استوار است :

$$1- \text{قاعده‌ی کلی } A \times A^{-1} = I$$

۲- ضرب یا تقسیم کردن رديف‌های یک ماتریس در یک، یا بر یک عدد غیر صفر.
 ۳- اضافه یا کسر کردن مضربی از یک رديف ماتریس به رديف دیگری از رديف‌های ماتریس.
 برای محاسبه‌ی معکوس یک ماتریس مربع A، ابتدا ماتریس واحد هم مرتبه‌ی آن I_n را مجاور ماتریس A قرار می‌دهیم (يعني $I_n : A$). سپس، بر مبنای این که $I_n = A^{-1} \times A^{-1} \times I_n = A^{-1} \times A \times A^{-1} = I$ و $A^{-1} \times A = I$ عملیات را به شکلی پس می‌گیریم که محل دو ماتریس مجاور در $(I_n : A)$ با یکدیگر تعویض گردند، به شکلی که I محل خود را به A^{-1} بدهد و A به I مبدل شود (يعني $I_n : A^{-1}$). لذا قواعد زیر در عملیات رديفی برای $I_n : A$ به کار می‌رود.

۱- کلیه‌ی درایه‌های بالاترین رديف ماتریس $I_n : A$ را بر اوّلین درایه‌ی سمت چپ آن (برای مرحله‌ی اوّل عملیات، درایه‌ی واقع در رديف يکم و ستون يکم خواهد بود) تقسیم می‌کنیم (به شرطی که این درایه غیر صفر باشد). اماً اگر اوّلین درایه‌ی سمت چپ رديف، صفر باشد ابتدا هر رديف دیگری

از ماتریس را که اولین عنصر آن صفر نباشد با ردیف اول جمع می‌کنیم و سپس قاعده را به کار می‌بریم.
بدیهی است چنان‌چه ردیفی وجود نداشته باشد که اولین درایه‌ی سمت چپ آن غیر صفر باشد، ماتریس معکوس ندارد.

اجرای اولین قاعده سبب می‌گردد که بالاترین درایه‌ی سمت چپ به عدد یک تبدیل گردد و درنتیجه بتوان تجسس را برای داشتن بردار واحد شروع کرد.

۲- چنان مضری از ردیف با اولین درایه‌ی تبدیل شده به واحد را با سایر ردیف‌ها جمع می‌کنیم، به‌شکلی که کلیه‌ی درایه‌ی موجود در ستون حاوی درایه‌ی تبدیل شده به یک (ستون یکم) برابر صفر شوند به‌جز خود درایه‌ی تبدیل شده به واحد که باید تا آخر عملیات واحد باقی بماند.

۳- قاعده‌ی یک و دو را برای کلیه‌ی ردیف‌های باقی‌مانده تکرار می‌نماییم تا آن‌که A^{-1} مشخص گردد. این روش برای حل دستگاه معادلات با استفاده از کامپیوتر کاربرد دارد.

مثال ۳۶- معکوس ماتریس A را با استفاده از روش عملیات ردیفی پیدا کنید.

$$A = \begin{array}{ccc|cc} & & & 3 & 1 \\ & & & 0 & 1 \\ & & & 1 & 0 \\ \hline & & & 1 & 1 \\ & & & 0 & 1 \\ & & & 1 & 0 \end{array}$$

$$A : I = \begin{array}{ccc|cc} & & & 3 & 1 & 5 \\ & & & 0 & 1 & 1 \\ & & & 1 & 0 & 0 \\ \hline & & & 1 & 0 & 2 \\ & & & 0 & 1 & 0 \\ & & & 1 & 0 & 0 \end{array}$$

کلیه‌ی درایه‌های ردیف یکم را بر عدد ۳ تقسیم می‌کنیم.

$$\begin{array}{ccc|cc} & & & 1 & 1 & 5 \\ & & & 0 & 1 & 1 \\ & & & 1 & 0 & 0 \\ \hline & & & 1 & 0 & 2 \\ & & & 0 & 1 & 0 \\ & & & 1 & 0 & 0 \end{array}$$

چنان مضری از ردیف یکم را با سایر ردیف‌ها جمع می‌نماییم که کلیه‌ی درایه‌های ستون یکم به استثنای درایه‌ی اول برابر صفر شوند. به این منظور باید مضرب صفر از ردیف یکم با ردیف دوم و مضرب ۱- از آن ردیف با ردیف سوم جمع شوند.

$$\begin{array}{ccccc|cc} \cdot & 1 & \frac{1}{3} & \frac{5}{3} & 1 & \cdot \\ \cdot & & & & \frac{1}{3} & \cdot \\ \cdot & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ \cdot & & & & & \cdot \\ \therefore & -1 & 1 & \frac{1}{3} & -\frac{1}{3} & 0 \\ \therefore & & & & \frac{1}{3} & \cdot \end{array}$$

سپس اولین درایه‌ی سمت چپ باقی‌مانده برای ردیف دوم عنصر یک است که عملیات را بر روی آن شروع می‌نماییم.
کلیه‌ی درایه‌های ردیف دوم را بر اولین درایه‌ی باقی‌مانده در سمت چپ (عدد یک) تقسیم می‌کنیم.

$$\begin{array}{ccccc|cc} \cdot & 1 & \frac{1}{3} & \frac{5}{3} & 1 & \cdot \\ \cdot & & & & \frac{1}{3} & \cdot \\ \cdot & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ \cdot & & & & & \cdot \\ \therefore & -1 & 1 & \frac{1}{3} & -\frac{1}{3} & 0 \\ \therefore & & & & \frac{1}{3} & \cdot \end{array}$$

چنان مضری از ردیف دوم به سایر ردیف‌ها اضافه می‌کنیم که کلیه‌ی درایه‌های ستون دوم به استثنای درایه‌ی واحد آن برابر صفر شوند. به این منظور باید مضرب $\frac{1}{3}$ از آن با ردیف اول و مضرب $\frac{1}{3}$ از آن با ردیف سوم جمع گردد.

$$\begin{array}{ccccc|cc} \cdot & 1 & 0 & \frac{4}{3} & 1 & -\frac{1}{3} \\ \cdot & & & & \frac{1}{3} & \cdot \\ \cdot & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ \cdot & & & & & \cdot \\ \therefore & 0 & 2 & -\frac{1}{3} & 1 & \frac{1}{3} \\ \therefore & & & & \frac{1}{3} & \cdot \end{array}$$

اینک عملیات ردیفی را برای اولین درایه باقی‌مانده در سمت چپ ردیف سوم (یعنی $\frac{2}{3}$) انجام می‌دهیم. به عبارت دیگر، کلیه‌ی درایه‌های ردیف سوم را بر عنصر $\frac{2}{3}$ تقسیم می‌نماییم.

$$\begin{array}{ccccc|cc} \cdot & 1 & 0 & \frac{4}{3} & 1 & -\frac{1}{3} \\ \cdot & & & & \frac{1}{3} & \cdot \\ \cdot & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ \cdot & & & & & \cdot \\ \therefore & 0 & 1 & -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} & \frac{3}{2} \\ \therefore & & & & \frac{1}{2} & \cdot \end{array}$$

بالآخره برای تبدیل درایه‌های ستون سوم، به استثنای درایه‌ی سوم آن به صفر، باید مضرب ۱- از آن را با ردیف دوم و مضرب $\frac{4}{3}$ - از آن را با ردیف اول جمع نماییم.

$$\begin{array}{cccccc} & & & 1 & -1 & -2 \\ \cdot 1 & 0 & 0 & : & 1 & 1 & -\frac{3}{2} \\ 0 & 1 & 0 & : & 2 & 2 & 2 \\ \cdot 0 & 0 & 1 & : & 1 & 1 & \frac{3}{2} \\ & & & : & -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} & \frac{3}{2} \end{array}$$

ملاحظه می‌شود که در اثر عملیات ردیفی ماتریس $(A : I)$ تبدیل به $(I : A^{-1})$ می‌شود و معکوس به دست آمده است.

۷-۱۶ پیدا کردن ماتریس معکوس با استفاده از ماتریس الحاقی: روش دیگری که برای محاسبه‌ی ماتریس معکوس به کار می‌رود، استفاده از ماتریس الحاقی است. در این روش، دترمینان ماتریسی که می‌خواهیم معکوس آن را به دست آوریم، محاسبه می‌کنیم. اگر A ماتریس (غیرمنفرد، نامنفرد) معکوس پذیر باشد، یعنی $|A| \neq 0$ در این صورت داریم :

$$A^{-1} = \frac{1}{|A|} \text{adj} A$$

مثال ۳۷- معکوس ماتریس $\begin{matrix} 1 & 0 & \# \\ 0 & 2 & \# \\ 3 & 1 & \% \end{matrix}$ را در صورت وجود تعیین کنید.
 $|A| = 3$

$$\text{adj} A = \begin{matrix} 3 & 0 & \# \\ -2 & 1 & \% \end{matrix}$$

درنتیجه

$$A^{-1} = \frac{\text{adj} A}{|A|} = \frac{1}{3} \begin{matrix} 3 & 0 & \# \\ -2 & 1 & \% \end{matrix} = \begin{matrix} 1 & 0 & \# \\ -2 & 1 & \% \\ 3 & 1 & \% \end{matrix}$$

مثال ۳۸- معکوس ماتریس را در صورت وجود تعیین کنید.

$$A = \begin{matrix} 0 & -2 & -3 & \# \\ 1 & 3 & 3 & \% \\ -1 & -2 & -2 & \% \end{matrix}$$

$$|A| = \circ + 2(-2 + 3) + (-3)(-2 + 3) = -1$$

پس عناصر ماتریس الحاقی عبارت اند از

$$\hat{A}_{11} = (-1)^{1+1} \begin{vmatrix} 3 & 3 \\ -2 & -2 \end{vmatrix} = -6 + 6 = 0$$

$$\hat{A}_{12} = (-1)^{1+2} \begin{vmatrix} 1 & 3 \\ -1 & -2 \end{vmatrix} = -(-2 + 3) = -1$$

$$\hat{A}_{13} = (-1)^{1+3} \begin{vmatrix} 1 & 3 \\ -1 & -2 \end{vmatrix} = -2 + 3 = 1$$

$$\hat{A}_{21} = (-1)^{2+1} \begin{vmatrix} -2 & -3 \\ -2 & -2 \end{vmatrix} = -(4 - 6) = 2$$

$$\hat{A}_{22} = (-1)^{2+2} \begin{vmatrix} 0 & -3 \\ -1 & -2 \end{vmatrix} = 0 - 3 = -3$$

$$\hat{A}_{23} = (-1)^{2+3} \begin{vmatrix} 0 & -2 \\ -1 & -2 \end{vmatrix} = -(0 - 2) = 2$$

$$\hat{A}_{31} = (-1)^{3+1} \begin{vmatrix} -2 & -3 \\ 3 & 3 \end{vmatrix} = -6 + 9 = 3$$

$$\hat{A}_{32} = (-1)^{3+2} \begin{vmatrix} 0 & -3 \\ 1 & 3 \end{vmatrix} = -(0 + 3) = -3$$

$$\hat{A}_{33} = (-1)^{3+3} \begin{vmatrix} 0 & -2 \\ 1 & 3 \end{vmatrix} = 0 + 2 = 2$$

$$\text{adj}A = \begin{matrix} \circ & 2 & 3 & \# \\ -1 & -3 & -3 & \% \\ 1 & 2 & 2 & \% \end{matrix}$$

$$A^{-1} = \frac{1}{|A|} \text{adj} A = \begin{matrix} 0 & -2 & -3 \\ 1 & 3 & 3 \\ -1 & -2 & -2 \end{matrix}$$

۷- دستگاه سه معادله‌ی سه مجهولی

برای حل دستگاه سه معادله‌ی سه مجهولی، به ترتیب زیر عمل می‌کنیم.

(الف) ماتریس ضرایب را تشکیل می‌دهیم.

(ب) همسازه‌های ستون اول را تشکیل می‌دهیم.

(ج) A_{11} را در معادله‌ی اول، A_{21} را در معادله‌ی دوم و A_{31} را در معادله‌ی سوم ضرب می‌نماییم.

(د) هر سه معادله را با هم جمع و x را محاسبه می‌کنیم.

مثال ۳۹- دستگاه را با استفاده از همسازه، نسبت به x حل کنید.

$$\cdot 2x + y + z = 0$$

$$\cdot x - y + 5z = 0$$

$$\cdot x - 2y - z = -18$$

$$A = \begin{matrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 5 \\ 1 & -2 & -1 \end{matrix}$$

$$A_{11} = (-1)^1 \begin{vmatrix} -1 & 5 \\ -2 & -1 \end{vmatrix} = 1 + 10 = 11$$

$$A_{21} = (-1)^2 \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ -2 & -1 \end{vmatrix} = -(-1 + 2) = -1$$

$$A_{31} = (-1)^3 \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 5 \end{vmatrix} = 5 + 1 = 6$$

$$\cdot 11(2x + y + z) = 0$$

$$\cdot -1(x - y + 5z) = 0$$

$$\cdot 6(x - 2y - z) = -18 \times 6$$

$$\cdot 22x + 11y + 11z = 0$$

$$\cdot -x + y - 5z = 0$$

$$\cdot 9x - 12y - 6z = -10 \wedge$$

$$(22x - x + 6x) + (11y + y - 12y) + (11z - 5z - 6z) = -10 \wedge$$

$$27x = -10 \wedge$$

$$x = -\frac{10}{27}$$

مثال ۴۰— این دستگاه را با استفاده از همسازه نسبت به x حل کنید.

$$\cdot 2x + y = 2$$

$$\cdot 3x - 2z = 4$$

$$\cdot y + 3z = 1$$

$$A = \begin{vmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 3 & 0 & -2 \\ 0 & 1 & 3 \end{vmatrix} \quad A_{11} = \begin{vmatrix} 0 & -2 \\ 1 & 3 \end{vmatrix} = +2$$

$$A_{21} = (-1)^{2+1} \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 3 \end{vmatrix} = -3 \quad A_{31} = (-1)^{0+1} \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -2 \end{vmatrix} = -2$$

$$2. \quad 4x + 2y = 4$$

$$-3. \quad -9x + 6z = -12$$

$$- . \quad 5x = -10 \quad x = -2$$

$$-2. \quad -2y - 6z = -2$$

روش دیگری برای حل دستگاه سه معادله‌ی سه مجهولی: برای حل دستگاه به ترتیب زیر عمل می‌کنیم.

(الف) ماتریس ضرایب را تشکیل می‌دهیم و آن را $+ \text{ می‌نامیم}$.

(ب) دترمینان $+ \text{ را محاسبه می‌کنیم}$. به شرطی که مخالف صفر باشد.

(ج) در ماتریس ضرایب، ستون اول را با ستون اعداد ثابت دستگاه تعویض می‌کنیم و آن را $+$

می‌نامیم.

د) در ماتریس ضرایب، ستون دوم را با ستون اعداد ثابت دستگاه تعویض می‌کنیم و آن را $+_2$ می‌نامیم.

ه) در ماتریس ضرایب، ستون سوم را با ستون اعداد ثابت دستگاه تعویض می‌کنیم و آن را $+_3$ می‌نامیم.

و) دترمینان $+_1$ و $+_2$ و $+_3$ را محاسبه می‌نماییم.

$$x_i = \frac{+_i}{+}, \quad i=1, 2, 3$$

ز) با استفاده از فرمول

جواب‌های دستگاه به دست می‌آید.

مثال ۴۱ – دستگاه معادلات

$$. \quad 2x_1 + x_2 + x_3 = 2$$

$$. \quad x_1 + 3x_2 + x_3 = 5$$

$$. \quad x_1 + x_2 + 5x_3 = -7$$

را حل کنید.

دترمینان ماتریس ضرایب دستگاه برابر است با

$$= . \begin{vmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 3 & 1 \\ 1 & 1 & 5 \end{vmatrix} = 2(15 - 1) - (5 - 1) + (1 - 3) = 28 - 4 - 2 = 22$$

حال، بقیه‌ی دترمینان‌ها را محاسبه می‌کنیم.

$$+_{x_1} = \begin{vmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 5 & 3 & 1 \\ -7 & 1 & 5 \end{vmatrix} = 2(15 - 1) - (25 + 7) + (5 + 21) = 28 - 32 + 26 = 22$$

$$+_{x_2} = \begin{vmatrix} 2 & 2 & 1 \\ 1 & 5 & 1 \\ 1 & -7 & 5 \end{vmatrix} = 2(25 + 7) - 2(5 - 1) + (-7 - 5) = 64 - 8 - 12 = 44$$

$$+_{x_3} = \begin{vmatrix} 2 & 1 & 2 \\ 1 & 3 & 5 \\ 1 & 1 & -7 \end{vmatrix} = 2(-21 - 5) - (-7 - 5) + 2(1 - 3) = -52 + 12 - 4 = -44$$

درنتیجه

$$x_1 = \frac{+x_1}{+} = \frac{22}{22} = 1 \quad . \quad x_1 = 1$$

$$x_2 = \frac{+x_2}{+} = \frac{44}{22} = 2 \quad . \quad x_2 = 2$$

$$x_3 = \frac{+x_3}{+} = \frac{-44}{22} = -2 \quad . \quad x_3 = -2$$

حال امتحان می‌کنیم.

$$. \quad 2(1) + 2 + (-2) = 2 \quad . \quad 2 = 2$$

$$. \quad 1 + 3(2) + (-2) = 1 + 6 - 2 = 5 \quad . \quad 5 = 5$$

$$. \quad 1 + 2 + 5(-2) = 1 + 2 - 10 = -7 \quad . \quad -7 = -7$$

۱۸-۷ دستگاه چهار معادله‌ی چهار مجهولی (جهت مطالعه آزاد)

برای حل دستگاه چهار معادله‌ی چهار مجهولی، به ترتیب زیر عمل می‌کنیم.

الف) ماتریس ضرایب را تشکیل می‌دهیم و آن را $+ \text{ می‌نامیم}$.

ب) دترمینان $+$ را محاسبه می‌کنیم، به شرطی که مخالف صفر باشد.

ج) در ماتریس ضرایب، ستون اول را با ستون اعداد ثابت دستگاه تعویض می‌کنیم و آن را $+$ می‌نامیم.

د) در ماتریس ضرایب، ستون دوم را با ستون اعداد ثابت دستگاه تعویض می‌کنیم و آن را $+$ می‌نامیم.

ه) در ماتریس ضرایب، ستون سوم را با ستون اعداد ثابت دستگاه تعویض می‌کنیم و آن را $+$ می‌نامیم.

و) در ماتریس ضرایب، ستون چهارم را با ستون اعداد ثابت دستگاه تعویض می‌کنیم و آن را $+$ می‌نامیم.

ز) دترمینان $+_1 + _2 + _3 + _4$ را محاسبه می‌نماییم.

$$x_i = \frac{+_i}{+} , \quad i = 1, 2, \dots, n$$

ح) با استفاده از فرمول

جواب‌های دستگاه به دست می‌آید.

مثال ۴۲ – دستگاه معادلات خطی زیر را حل کنید.

$$\cdot 2x_1 + x_2 - 5x_3 + x_4 = 8$$

$$x_1 - 3x_2 - 6x_4 = 9$$

$$\cdot 2x_2 - x_3 + 2x_4 = -5$$

$$\cdot x_1 + 4x_2 - 7x_3 + 6x_4 = 0$$

دترمینان ماتریس ضرایب دستگاه برابر است با :

$$= \begin{vmatrix} 2 & 1 & -5 & 1 \\ 1 & -3 & 0 & -6 \\ 0 & 2 & -1 & 2 \\ 1 & 4 & -7 & 6 \end{vmatrix} = 27. \circ$$

حال، بقیه دترمینان‌ها را محاسبه می‌کنیم

$$+_1 = \begin{vmatrix} 8 & 1 & -5 & 1 \\ 9 & -3 & 0 & -6 \\ -5 & 2 & -1 & 2 \\ 0 & 4 & -7 & 6 \end{vmatrix} = 81$$

$$+_2 = \begin{vmatrix} 2 & 8 & -5 & 1 \\ 1 & 9 & 0 & -6 \\ 0 & -5 & -1 & 2 \\ 1 & 0 & -7 & 6 \end{vmatrix} = -108$$

$$+_3 = \begin{vmatrix} 2 & 1 & 8 & 1 \\ 1 & -3 & 9 & -6 \\ 0 & 2 & -5 & 2 \\ 1 & 4 & 0 & 6 \end{vmatrix} = -27$$

$$+_{\text{۴}} = \begin{vmatrix} ۲ & ۱ & -۵ & ۸ \\ ۱ & -۳ & ۰ & ۹ \\ ۰ & ۲ & -۱ & -۵ \\ ۱ & ۴ & -۷ & ۰ \end{vmatrix} = ۲۷$$

در نتیجه

$$x_1 = \frac{+_{\text{۱}}}{+} = \frac{۸۱}{۲۷} = ۳$$

$$x_2 = \frac{+_{\text{۲}}}{+} = \frac{-۱ \circ ۸}{۲۷} = -۴$$

$$x_3 = \frac{+_{\text{۳}}}{+} = \frac{-۲۷}{۲۷} = -۱$$

$$x_4 = \frac{+_{\text{۴}}}{+} = \frac{۲۷}{۲۷} = ۱$$

حال امتحان می‌کنیم

$$\cdot ۲(۳) + (-۴) - ۵(-۱) + ۱ = ۸ . \quad ۶ - ۴ + ۵ + ۱ = ۸ . \quad ۸ = ۸$$

$$\cdot ۳ - ۳(-۴) - ۶(۱) = ۹ . \quad ۳ + ۱۲ - ۶ = ۹ . \quad ۹ = ۹$$

$$\cdot ۲(-۴) - (-۱) + ۲(۱) = -۵ - . \quad ۸ + ۱ + ۲ = -۵ . \quad -۵ = -۵$$

$$\cdot ۳ + ۴(-۴) - ۷(-۱) + ۶(۱) = ۰ . \quad ۳ - ۱۶ + ۷ + ۶ = ۰ . \quad ۰ = ۰$$

تمرین‌های فصل هفتم

۱- ماتریس‌های زیر را دو به دو با هم جمع کنید.

$$\begin{matrix} ۲ & \overset{\#}{\circ} & ۱ & \overset{\#}{\circ} \\ ۱ & \overset{\%}{\circ} + & ۴ & \overset{\%}{\circ} - \end{matrix}$$

$$\begin{matrix} ۳ & ۵ & ۱\# & ۱ & ۲ & ۳\# \\ ۲ & ۲ & \overset{\%}{\circ} + & \overset{\circ}{\circ} & ۱ & \overset{\circ}{\%} \\ ۱ & ۲ & ۱\% & ۲ & ۲ & ۱\% \end{matrix}$$

$$\begin{matrix} a & b & c\# & ۱ & \overset{\#}{\circ} & ۱\# \\ d & e & f\% + & ۲ & ۲ & \overset{\%}{\circ} - \end{matrix}$$

$$\begin{matrix} 1 & 3\# & -1 & -3\# \\ \cdot 2 & \cdot \% & \cdot -2 & \cdot \% \\ \cdot 1 & 1\% & !-1 & 1\% \end{matrix}$$

۲- ماتریس‌های زیر را در هم ضرب نمایید:

$$\begin{matrix} 1 & -1 & 1\# & 1 & 2\# \\ \cdot 2 & \cdot \% & 1\% & -1 & 1\% \\ \cdot 3 & -1 & 2\% & 1 & 3\% \end{matrix}$$

$$\begin{matrix} 1 & -1 & 1\# & 1 & -1 & 1\# \\ \cdot 2 & \cdot \% & 1\% & \cdot 1 & -1\% & 1\% \\ \cdot 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1\% \end{matrix}$$

$$\begin{matrix} 2 & 3\# & 1 & 0\# \\ \cdot 1 & 4\% & 0 & 1\% \end{matrix}$$

$$\begin{matrix} a & b\# \\ \cdot c & d\% \\ \cdot e & f\% \end{matrix} \begin{matrix} 1 & 0\# \\ \cdot 0 & 1\% \\ \cdot 1 & 0\% \end{matrix}$$

$$\begin{matrix} 1 & 2 & 0\# & 0 & 0\# \\ \cdot 1 & 1 & 0\% & 0 & 0\% \\ \cdot -1 & 4 & 0\% & 1 & 0\% \end{matrix}$$

۳- دترمینان هریک از ماتریس‌های زیر را به دست آورید.

$$\begin{matrix} 2 & 1\# \\ \cdot 0 & 2\% \end{matrix}$$

$$\begin{matrix} 1 & 2 & 3\# \\ \cdot 0 & 1 & 1\% \\ \cdot 2 & 1 & 2\% \end{matrix}$$

$$\begin{matrix} \cdot & \cdot & 4\# \\ \cdot -2 & 3 & 4\% \\ \cdot 5 & 6 & 1\% \end{matrix}$$

$$\begin{matrix} -1 & 2 & 0 & 0 & \# \\ 0 & -1 & 2 & 1 & \% \\ 0 & 0 & -1 & 2 & \% \\ 1 & 0 & 0 & -3 & \% \end{matrix}$$

$$\begin{matrix} 1 & 0 & 2\# \\ 1 & 1 & 7\% \\ 0 & -3 & 4\% \end{matrix}$$

$$\begin{matrix} 1 & 1 & 0 & \# \\ 0 & 1 & -2\% \\ 2 & 7 & 4\% \end{matrix}$$

$$\begin{matrix} 2 & 3 & -1\# \\ 4 & 0 & 5\% \\ -1 & 2 & 1\% \end{matrix}$$

$$\begin{matrix} 4 & 0 & 5\# \\ 2 & 3 & -1\% \\ -1 & 2 & 1\% \end{matrix}$$

$$\begin{matrix} 1 & 2 & 3\# \\ 1 & 2 & 3\% \\ -1 & 4 & 0\% \end{matrix}$$

$$\begin{matrix} 0 & 0 & 0\# \\ a & b & c\% \\ d & e & f\% \end{matrix}$$

۴- معکوس ماتریس‌های زیر را در صورت وجود، پیدا کنید.

$$A = \begin{matrix} 1 & 2 & 4\# \\ 0 & 1 & 6\% \\ 1 & 3 & 2\% \end{matrix}$$

$$B = \begin{pmatrix} 2 & 4 \\ 15 & 3 \end{pmatrix}$$

$$C = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 11 & 0 \end{pmatrix}$$

$$D = \begin{pmatrix} 8 & 3 & 5 \\ 4 & 11 & 7 \\ 13 & 9 & 6 \end{pmatrix}$$

$$E = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 3 \\ 3 & 3 & 1 \\ 12 & 0 & 3 \end{pmatrix}$$

$$F = \begin{pmatrix} 0 & -2 & -1 \\ 1 & -3 & 4 \\ -1 & -1 & -1 \end{pmatrix}$$

$$G = \begin{pmatrix} 2 & -3 \\ 14 & -6 \end{pmatrix}$$

۵- دستگاه‌های زیر را با استفاده از هم‌سازه نسبت به x حل کنید.

$$\begin{array}{ll} . x - y = 0 & . x + y + z = 6 \\ . y - z = 0 & . x + y - z = 0 \\ . z - x = 0 & . 2x + 3y + z = 11 \\ \\ . x + y + z = 3 & . 3x + 3y + z = 2 \\ . x - z = -1 & . x - y + 2z = 6 \\ . 2x + 2y = 2 & . 2x + y - z = -1 \\ \\ . x + y + 2z = 45 & . x + y + 2z = 25 \\ . 2x - y + z = 15 & . 2x + y - z = 9 \\ . x + y - z = 0 & . -x + y = 1 \end{array}$$

$$\begin{array}{l} \begin{array}{ll} 2x + y + z = 4 & x + y - z = 1 \\ . y - z = -1 & . 3x - z = 2 \end{array} \\ . x + y - z = -\frac{1}{2} \quad . 4x - y = 5 \end{array}$$

۶- در ماتریس A ، مقدار x را طوری تعیین کنید که دترمینان A برابر ۱۵ باشد.

$$A = \begin{array}{cccc} -1 & 2 & 3 & \# \\ \cdot & & & \% \\ \cdot x & 1 & x - 2 \% & \% \\ \cdot & & & \% \\ ; 2 & -1 & 1 & \% \end{array}$$

۷- یک شرکت مقاطعه کاری برای هر ساعت کامیون بدون راننده ۶۰۰۰ تومان، بابت کرایه هر ساعت تراکتور بدون راننده ۲۰۰۰ تومان و برای هر ساعت جهت راننده ۱۰۰۰ تومان پرداخت می نماید. این شرکت از ماتریس A برای انجام کارهای مختلف استفاده می نماید.

$$A = \begin{array}{ccccc} I & II & III & IV & \\ \cdot & 1 & 1 & 1 & 2 \# \\ \cdot & 2 & 0 & 0 & 1 \% \\ ; 3 & 1 & 3 & 4 \% & \% \end{array}$$

الف) اگر ۱۰۰۰، ۲۰۰۰، ۴۰۰۰ = P نشان دهنده ماتریس قیمت باشد، که توسط این شرکت پرداخت می شود، ماتریس PA را محاسبه کنید.
ب) فرض کنید که شرکت برای انجام یک طرح کوچک نیازمند ۲۰ ساعت کار از نوع I، و ۳۰ ساعت کار از نوع II است. اگر S = $\begin{array}{c} 2 \# \\ \% \\ 30 \% \\ \% \\ \% \end{array}$ ماتریس تقاضا باشد AS را محاسبه کنید.

ساعت کار از نوع II است. اگر S = $\begin{array}{c} 2 \# \\ \% \\ 30 \% \\ \% \\ \% \end{array}$ ماتریس تقاضا باشد AS را محاسبه کنید.

ج) PAS را محاسبه نماید.
۸- یک فروشنده ماشین حساب پنج مدل ماشین حساب خود را در سه معازه که در مناطق

مختلف شهر قرار دارند می فروشد. موجودی هر مدل در هر مغازه در ماتریس M خلاصه شده است.
قیمت فروش کلی (W) و جزئی (R) در ماتریس N برای هر مدل نوشته شده است.

$$M = \begin{matrix} & A & B & C & D & E \\ \begin{matrix} 4 & 2 & 3 & 7 & 1 \\ 2 & 3 & 5 & 0 & 6 \\ 10 & 4 & 3 & 4 & 3 \end{matrix} & \begin{matrix} \text{غازه‌ی } 1\% \\ \text{غازه‌ی } 2\% \\ \text{غازه‌ی } 3\% \end{matrix} \end{matrix}$$

$$N = \begin{matrix} & \text{تومان} & \text{تومان} \\ \begin{matrix} W & R \\ 700 & 840 \\ 1400 & 1800 \\ 1800 & 2400 \\ 2700 & 3300 \\ 3500 & 4900 \end{matrix} & \begin{matrix} \#A \\ \%B \\ \%C \\ \%D \\ \%E \end{matrix} \end{matrix}$$

- الف) قیمت جزئی موجودی مغازه‌ی ۲ چه قدر است؟
 ب) قیمت کلی موجودی مغازه‌ی ۳ چه قدر است؟
 ج) ماتریس MN را محاسبه نمایید.
 ۹- یک پیمان کار توافق کرده است که ۴ ویلا، ۳ آپارتمان و ۹ خوابگاه بسازد. این توافق را می‌توان در قالب ماتریس زیر نشان داد.

خوابگاه آپارتمان ویلا

$$Q = \begin{matrix} & 8 & 3 & 9 \\ \begin{matrix} 100 & 40 & 60 \\ 30 & 80 & 50 \\ 50 & 20 & 70 \\ 30 & 40 & 20 \end{matrix} & \begin{matrix} \#W \\ \%A \\ \%B \\ \%C \end{matrix} \end{matrix}$$

مقادیر ریالی مصالح معدنی در ساخت ساختمان‌ها و دستمزد کارگران به شرح ماتریس زیر است :

$$R = \begin{matrix} & \text{اجر} & \text{شیشه} & \text{چوب} & \text{بن} & \text{دستمزد} \\ \begin{matrix} 100 & 40 & 60 \\ 30 & 80 & 50 \\ 50 & 20 & 70 \\ 30 & 40 & 20 \end{matrix} & \begin{matrix} \text{کارگران} \\ \#W \\ \%A \\ \%B \\ \%C \end{matrix} \end{matrix}$$

مطلوب است : محاسبه‌ی $R \times Q$ ، که بیانگر میزان مصالح و کارگر لازم برای ساخت هر ساختمان است.

۱۰- امید و خواهش مریم هر کدام به دو فروشگاه متفاوت می‌روند. امید ۴ کیلو شکر به ازای هر کیلو ۶۰۰ تومان، ۲ کیلو گوشت که هر کیلوی آن ۴۰۰ تومان و ۳ بسته نان که هر بسته‌ی آن ۱۲۰ تومان است می‌خرد. مریم نیز ۲ کیلوگرم شکر به ازای هر کیلو ۷۵ تومان، ۱ کیلو گوشت که هر کیلوی آن ۳۵۰ تومان و ۴ بسته نان که هر بسته‌ی آن ۱۰۰ تومان است می‌خرد.

مطلوب است :

۱- جمع کل پولی که امید و مریم هر کدام با بت خریدهایشان پرداخت کرده‌اند.

۲- مشخص کنید که اگر امید از فروشگاهی که مریم خرید کرده بود، خرید می‌کرد چه قدر پول باید می‌پرداخت؟

۳- اگر مریم از فروشگاهی که امید از آن خریداری کرده بود، خرید می‌کرد، چه قدر پول باید می‌پرداخت؟

۱۱- فرض کنید شرکتی ۳ نوع شکلات (کاکائویی، قهوه‌ای و شیری) تولید می‌کند و قصد دارد از هر شکلات به تعداد زیر در ماه فروردین در ۲ مدرسه‌ی دخترانه و پسرانه بفروشد :

شکلات شیری شکلات قهوه‌ای شکلات کاکائویی

$$T = \begin{matrix} 120 & 70 & 105\# \\ 65 & 100 & 145\% \end{matrix}$$

اگر اطلاعات مربوط به فروش واقعی شکلات‌های این شرکت به صورت ماتریس زیر باشد، اختلاف بین فروش پیش‌بینی شده و فروش واقعی این شرکت در هریک از این مدارس چه قدر است؟

شکلات شیری شکلات قهوه‌ای شکلات کاکائویی

$$J = \begin{matrix} 120 & 50 & 100\# \\ 80 & 75 & 150\% \end{matrix}$$

۱۲- سارا و زهرا و نیما به یک مغازه میوه فروشی رفته‌اند. سارا ۱۲ عدد پرتقال، ۵ عدد انار، ۲ عدد سیب، ۶ عدد موز و ۳ عدد لیموترش خرید. زهرا ۲۰ عدد پرتقال، ۳ عدد انار، ۱۰ عدد سیب و ۴ عدد موز خرید و نیما هم ۱۰ عدد پرتقال، ۱۰ عدد انار، ۱۲ عدد موز خرید. اگر قیمت هر عدد پرتقال ۳۰ تومان، انار ۲۰ تومان، سیب ۵ تومان، موز ۱۰ تومان و لیموترش ۱۰ تومان باشد. مطلوب است :

الف) مقدار میوه‌های خریداری شده توسط هر یک از این ۳ نفر را در یک ماتریس افقی نشان دهید.

- ب) قیمت خرید هر نوع میوه توسط این ۳ نفر را در یک ماتریس ستونی نشان دهید.
- ج) از طریق ضرب ماتریس‌ها، صورت حساب هر کدام از این ۳ نفر را تهیه کنید.
- د) با استفاده از جمع ماتریس‌ها مشخص کنید از هر نوع میوه، کلاً چند عدد خریداری شده است؟
- ه) با استفاده از ضرب ماتریس‌ها، حساب کنید برای خرید هر نوع میوه جمعباً چند تومان پرداخت شده است؟

جدول ۱— ارزش نهایی سالواره یک ریالی که در پایان هر سال دریافت یا پرداخت می‌شود

<i>n</i>	۱.۰%	۴.۰%	۱.۵%	۵.۰%	۵.۵%	۶.۰%	۷.۰%
۱	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000
۲	2.010000	2.010000	2.015000	2.050000	2.055000	2.060000	2.070000
۳	3.045235	3.121600	3.137025	3.152500	3.168025	3.183600	3.214900
۴	4.090903	4.246164	4.278191	4.310125	4.342266	4.374616	4.434943
۵	5.152267	5.416324	5.470710	5.525631	5.581091	5.645093	5.750739
۶	6.229551	6.612975	6.741892	6.820193	6.980151	6.975319	7.153291
۷	7.302894	7.898934	8.019152	8.142008	8.26894	8.393838	8.654021
۸	8.382839	9.214226	9.380014	9.534910	9.72173	9.897468	10.259883
۹	9.55932	10.582795	10.802114	11.026584	11.256260	11.493316	11.927989
10	10.702272	12.006107	12.286209	12.527899	12.875354	13.192795	13.816348
11	11.863262	13.486331	13.841179	14.206782	14.583498	14.921643	15.783594
12	13.041211	15.075807	15.484052	15.917127	16.385591	16.819241	17.888451
13	14.236930	16.626879	17.139913	17.712983	18.286748	18.882138	20.106413
14	15.450392	18.391911	18.932109	19.599630	20.292572	21.015066	22.550201
15	16.682139	20.023568	20.751051	21.575861	22.40860	23.229270	25.128022
16	17.932370	21.824531	22.719337	23.657492	24.641140	25.622528	27.858053
17	19.201355	23.975152	24.741707	25.640266	26.69640	28.212880	30.840217
18	20.189376	25.615413	26.855031	28.132385	29.191205	30.405653	33.468401
19	21.296716	27.671229	29.063562	30.530404	32.102671	33.759944	37.378965
20	23.123667	29.778079	31.371123	33.065954	34.663118	36.765541	40.495492
21	24.470522	31.869202	32.783437	35.719252	37.786626	39.492277	44.865177
22	25.817581	34.247970	36.303328	38.505213	40.844310	43.492299	49.002739
23	27.225144	36.617289	38.937030	41.430475	44.121147	46.495826	53.436111
24	28.633521	39.082604	41.689196	44.501960	47.537998	50.815527	58.176671
25	30.063024	41.645908	44.565210	47.727099	51.132588	54.864512	63.249038
26	31.513369	44.311715	47.520645	51.113451	54.963683	59.156383	68.676170
27	32.986678	47.064214	50.711324	54.669226	58.986910	63.715766	71.493823
28	34.481479	49.967583	53.993333	58.402583	63.231540	68.528112	80.697694
29	35.998571	52.966286	57.423031	62.323712	67.711154	73.639298	82.346529
30	37.538681	56.084938	61.010707	66.438848	72.435478	79.058186	94.460786
<i>n</i>	8.0%	9.0%	10.0%	12.0%	14.0%	16.0%	18.0%
۱	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000
۲	2.080000	2.090000	2.100000	2.120000	2.140000	2.160000	2.180000
۳	3.246409	3.278100	3.310000	3.374400	3.439600	3.505000	3.572400
۴	4.506112	4.573129	4.610000	4.779328	4.921144	5.066498	5.215332
۵	5.866601	5.991711	6.105100	6.352847	6.610104	6.867135	7.134210
۶	7.335929	7.522335	7.715610	8.115189	8.535519	8.977477	9.441968
۷	8.922303	9.200135	9.487171	10.089012	10.791491	11.413673	12.141522
۸	10.636626	11.026474	11.435886	12.299693	13.227260	14.240093	15.326996
۹	12.487558	13.021006	13.597917	14.775656	16.083247	17.518508	19.085855
۱0	14.495562	15.192930	15.937425	17.548735	19.372795	21.321469	23.521309
۱1	16.645487	17.561029	18.531167	20.654883	23.044518	25.732204	28.755144
۱2	18.977126	20.140720	21.384284	24.131333	27.270749	30.850169	34.934070
۱3	21.495297	22.955385	24.522712	28.029109	32.066654	36.766196	42.218663
۱4	24.214420	26.191959	27.974983	32.392602	37.581065	43.671987	50.818022
۱5	37.152111	39.360416	41.772482	47.297115	53.812114	51.659505	60.965264
۱6	30.324283	33.003499	35.449730	42.752280	50.980352	60.925026	72.934914
۱7	33.750226	36.973705	40.547470	48.883674	59.112601	71.673030	82.066036
۱8	37.450241	41.301338	45.590173	55.249715	63.391066	81.140715	103.741283
۱9	41.446263	46.018458	51.159040	63.439683	78.969235	98.601230	123.413534
۲0	45.761964	51.160120	57.274999	72.052442	91.021928	115.374747	146.627670
۲1	50.422421	56.761530	61.002199	81.698736	104.768418	134.840606	174.021005
۲2	55.456755	62.873336	71.402749	92.502384	120.435946	157.414987	206.344785
۲3	60.893296	69.531939	79.543024	104.602894	120.297025	163.601385	244.486847
۲4	66.264759	76.789813	88.197327	118.155241	158.658620	213.977607	299.444479
۲5	73.105940	84.700896	98.347059	133.333670	181.670627	244.214024	342.603486
۲6	79.954415	93.323977	109.161765	150.333931	208.332743	290.085267	415.272113
۲7	87.350768	102.723135	121.099492	169.374007	238.390127	337.502390	479.221093
۲8	95.338830	113.948217	134.20936	190.698987	272.889233	392.502773	566.480890
۲9	103.965936	124.135356	148.630930	211.582754	312.391725	456.303716	669.437450
۳0	113.282311	136.307539	164.491023	241.332684	356.786847	530.311731	790.9179

جدول ۲ - ارزش فعلی سالواره یک ریالی که در پایان هر سال دریافت یا پرداخت می شود

ن	۱.۵%	۴.۰%	۴.۵%	۵.۰%	۵.۵%	۶.۰%	۷.۰%
۱	0.985222	0.961598	0.936939	0.912381	0.897867	0.883396	0.874579
۲	1.955893	1.896045	1.822669	1.759419	1.816320	1.833393	1.808014
۳	2.912260	2.775091	2.748964	2.723248	2.697933	2.673012	2.621316
۴	3.854388	3.679895	3.587526	3.545951	3.505150	3.465106	3.387211
۵	4.782615	4.51822	4.389477	4.204477	4.270284	4.212364	4.000197
۶	5.697187	5.242137	5.152872	5.025692	4.995530	4.917334	4.766540
۷	6.598211	6.002055	5.892741	5.780423	5.682967	5.582381	5.392889
۸	7.485925	6.732745	6.565356	6.462113	6.345166	6.219791	5.971299
۹	8.360517	7.415322	7.268799	7.107822	6.952195	6.802692	6.515232
۱۰	9.222185	8.110836	7.912718	7.721735	7.537626	7.360387	7.023582
۱۱	10.071118	8.766477	8.528917	8.306414	8.102536	7.886875	7.408624
۱۲	10.947505	9.385174	9.118581	8.862522	8.616518	8.343344	7.942696
۱۳	11.731502	9.985618	9.682852	9.265873	9.117079	8.852683	8.357651
۱۴	12.443382	10.563123	10.222825	9.898041	9.589648	9.214984	8.745408
۱۵	13.343233	11.118567	10.739546	10.379658	10.037581	9.712139	9.10791
۱۶	14.131264	11.652296	11.234015	10.837770	10.462162	10.105895	9.416159
۱۷	14.907649	12.165669	11.707191	11.274266	10.864609	10.477260	9.707223
۱۸	15.672561	12.659297	12.159992	11.689587	11.260714	10.827603	10.159087
۱۹	16.442108	13.13849	12.593294	12.085321	11.602651	11.158116	10.335595
۲۰	17.168639	13.600326	13.000436	12.462210	11.950382	11.469921	10.594014
۲۱	17.900137	14.029160	13.394724	12.821713	12.475213	11.764077	10.835527
۲۲	18.620824	14.451115	13.781425	13.160043	12.583170	12.041782	11.061240
۲۳	19.330861	14.856812	14.147775	13.488574	12.879042	12.300379	11.272127
۲۴	20.030405	15.246963	14.495478	13.798632	13.151699	12.350358	11.469334
۲۵	20.779611	15.622080	14.828209	14.089345	13.471933	12.783356	11.653581
۲۶	21.396612	15.982769	15.146611	14.375185	13.662495	13.003166	11.825779
۲۷	22.067617	16.329586	15.451503	14.643034	13.898160	13.210534	11.486709
۲۸	22.726717	16.663063	15.747874	14.899127	13.121122	13.463614	12.177111
۲۹	23.374026	16.983715	16.021899	15.141074	14.133101	13.590721	12.277674
۳۰	24.015838	17.292053	16.288889	15.372451	14.333745	13.764831	12.109011
۳۱	8.0%	9.0%	10.0%	12.0%	14.0%	16.0%	18.0%
۱	0.925926	0.917431	0.909091	0.892857	0.887193	0.882069	0.8747458
۲	1.783265	1.759111	1.735537	1.690051	1.646661	1.605232	1.565642
۳	2.577097	2.531295	2.486852	2.409431	2.327632	2.249890	2.174273
۴	3.342127	3.297920	3.169865	3.037319	2.913712	2.798161	2.690052
۵	3.992710	3.889651	3.791077	3.604776	3.430361	3.244294	3.127171
۶	4.622880	4.185919	4.555261	4.111407	3.858668	3.684736	3.497603
۷	5.206370	5.032953	4.868419	4.563757	4.288305	4.058565	3.811528
۸	5.793539	5.513419	5.334926	4.967648	4.638661	4.313591	4.077566
۹	6.246888	5.995247	5.759074	5.328250	4.943727	4.606544	4.303012
۱۰	6.710081	6.417658	6.144562	5.650223	5.219116	4.833227	4.494086
۱۱	7.133964	6.865191	6.495061	5.937699	5.542753	5.028614	4.656905
۱۲	7.536078	7.160725	6.813692	6.194474	5.569029	5.197107	4.793025
۱۳	7.903776	7.496904	7.102056	6.473948	5.842362	5.312331	4.909513
۱۴	8.244237	7.786150	7.366687	6.625168	6.002022	5.467529	5.008062
۱۵	8.589479	8.066688	7.610680	6.810964	6.142108	5.575156	5.194578
۱۶	8.851369	8.312558	7.833709	6.473986	6.265060	5.668492	5.162354
۱۷	9.121638	8.543631	8.021553	7.139630	6.372859	5.748704	5.222304
۱۸	9.371987	8.793662	8.201412	7.248570	6.36120	5.817818	5.273164
۱۹	9.603599	8.950115	8.361920	7.365777	6.530369	5.877455	5.316241
۲۰	9.818147	9.128546	8.513964	7.464444	6.621134	5.928841	5.352746
۲۱	10.016803	9.292244	8.648694	7.562003	6.686952	5.973139	5.393683
۲۲	10.200744	9.442425	8.771549	7.644646	6.712934	6.011236	5.409901
۲۳	10.371059	9.589207	8.883218	7.718131	6.792056	6.044347	5.432120
۲۴	10.528738	9.706612	8.984744	7.784316	6.835137	6.072627	5.450949
۲۵	10.624776	9.822580	9.07040	7.813139	6.872927	6.097092	5.469006
۲۶	10.800978	9.928972	9.160845	7.895660	6.986077	6.118483	5.480129
۲۷	10.933165	10.026580	9.237223	7.942554	6.935155	6.136364	5.491880
۲۸	11.051078	10.116128	9.306567	7.984123	6.960662	6.152038	5.501601
۲۹	11.158406	10.198283	9.364606	8.021806	6.983037	6.165550	5.509831
۳۰	11.257783	10.273654	9.426914	8.056184	7.023661	6.177198	5.516806

جدول ۳—ارزش فعلی اقساط مساوی یک ریالی را نشان می‌دهد که در ابتدای هر

سال دریافت یا پرداخت می‌شود

n	1.5%	4.0%	4.5%	5.0%	5.5%	6.0%	7.0%
1	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000
2	1.985222	1.916158	1.956958	1.952394	1.947867	1.943396	1.934579
3	2.955983	2.889453	2.872668	2.859410	2.846520	2.833393	2.808018
4	3.912200	3.775091	3.745964	3.723248	3.699933	3.673912	3.621316
5	4.854385	4.629895	4.587526	4.545453	4.505150	4.465106	4.397211
6	5.782845	5.451822	5.389977	5.329477	5.270294	5.212364	5.100197
7	6.697187	6.242137	6.157872	6.075692	5.995530	5.917324	5.764540
8	7.598214	7.002059	6.842701	6.756373	6.682867	6.581181	6.359289
9	8.485495	7.232745	7.595899	7.463213	7.345466	7.209794	6.971299
10	9.360517	8.435332	8.268790	8.107692	7.952195	7.801692	7.515212
11	10.222185	9.110896	8.912718	8.721735	8.537626	8.360087	8.023582
12	11.071118	9.760477	9.528917	9.306314	9.092536	8.886825	8.498674
13	11.907505	10.385073	10.111858	9.863252	9.618518	9.393844	8.942686
14	12.731532	10.985648	10.642852	10.303573	10.117079	9.852683	9.357651
15	13.513382	11.560123	11.222825	10.898641	10.599648	10.294984	9.745468
16	14.343233	12.118087	11.739546	11.279658	11.037581	10.712249	10.107914
17	15.151264	12.652296	12.231015	11.837770	11.462162	11.105895	10.116639
18	15.907649	13.165669	12.707191	12.274166	11.894669	11.477260	10.570322
19	16.672561	13.659297	13.159992	12.689587	12.246074	11.827003	11.059087
20	17.426168	14.139393	13.591294	13.085321	12.607651	12.158116	11.335595
21	18.168639	14.591026	14.007936	13.462210	12.950392	12.469021	11.591814
22	18.900137	15.029160	14.404754	13.823153	13.275244	12.763077	11.835827
23	19.620874	15.451115	14.784125	14.164004	13.681170	13.041982	12.061240
24	20.350861	15.850842	15.147771	14.488574	13.852504	13.303379	12.252187
25	21.030405	16.246963	15.495478	14.798442	14.151699	13.551958	12.469534
26	21.719611	16.622080	15.828209	15.063945	14.412933	13.783356	12.653583
27	22.398632	16.982769	16.116611	15.375185	14.662395	14.003166	12.825779
28	23.067617	17.329586	16.451203	15.842034	14.986100	14.210534	12.986709
29	23.726717	17.663063	16.742874	15.898127	15.121422	14.406164	13.137111
30	24.376076	17.983715	17.021589	16.141074	15.331301	14.590221	13.277874
n	8.0%	9.0%	10.0%	12.0%	14.0%	16.0%	18.0%
1	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000
2	1.925926	1.917431	1.909091	1.892857	1.872193	1.862069	1.847438
3	2.783265	2.759111	2.735537	2.690051	2.649661	2.605232	2.565642
4	3.577097	3.531295	3.486852	3.401831	3.321632	3.245890	3.174277
5	4.312127	4.239720	4.169868	4.057349	3.913712	3.798181	3.690063
6	4.992710	4.889651	4.790787	4.604776	4.130801	1.271294	4.127171
7	5.622880	5.489519	5.355261	5.111497	4.838668	4.584736	4.497603
8	6.206370	6.022653	5.868419	5.563575	5.288305	5.028565	4.811520
9	6.746639	6.534819	6.334926	5.967440	5.658864	5.343591	5.077586
10	7.246888	6.995247	6.759024	6.328250	5.916372	5.606544	5.303022
11	7.717081	7.417608	7.111587	6.650223	6.216146	5.803227	5.494086
12	8.133964	7.905191	7.495061	6.937699	6.452233	6.029644	5.656005
13	8.536078	8.160725	7.813692	7.194374	6.660292	6.197107	5.793225
14	8.903776	8.486904	8.103356	7.427538	6.832362	6.312334	5.904513
15	9.241237	8.786150	8.361682	7.628168	7.001272	6.467529	6.008162
16	9.559479	9.060688	8.606080	7.810964	7.142168	6.575456	6.091529
17	9.851369	9.312558	8.823210	7.973956	7.265060	6.663197	6.162354
18	10.121638	9.543631	9.021553	8.119630	7.372659	6.748204	6.222434
19	10.371887	9.755825	9.201412	8.219670	7.367420	6.817848	6.273104
20	10.603599	9.950115	9.364920	8.367717	7.550369	6.877453	6.316241
21	10.818147	10.128546	9.512564	8.394414	7.622131	6.926841	6.352746
22	11.016903	10.292244	9.648693	8.562003	7.669557	6.973139	6.381683
23	11.200744	10.442425	9.771340	8.611646	7.742944	7.011326	6.109901
24	11.371059	10.580207	9.880218	8.718444	7.792056	7.044247	6.432120
25	11.528758	10.706612	9.984744	8.764316	7.835137	7.072632	6.450949
26	11.674776	10.822560	10.072040	8.843159	7.872927	7.097092	6.466906
27	11.806978	10.928972	10.160945	8.895500	7.906077	7.118187	6.488129
28	11.935165	11.026580	10.237220	8.912551	7.935155	7.136364	6.491889
29	12.051028	11.116128	10.306502	8.961123	7.960662	7.152038	6.510161
30	12.158406	11.198263	10.364600	9.021806	7.983037	7.165580	6.509831

فهرست منابع و مأخذ

- اصغریپور، محمدجواد، برنامه‌ریزی خطی، دانشگاه الزهرا، ۱۳۶۳
- پترویچ دوموریاد، الکساندر، در قلمرو ریاضیات، پرویز شهریاری (مترجم) امیرکبیر، ۱۳۴۸
- تقوی، مهدی، مقدمه‌ای بر تجزیه و تحلیل اقتصاد میکرو، مؤسسه‌ی عالی علوم سیاسی و امور خارجی، ۱۳۵۴
- جلیلی، میرزا، فرشید مین باشیان، ریاضیات جدید، شرکت چاپ و نشر ایران، ۱۳۶۷
- داش نارونی، غلامرضا، میرزا جلیلی، ریاضیات جدید، شرکت چاپ و نشر ایران، ۱۳۷۲
- رودلف مک‌شین، آن کاتلر، روش سریع تراختنبرگ در حساب، محمد باقری، (مترجم) دانشمند، ۱۳۷۱
- قربانی، ابوالقاسم، جبر، چاپخانه‌ی آرین، ۱۳۶۶
- صاحب، غلامحسین، سوری مقدماتی اعداد، سروش، ۱۳۵۸
- مولوی، رضا، نظریه و مسائل ماتریس‌ها، انتشارات میلاد، تهران، ۱۳۷۴
- ویر، اجین، تحلیل‌های ریاضی و کاربرد آن در اقتصاد و بازرگانی، حسین علی‌پور کاظمی، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ۱۳۶۷
- حافظی نسب، مصطفی، ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت، نشر آروین، ۱۳۷۷
- جوادی، حسین، مصطفی، حافظی نسب، ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت، انتشارات اندرز، ۱۳۷۵

Gosling, "maths for Business and Finance", 1995, Pascal Press

