

فصل پنجم

توزيع صفت متغیر کیفی

هدفهای رفتاری: در پایان این فصل، فرآگیر باید بتواند:

- ۱- جامعه را بر حسب صفات کیفی گروه بندی کند.
- ۲- مشخصه های مرکزی را برای صفات کیفی محاسبه نماید.
- ۳- مشخصه های پراکندگی را برای صفات کیفی محاسبه نماید.
- ۴- جامعه را با استفاده از مشخصه های پراکندگی باهم مقایسه کند و همگنی آنها را بیان نماید.
- ۵- جامعه را از نظر دو صفت متغیر کیفی که هر یک می توانند حالات مختلفی را اختیار کنند، گروه بندی نماید.
- ۶- جدول توزیع فراوانی های نسبی را بر حسب حالات دو صفت کیفی، تشکیل دهد.

توزيع صفت کیفی

همان طور که قبلاً در طبقه بندی صفت های متغیر گفته شد، صفت متغیر کیفی، صفتی است که آن را برای اعضای جامعه با عدد یا کمیت توان بیان نمود. برای بیان توزیع صفت کیفی فقط می توان حالت های آن را از هم متمایز ساخته، تعداد اعضای هر یک از حالتها را با فراوانی های (مطلق یا نسبی) بیان نمود که جدول توزیع فراوانی آن به صورت زیر نشان داده می شود:

جدول ۱

X	حالات صفت	A _۱	A _۲	A _۳	...	A _s	-
F _i	فراوانی	F _۱	F _۲	F _۳	...	F _s	= N

A_۱، A_۲، ...، A_s حالت های صفت کیفی برای اعضای جامعه می باشد. مثلاً اگر بخواهیم

طبقه‌بندی کارکنان یک مؤسسه را بر حسب مشاغل بیان کنیم، توزیع فراوانی‌های کارکنان بر حسب صفت شغل به صورت جدول زیر بیان می‌شود :

جدول ۲

X مشاغل	مستخدم	نگهبان	ابنادر	راننده	کارمند	مدیر عامل ...
F _i فراوانی	۳	۱	۲	۳	۶	... ۱ = N

و یا اگر بخواهیم طبقه‌بندی بیماران یک بیمارستان را بر حسب نوع بیماری نشان دهیم، از جدول توزیع فراوانی بیماران بر حسب نوع بیماری (X) استفاده می‌کنیم :

جدول ۳

X نوع بیماری	بیماران عفونی	بیماران قلبی	بیماران عصبی	بیماران گوارشی	...	-
F _i فراوانی	۱۰	۱۵	۶	۱۲	...	= N

بر طبق معمول در مطالعه صفت کیفی، آن حالت از صفت متغیر کیفی که مورد نظر می‌باشد از سایر حالتهای صفت کیفی مجزا کرده، به صورت توزیع دو حالتی بیان می‌کنند. در این صورت، توزیع صفت کیفی را با دو حالت متضاد می‌نمایند حالت موردنظر را با A و بقیه حالتها را با \bar{A} نشان داده، توزیع فراوانیها را برای صفت دو حالت متضاد به صورت زیر بیان می‌کنند :

جدول ۴

X	\bar{A}	A	-
F _i	$F_{\bar{A}}$	F_A	= N

یا به صورت توزیع فراوانی‌های نسبی :

جدول ۵

X	\bar{A}	A	-
f _i	$f_{\bar{A}}$	f_A	= 1

مثال ۱: در مجموعه ۴۰ سند صادره در یک واحد حسابداری، برای تعیین کیفیت اسناد صادره، اسناد تحت بازرگانی قرار گرفته‌اند و معلوم شده است که ۲۹ فقره از آنها «بدون نقص» (حالت \bar{A}) و بقیه «نقص دار» (حالت A) بوده‌اند. بنابراین مجموعه اسناد را می‌توان بر حسب نقص دار و

بدون نقص به دو گروه تقسیم کرد که نتیجه آن در جدول ۶ بیان شده است :

جدول ۶

حالات صفت	نقص دار		بدون نقص
	\bar{A}	A	-
فراوانی	۲۹	۱۱	= ۴۰

اگر بخواهیم جدول توزیع فراوانیهای نسبی را برای مجموعه اسناد بیان کنیم، کافی است هر یک از فراوانیهای مطلق را به N یعنی 40 تقسیم کنیم، در نتیجه خواهیم داشت :

حالات صفت	\bar{A}	A	-
f_i فراوانی نسبی	$\frac{29}{40}$	$\frac{11}{40}$	= ۱

مثال ۲ : فرض کنیم جامعه مورد مطالعه $N = 200$ واحد محصول تولیدشده در یک مؤسسه تولیدی باشد که واحدهای محصول از سوی کارشناسان، از نظر کیفیت تحت بازررسی قرار گرفته و براساس آن، محصول به چهار طبقه، درجه‌بندی شده است :

پس از شمارش واحدهای محصول در هر گروه، نتایج گروه‌بندی به صورت جدول ۷ درآمده است.

جدول ۷

کیفیت محصول	درجہ ۱	درجہ ۲	درجہ ۳	درجہ ۴	-
فراوانی	۶۰	۸۰	۴۰	۲۰	۲۰۰

اگر فراوانیهای هر گروه را بر حجم جامعه ($N = 200$) تقسیم نماییم، جدول بالا به صورت زیر درمی‌آید (جدول ۸) :

جدول ۸

کیفیت محصول	درجہ ۱	درجہ ۲	درجہ ۳	درجہ ۴	-
فراوانی نسبی	۰ / ۳۰	۰ / ۴۰	۰ / ۲۰	۰ / ۱۰	۱

این دو جدول، توزیع فراوانیهای واحدهای محصول را بر حسب کیفیت بیان می کند.

محاسبه مشخصه های عددی برای صفات کیفی

از آنجا که صفت متغیر، کیفی است و با حالت بیان می شود، نمی توان برای آنها مشخصه های عددی محاسبه نمود. برای این کار لازم است، حالات صفات کیفی را به صورت کمی بیان کرد و با آنها مانند صفات کمی برخورد نمود.

فرض کنیم صفت متغیر کیفی، حالت های A_1, A_2, \dots, A_S را بتواند در جامعه اختیار کند. اگر حالت های مختلف صفت را به دو گروه، حالت موردنظر (A) و حالت غیر موردنظر (\bar{A}) تقسیم بندی کنیم، درنتیجه، توزیع صفت به صورت زیر درخواهد آمد :

$$X \begin{pmatrix} A & \bar{A} \\ F_A & F_{\bar{A}} \end{pmatrix}$$

حال با تبدیل حالت موردنظر (A) به عدد ۱ و حالت غیر موردنظر (\bar{A}) به عدد صفر، توزیع به صورت زیر درخواهد آمد :

$$X \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ F_A & F_{\bar{A}} \end{pmatrix}$$

اینک می توان برای چنین صفتی که به صورت کمی درآمده است، مشخصه مرکزی و مشخصه پراکندگی محاسبه نمود.

میانگین صفت کیفی خواهد شد :

$$\bar{X} = \frac{F_A}{N} = f_A \quad (3)$$

بنابراین، میانگین صفت کیفی، فراوانی نسبی حالت موردنظر خواهد بود.

واریانس صفت کیفی، به صورت زیر به دست می آید :

$$V(X) = f_A \cdot f_{\bar{A}} \quad (4)$$

بنابراین، واریانس صفت کیفی، حاصل ضرب فراوانی نسبی حالت موردنظر و فراوانی نسبی حالت غیر موردنظر خواهد بود.

مثال ۳: فرض کنید در مثال ۲ می خواهیم متوسط محصولات درجه ۱ (A) را محاسبه کنیم.

برای این کار، کافی است محصولات درجه ۱ را، حالت موردنظر (A)، درنظر گرفته و بقیه محصولات را، حالت غیرموردنظر (\bar{A})، درنظر بگیریم.
درنتیجه، توزیع به صورت زیر درمی‌آید :

X	محصولات درجه ۱	سایر محصولات	
۶۰	A	\bar{A}	
	۱	۱۴۰	۲۰۰
	۶۰	۰	

بنابراین، متوسط محصولات درجه ۱، خواهد شد :

$$\bar{X} = \frac{۶۰}{۲۰۰} = ۰/۳۰$$

برای محاسبه واریانس، از فرمول ۴ استفاده می‌کنیم :

$$V(X) = f_A \cdot f_{\bar{A}} \\ = ۰/۳۰ \times ۰/۷ = ۰/۲۱$$

کمترین مقدار واریانس صفت کیفی، صفر و بیشترین مقدار آن $۰/۲۵$ خواهد بود. غالباً برای بی‌بردن به همگنی جامعه‌های با صفات کیفی، از واریانس آنها استفاده می‌شود. اگر مقدار واریانس صفت کیفی، برابر صفر باشد، گویند جامعه از همگنی کامل برخوردار است و اگر مقدار واریانس صفت کیفی $۰/۲۵$ باشد، گویند جامعه از ناهمگنی کامل برخوردار است. بنابراین هرچه مقدار واریانس صفت کیفی به صفر نزدیک‌تر باشد، نشانه همگنی بیشتر در جامعه است و هرچه مقدار واریانس صفت کیفی به $۰/۲۵$ نزدیک‌تر باشد، نشانه ناهمگنی بیشتر در جامعه خواهد بود.
عموماً در مقایسه همگنی جامعه‌ها، با استفاده از واریانس آنها، می‌توان نسبت به همگنی آنها قضاوت نمود.

مثال ۴: دو گروه محصول یکسان را بر حسب مرغوبیت، دسته‌بندی نموده‌ایم و نتایج آن، به صورت زیر به دست آمده است :

I

II

کیفیت محصول	مرغوب \bar{A}	نامرغوب A
فراآنی نسبی	۰ / ۷۵	۰ / ۲۵

کیفیت محصول	مرغوب \bar{A}	نامرغوب A
فراآنی نسبی	۰ / ۸۲	۰ / ۱۸

تعیین کنید، کدام گروه، همگن‌تر است؟

برای پاسخ این سؤال، لازم است واریانس هریک از گروه‌ها را محاسبه کنیم، هر کدام واریانس کمتری نسبت به دیگری داشته باشد، آن گروه محصول همگنی پیشتری دارد.

$$V(X_1) = f_{\bar{A}} \cdot f_A = 0 / 75 \times 0 / 25 = 0 / 1875$$

$$V(X_2) = f_{\bar{A}} \cdot f_A = 0 / 82 \times 0 / 18 = 0 / 1476$$

ملاحظه می‌شود که واریانس گروه دوم کمتر از واریانس گروه اول شده، بنابراین نتیجه می‌گیریم که گروه دوم از نظر کیفیت همگن‌تر است.

گاهی اوقات، توزیع صفت کیفی بر حسب فراوانیهای مطلق داده می‌شود. برای محاسبه واریانس، لازم است، ابتدا، فراوانیهای نسبی را برای حالت‌های صفت محاسبه نموده، سپس با استفاده از فراوانیهای نسبی، واریانس را محاسبه کنیم.

مثال ۵: جمعیت دو روستا بر حسب وضع سواد، به صورت جداول زیر گروه‌بندی شده‌اند:

روستای A				روستای B			
وضع سواد	بسواد	بی‌سواد	جمع	وضع سواد	بسواد	بی‌سواد	جمع
فراآنی	۲۴۹	۵۱	۳۰۰	فراآنی	۳۲۴	۷۶	۴۰۰

کدام‌یک از دو روستای فوق از نظر سواد همگن‌تر هستند؟

برای تعیین چگونگی همگنی دو روستای فوق از نظر وضع سواد، می‌باید واریانس هریک از آنها را محاسبه کرد. واریانس صفت کیفی، فقط با فراوانیهای نسبی می‌تواند محاسبه شود، از این‌رو، ابتدا فراوانیهای نسبی را برای هر دو روستا محاسبه نموده، سپس با استفاده از آنها، واریانس را محاسبه می‌کنیم.

روستای A

	وضع سواد	باسواد	بی سواد	جمع
F_i	۲۴۹	۵۱	۳۰۰	
f_i	۰/۸۳	۰/۱۷	۱	

روستای B

	وضع سواد	باسواد	بی سواد	جمع
F_i	۳۲۴	۷۶	۴۰۰	
f_i	۰/۸۱	۰/۱۹	۱	

$$V(X)_A = ۰/۸۳ \times ۰/۱۷ = ۰/۱۴۱۱ \quad V(X)_B = ۰/۸۱ \times ۰/۱۹ = ۰/۱۵۳۹$$

از این رو، می‌توان ادعا نمود که روستای A از نظر وضع سواد، همگن‌تر از روستای B است، چون واریانس کمتری از روستای B دارد.

مطالعه جامعه از نظر دو صفت کیفی A و B

حال، جامعه‌ای را درنظر می‌گیریم که عناصر آن از نظر دو صفت A و B که هر یک با حالات متنضاد مشاهده شده‌اند، مورد مطالعه قرار گرفته‌اند.

در این وضعیت ممکن است یکی از چهار حالت زیر وجود داشته باشد :

- برای عنصر جامعه، هم صفت A و هم صفت B مشاهده شده است. که این حالت ترکیبی را، برای عنصر مشاهده شده با علامت AB نشان می‌دهیم.

- برای عنصر جامعه، صفت A مشاهده نشده ولی صفت B مشاهده شده است. این حالت ترکیبی را با نماد $\bar{A}B$ نشان می‌دهیم.

- برای عنصر جامعه صفت A مشاهده شده ولی صفت B مشاهده نشده است. این حالت ترکیبی را با نماد $A\bar{B}$ نشان می‌دهیم.

- برای عنصر جامعه، صفت A و صفت B مشاهده نشده است، که این حالت ترکیبی را با نماد $\bar{A}\bar{B}$ نشان می‌دهیم.

گروه‌بندی را که نسبت به دو صفت باهم انجام می‌گیرد، «گروه‌بندی مرتبه دوم» خواهیم نامید. گروه‌بندی جامعه بر حسب یک صفت متغیر را «گروه‌بندی مرتبه اول» می‌نامند. حال اگر تعداد عناصر (فراوانیهای) چهار گروه نامبرده را با F_{AB} ، $F_{\bar{A}\bar{B}}$ و $F_{A\bar{B}}$ نشان دهیم، نتیجه این گروه‌بندی را می‌توان به صورت جدول چهارخانه‌ای زیر بیان کرد :

جدول ۹

$B \backslash A$	B	\bar{B}	جمع
A	F_{AB}	$F_{A\bar{B}}$	F_A
\bar{A}	$F_{\bar{A}B}$	$F_{\bar{A}\bar{B}}$	$F_{\bar{A}}$
	F_B	$F_{\bar{B}}$	N

تمامی فراوانیها را در جدول ۹ بر حجم جامعه (N) تقسیم کرده، جدول چهارخانه‌ای مشابه را با فراوانیهای نسبی به دست می‌آوریم (جدول ۱۰) :

جدول ۱۰

$B \backslash A$	B	\bar{B}	جمع
A	f_{AB}	$f_{A\bar{B}}$	f_A
\bar{A}	$f_{\bar{A}B}$	$f_{\bar{A}\bar{B}}$	$f_{\bar{A}}$
	f_B	$f_{\bar{B}}$	۱

مثال ۶: فرض کنیم جامعه مورد مطالعه، ۱۰۰ کارگر یک مؤسسه تولیدی است که از نظر داشتن سواد (صفت A) و داشتن بچه (صفت B) مورد مشاهده قرار گرفته‌اند. پس از تعیین داشتن سواد و داشتن بچه برای هر کارگر، نتایج مشاهدات به ۴ گروه طبقه‌بندی گردید:

AB	با سواد و با بچه	گروه اول
$A\bar{B}$	با سواد و بدون بچه	گروه دوم
$\bar{A}B$	بی سواد و با بچه	گروه سوم
$\bar{A}\bar{B}$	بی سواد و بدون بچه	گروه چهارم

نتایج مشاهدات به صورت جدول چهارخانه‌ای زیر بیان می‌شود (جدول ۱۱) :

جدول ۱۱

	بچه‌دار B	بدون بچه \bar{B}	جمع
بساد A	۳۵	۲۵	۶۰
بی‌ساد \bar{A}	۳۰	۱۰	۴۰
جمع	۶۵	۳۵	۱۰۰

جدول بالا، توزیع فراوانیهای کارگران را بر حسب دو صفت A و B بیان می‌کند. اگر فراوانیهای مطلق هر گروه را بر حجم جامعه ($N=100$) تقسیم نماییم، جدول توزیع فراوانیهای نسبی کارگران بر حسب دو صفت A و B به دست می‌آید که تشکیل آن را به عنوان تمرین، به دانش آموزان واگذار می‌کنیم.

به همین شیوه که با دو صفت با حالات متضاد، گروه‌بندی مرتبه دوم انجام می‌گرفت، می‌توان گروه‌بندیهای مراتب بالاتر را نیز بر حسب ۳ و بیش از ۳ صفت تشکیل داد.
در حالت دو صفت A و B که هریک از آنها با بیش از دو حالت (A_1, A_2, \dots, A_s) در برای صفت A و (B_1, B_2, \dots, B_t) برای صفت B مشاهده می‌شوند، در ترتیج گروه‌بندی مرتبه اول، S گروه برای صفت A و t گروه برای صفت B ، تشکیل خواهد شد. نتایج این گروه‌بندیها با جدول دو بعدی (یا دو طرفه)، که هریک از بُدها را یکی از صفت‌های متغیر کیفی، تشکیل می‌دهند، بیان خواهد شد (جدول ۱۲) :

جدول ۱۲

$A \backslash B$	B_1	B_2	B_3	...	B_t	جمع
A_1	F_{11}	F_{12}	F_{13}	...	F_{1t}	F_{A_1}
A_2	F_{21}	F_{22}	F_{23}	...	F_{2t}	F_{A_2}
\vdots	\vdots	\vdots	\vdots		\vdots	\vdots
A_S	F_{S1}	F_{S2}	F_{S3}	...	F_{St}	F_{AS}
جمع	F_{B_1}	F_{B_2}	F_{B_3}	...	F_{Bt}	N

این جدول، صورت تعمیم یافته جدول چهارخانه‌ای ۹ می‌باشد و نام «جدول توافق» به خود گرفته است.

مثال ۷: جامعهٔ مورد مطالعه کارگران یک مؤسسهٔ تولیدی با حجم $N = 50$ هستند که بر حسب درجهٔ مهارت (A) و میزان تحصیلات (B) مورد مشاهده قرار می‌گیرند.

درجهٔ مهارت (A) می‌تواند به ۴ حالت:

A_۱ – کارگر ساده

A_۲ – کارگر نیمه‌ماهر

A_۳ – کارگر ماهر

A_۴ – استادکار

و میزان تحصیلات می‌تواند به ۴ حالت:

B_۱ – بی‌سواد

B_۲ – تحصیلات ابتدایی

B_۳ – تحصیلات متوسطه

B_۴ – تحصیلات دیپلم

درنظر گرفته شود. عناصر جامعه (کارگران) بر حسب دو صفت متغیر A و B مورد مشاهده قرار گرفته‌اند و نتایج به صورت جدول زیر طبق حالتهای فوق گروه‌بندی گردیده است:

جدول ۱۳

A \ B	بی‌سواد	ابتدایی	متوسطه	دیپلم	جمع
کارگر ساده	۶	۵	۱	۰	۱۲
کارگر نیمه‌ماهر	۳	۵	۳	۱	۱۲
کارگر ماهر	۲	۴	۷	۳	۱۶
استادکار	۰	۲	۵	۳	۱۰
جمع	۱۱	۱۶	۱۶	۷	۵۰

جدول بالا، توزیع فراوانیهای کارگران مؤسسهٔ مذکور را بر حسب دو صفت A و B نشان می‌دهد که جدول توافق دو صفت متغیر A و B می‌باشد.

بیان هندسی صفات کیفی

برای نمایش هندسی یا نمودار آماری صفات کیفی، از نمودار دایره‌ای یا قطاعی استفاده می‌شود.
– نمودار دایره‌ای یا قطاعی، شکل دیگری از نمودارهای آماری است که برای نمایش سهم هریک از حالت‌های صفت کیفی در جامعه، به کار می‌رود.

برای رسم نمودار دایره‌ای، یک دایره با شعاع دلخواه درنظر گرفته، فراوانی یا درصد فراوانی هریک از حالات صفت را برحسب درجه، مطابق فرمول زیر محاسبه می‌کنیم و آن را به صورت کمانی از دایره، رسم می‌نماییم :

$$\frac{F_i \times 360}{N}$$

مثال ۸: نمودار دایره‌ای را برای هزینه خانوارها که از هزینه‌های مختلف مانند : هزینه خوراک، هزینه پوشак، هزینه مسکن، هزینه بهداشت و درمان، هزینه آموزش و هزینه‌های متفرقه، تشکیل شده است و ارقام آن در جدول زیر داده شده، رسم می‌کنیم : (ارقام هزینه، متوسط هزینه‌های خانوارهای یک منطقه می‌باشند).

هزینه‌های متفرقه	هزینه آموزش	هزینه بهداشت و درمان	هزینه مسکن	هزینه پوشاك	هزینه خوراک	هزینه‌های خانوار
مبلغ برحسب هزار تومان	۲۸	۱۰	۳۰	۵	۷	۲۰

ابندا، هزینه‌ها را برحسب درجه، محاسبه می‌کنیم. در اینجا $N = 100$ می‌باشد.

$$\frac{28 \times 360}{100} = 100.8^\circ$$

$$\frac{10 \times 360}{100} = 36^\circ$$


$$\frac{30 \times 360}{100} = 108^\circ$$

$$\frac{5 \times 360}{100} = 18^\circ$$

$$\frac{7 \times 360}{100} = 25.2^\circ$$


$$\frac{20 \times 360}{100} = 72^\circ$$

باید توجه نمود که جمع درجه‌ها بایستی 360° باشد.



شکل ۱—نمودار دایره‌ای هزینه خانوارها

مناسب است، بخش‌های دایره را با رنگ‌های مختلف و یا با هاشورهای متفاوت از هم تفکیک کرد. از نمودار دایره‌ای برای مقایسه ساختار دو جامعه (یا بیشتر) نیز استفاده می‌شود. به عنوان مثال، ترکیب خدمه دو بیمارستان را به منظور مقایسه، به صورت نمودار قطاعی می‌آوریم (شکل ۲-۵) :



از نمودار قطاعی برای بیان هندسی صفات متغیر کمی نیز استفاده می‌شود. همین طور می‌توان از نمودارهای دیگری مانند نمودار ستونی برای بیان هندسی صفت متغیر کمی نیز استفاده نمود.

سؤالها و تمرینها



- ۱- نتایج مشاهدات روی صفات کیفی، چگونه بیان می‌شود؟
- ۲- برای گروه بندی نتایج مشاهدات صفات کیفی، چگونه عمل می‌کنند؟
- ۳- اگر صفت کیفی در جامعه، حالتهای مختلفی را اختیار کند، جدول توزیع صفت متغیر، به چه صورت بیان می‌شود؟
- ۴- برای تبدیل صفات کیفی به صفات کمی، از چه شیوه‌ای استفاده می‌شود؟
- ۵- مشخص کننده‌های عددی صفت کیفی، چگونه محاسبه می‌شوند؟
- ۶- میانگین صفت کیفی برابر با چه مقداری است؟
- ۷- واریانس صفت کیفی از چه رابطه‌ای محاسبه می‌شود؟
- ۸- کمترین مقدار واریانس صفت کیفی، چیست؟
- ۹- بیشترین مقدار واریانس صفت کیفی، چیست؟
- ۱۰- همگنی کامل، چه زمانی روی می‌دهد؟
- ۱۱- ناهمگنی کامل، چه زمانی روی می‌دهد؟
- ۱۲- برای مقایسه جامعه‌ها از نظر صفات کیفی، از چه مفهومی استفاده می‌کنند؟
- ۱۳- توزیع گروه خونی جمعیّت دو منطقه، به صورت زیر به دست آمده است :

منطقه I

منطقه II

گروه خونی	A	B	AB	O
فراروانی نسبی	۰/۲۰	۰/۱۵	۰/۲۵	۰/۴۰

گروه خونی	A	B	AB	O
فراروانی نسبی	۰/۱۸	۰/۲۲	۰/۳۰	۰/۳۰

- کدامیک از دو منطقه مذکور، از نظر گروه خونی O، همگن‌ترند؟
- ۱۴- اگر دو صفت کیفی با حالات متضاد، در یک جامعه برای عناصر آن مشاهده شده باشد، نتایج آن مشاهدات، چگونه بیان می‌شود؟
 - ۱۵- این گروه‌بندی را چه می‌نامند؟
 - ۱۶- جدول چهارخانه‌ای برای چه منظوری تشکیل می‌شود؟
 - ۱۷- اگر دو صفت کیفی A و B، که هریک از آنها برای عناصر جامعه با بیش از دو حالت مشاهده شوند، نتیجه چنین مشاهداتی، چگونه گروه‌بندی می‌گردد؟

۱۸- در یک استان، ۴ نوع نوشابه تولید می‌شود، که با علامتهای A_1 ، A_2 ، A_3 و A_4 مشخص شده‌اند. از ۴ دانش‌آموز پسر و ۴ دانش‌آموز دختر نظرخواهی شد که چه نوع نوشابه‌ای را می‌پسندند، نتایج به قرار زیر به دست آمده است :

پسران	دختران
$A_1 = 12$	$A_1 = 10$
$A_2 = 10$	$A_2 = 14$
$A_3 = 15$	$A_3 = 8$
$A_4 = 3$	$A_4 = 8$

نتایج را در یک جدول دو بُعدی، گروه‌بندی نموده، جدول فراوانیهای نسبی را تشکیل دهید.

۱۹- درصد انواع محصولات کشاورزی تولید شده در یک استان به قرار زیر است :

حبوبات ذرت جو گندم نوع محصول

۱۶ ۱۷ ۲۲ ۴۵ درصد

برای بیان ترکیب محصول تولید شده در این استان، نمودار قطاعی رسم کنید.

۲۰- درصد وامهای پرداختی بانک A در سالهای ۱۳۷۳ و ۱۳۷۵ به صورت زیر بوده است

(ارقام ساختگی است) :

نوع وام	سال ۱۳۷۳	سال ۱۳۷۵
ساختمان	۳۱	۲۴
صنعت	۳۰	۲۸
کشاورزی	۲۰	۲۸
خدمات	۱۹	۲۰

برای مقایسه وامهای پرداختی در سالهای ۱۳۷۳ و ۱۳۷۵ نمودار دایره‌ای رسم کنید.