

فصل دوم

Gossypium spp. پنبه.



هدف‌های رفتاری: انتظار می‌رود در پایان این فصل فراگیران بتوانند :

- ۱- تاریخچه و منشأ پیدایش پنbe را در دو سطر توضیح دهند ؛
- ۲- اهمیت اقتصادی، ارزش غذایی و موارد استفاده‌ی پنbe را نام ببرند ؛
- ۳- خصوصیات گیاه‌شناختی پنbe را توضیح دهند ؛
- ۴- شرایط مناسب رشد و نمو آن را توضیح دهند ؛
- ۵- ارقام مختلف پنbe را نام برد، چگونگی آماده نمودن رقم مطلوب را برای کاشت، توضیح و انجام دهند ؛

- ۶- عملیات آماده‌سازی پنbe را توضیح و انجام دهند ؛
- ۷- هریک از عملیات کاشت، داشت و برداشت را توضیح و انجام دهند ؛
- ۸- موقعیت این محصول را از نظر سطح زیرکاشت و عملکرد بیان کنند .

تاریخچه و مبدأ

پنbe یکی از گیاهان لیفی^۱ و در عین حال از گیاهان روغنی مهم جهان است. سابقه‌ی کاشت پنbe به بیش از ۵۰۰۰ سال قبل از میلاد می‌رسد. در مطالعات باستان‌شناسی در قسمتی از پاکستان، پارچه‌های پنbe‌ای کشف شده که مربوط به ۳۰۰۰ سال قبل از میلاد است. طرافت این پارچه‌ها حکایت از مهارت بافندگان آن دارد.

سابقه‌ی تاریخچه‌ی کاشت پنbe در ایران، هرچند دقیقاً مشخص نیست ولیکن از شواهد برمی‌آید که از زمان‌های بسیار دور معمول بوده است. مثلاً لباس سربازان دوران هخامنشی از پنbe بوده است. در کتب تاریخی، اشاره به سابقه‌ی کاشت پنbe در اطراف ساوه و شوشتر در زمان‌های بسیار دور شده است.

در مورد جایگاه اویلیه‌ی پنbe اختلاف نظر وجود دارد. عده‌ای آن را گیاه افریقای استوایی و عده‌ای دیگر منشأ آن را هندوچین و به طور کلی آسیا می‌دانند. در یک تقسیم‌بندی کلی، پنbe‌های دیلوئید ($2n=26$) را به پنbe‌های دنیای قدیم (آسیا و افریقا) و پنbe‌های تراپلوبیت ($2n=52$) را به پنbe‌های دنیای جدید یا آمریکایی دسته‌بندی می‌نمایند.

۱- گیاهان لیفی به گیاهانی گفته می‌شود که از آن‌ها الیاف، برای بافندگی و صنایع نساجی حاصل می‌شود.

اهمیت پنبه

پنبه یکی از گیاهان فوق العاده ارزشمند در صنایع نساجی و روغن کشی می‌باشد. اهمیت اقتصادی پنبه تا جایی است که آن را طلای سفید نام نهاده‌اند و از نظر تعداد فرآورده‌های مستقیم و غیرمستقیمی که دارد، آن را به نفت خام شبیه نموده‌اند.

با وجود این که بشر توانسته است الیاف مصنوعی متعدد با خواص مختلف بسازد، هنوز هیچ الیاف مصنوعی‌ای توانسته است با خصوصیات ویژه و منحصربه‌فرد الیاف پنبه، که از تارهای چسبیده به دانه‌ی آن حاصل می‌شود، رقابت نماید. ویژگی‌هایی چون، استحکام، رنگ‌پذیری، ثبات شیمیایی و اندازه، لطافت و نرمی و عایقی پنبه از تمام الیاف‌های مصنوعی برتر می‌باشد. الیاف پنبه، ماده‌ی خام بسیاری از صنایعی چون قالب‌افی، پتو و گلیم بافی، نخ قرقره و پارچه بافی و ده‌ها فرآورده‌ی عمدتی دیگر می‌باشد.

روغن حاصل از پنبه یک ماده‌ی غذایی با ارزش است و تولید جهانی و تجارت آن از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

کنجاله‌ی پنبه دانه در تأمین خوراک دام و کرك‌های ریز چسبیده به دانه‌ی (لینتر) آن برای ساخت لباس‌های ضدآب و ضدآتش، کاربرد فوق العاده مهمی دارد. سال‌ها، درآمد حاصل از پنبه در کشورمان بعد از نفت در مقام دوم قرار داشت.

بحث کنید

کاربردهای دیگر پنبه کدام است؟

جدول ۴-۳ مقدار و ترکیبات عمدتی حاصل از یک تن پنبه‌دانه را نشان می‌دهد.

جدول ۴-۳ مواد حاصل از یک تن پنبه‌دانه

ردیف	فرآورده	مقدار (کیلوگرم)	مورد مصرف
۱	روغن خوراکی	۱۴۰-۱۷۰	خوراک انسان
۲	کنجاله	۴۰۰-۵۰۰	تغذیه‌ی دام
۳	پوست دانه	۲۳۰-۳۰۰	تغذیه‌ی دام
۴	لینتر	۶۰-۹۵	صرف صنعتی
۵	روغن صابون	۲۲-۳۰	صنعتی و بهداشتی
۶	مواد خارجی و رطوبت	۶۵-۸۰	-


خصوصیات گیاه‌شناختی پنبه

پنبه گیاهی است دائمی و بعضاً یکساله. (اغلب ارقام زراعی آن – که امروزه کشت می‌شوند – دائمی هستند. هر چند به علت این که در شرایط غیر از منشأ خود قرار گرفته‌اند یا این که در طول دوره‌ی رشد خود با سرما مواجه می‌شوند، یکساله می‌گردند). پنبه که از تیره‌ی پنیرکیان^۱ و از جنس گوسسیپیوم^۲ است، دارای گونه‌های متعددی از دنیای قدیم و جدید است که از نظر تعداد کروموزوم، خصوصیات ظاهری (به خصوص شکل و اندازه‌ی برگ‌ها)، شکل غوزه و چگونگی بازشدن آن‌ها، طول الیاف و نسبت الیاف به دانه، با هم اختلاف دارند.

به طور کلی پنبه دارای ریشه‌ی راست و عمیق می‌باشد که عمق نفوذ آن بر حسب بافت و رطوبت خاک، از ۱-۴ متر متغیر است.

ساقه‌ی پنبه راست و برافراشته، به ارتفاع ۱۸۰-۳۰ سانتی‌متر است و لیکن در ارقام زراعی معمولاً کمتر از ۱۲۰ سانتی‌متر با انشعابات متعدد است.

برگ‌های آن پنجه‌ای، با ۳-۷ بريده‌گی است که به صورت متناوب روی ساقه‌ی اصلی و شاخه‌ها قرار می‌گيرند. در زاویه‌ی برگ‌ها جوانه‌ی رویشی قرار گرفته است. جوانه‌ی رویشی با رشد خود شاخه‌های فرعی را ایجاد می‌کند که طول آن‌ها از پایین به بالا کمتر شده و روی این شاخه و نیز ساقه اصلی، ساقه‌های نازک و کوچک گل دهنده به وجود می‌آید. گل‌آذین پنبه‌ی منفرد، گل‌ها با ۳ عدد کاسبرگ فرعی، ۵ عدد کاسبرگ، ۵ عدد گلبرگ (معمولًاً سفید رنگ)، پرچم‌ها متعدد و در میله ۹-۹ تخمک می‌باشد. میوه‌ی پنبه کپسول است که اصطلاحاً به آن غوزه (قوزه) می‌گویند. اسم جنس پنبه نیز از همین کلمه‌ی غوزه گرفته شده است. دانه‌های پنبه، یا پنبه‌دانه، که به تعداد ۹-۴۵ عدد، در درون میوه قرار گرفته‌اند، تخم مرغی هستند، روی پنبه‌دانه دونوع کرک دیده می‌شود. کرک‌های بلند و سفید رنگ که همان الیاف پنبه می‌باشد و کرک‌های کوچک و نسبتاً ضخیم که به آن‌ها لینتر می‌گویند. پوست پنبه‌دانه ضخیم است و لذا در شرایط مناسب قوه‌ی نامیه‌ی آن تا بیش از ۷ سال حفظ می‌شود. ۱۳-۲۰ درصد پنبه‌دانه را روغن تشکیل می‌دهد.



شكل ۴-۳- خصوصیات گیاه‌شناسی پنبه

فعالیت

انواع پنبه‌هایی را که در منطقه‌ی شما کاشته می‌شود جمع‌آوری کرده پس از آماده‌سازی علمی در کلکسیون گیاهان زراعی نگهداری و مطالعه کنید.

در سطح خارجی اندام‌های پنbe، به خصوص شاخ و برگ آن غدّه‌های قهوه‌ای رنگی به نام گلاند^۱ دیده می‌شود. مواد تشكیل دهنده‌ی این غدّه، که گوسیپول^۲ می‌باشد، برای انسان و حیوانات غیرخشوار-کننده و نیز پرندگان، سمی و خطرناک است. پنbe‌هایی هم هستند که چنین غدّه‌هایی را ندارند، که به آن‌ها پنbe‌های بدون گوسیپول یا گلاندلس^۳ می‌گویند.

عوامل مؤثر در رشد و نمو پنbe

برای کاشت پنbe، به یک فصل رشد^۴ ۲۰°—۱۸° روزه بدون یخبندان نیاز است. معمولاً در مناطق گرم — که فصل رشد طولانی دارند — محصول پنbe از کمیت و کیفیت مناسب و ارزش تجاری بالایی برخوردار است. پنbe در دنیا تقریباً بین مدار ۴۲ درجه‌ی شمالی تا ۴۰ درجه‌ی جنوبی کشت می‌شود. با ایجاد ارقام جدید، مناطق کاشت پنbe توسعه پیدا کرده است. عوامل زیر در رشد و نمو پنbe مؤثر می‌باشند:

دما: در زمان کاشت و تولید جوانه و رشد اولیه‌ی پنbe، دما نباید از ۱۳ تا ۱۵ درجه‌ی سانتیگراد کم‌تر باشد. زیرا باعث پوسیدگی بذر، تأخیر در سبز شدن و به تعویق افتادن رشد گیاهان جوان می‌گردد و شرایط را برای آلودگی گیاهان جوان به بیماری‌ها، فراهم می‌سازد. دمای بهینه^۵ برای رشد و نمو پنbe ۲۶—۲۱ درجه‌ی سانتیگراد گزارش شده است. پنbe در اوایل دوره‌ی زایشی به دماهای کم‌تر از درجات بهینه بسیار حساس است. در طول دوره‌ی گل‌دهی و تشكیل میوه، دماهای بین ۳۲—۲۶ درجه‌ی سانتیگراد مناسب بوده ولی دمای بالاتر از ۳۵ درجه‌ی سانتیگراد نامناسب می‌باشد.

نور: برای این‌که رشد و نمو پنbe رضایت‌بخش باشد و ریزش غنچه و غوزه‌ها به حداقل برسد، شدت نور در طول فصل رشد باید زیاد باشد. ثابت شده است که در هوای ابری، که شدت نور کم است، از میزان تشكیل غوزه‌ها کاسته می‌شود. با آن‌که گونه‌های وحشی و ارقام اولیه پنbe روز کوتاه بودند،

۱—Glands

۲—Gossypol

۳—Glandless

۴—Optimum

اما ارقام زراعی امروزی، عموماً نسبت به طول روز حساس نیستند.

تحقیق کنید

آمار سطح زیرکاشت پنبه در کشور را از منابع جدید و معتبر که هنرآموز شما تعیین می‌کند، جمع‌آوری کرده و به صورت نمودار ستونی نشان دهید. در مورد وضعیت نمودار بحث کنید.

رطوبت: در مناطقی که میزان بارندگی سالیانه حدود ۵۰۰ میلی‌متر و توزیع بارندگی در طول فصل رشد مناسب باشد، زراعت پنبه بدون آبیاری میسر است. با وجود این دراغلب نقاط ایران جز در برخی مناطق شمالی کشور، زراعت پنبه با آبیاری همراه است. پایین‌بودن رطوبت نسبی در مرحله‌ی بازشدن غوزه‌ها، یک صفت مطلوب است.

خاک: پنبه سازگاری زیادی به انواع خاک‌ها دارد. ولی با خاک‌های کم عمق و غیرقابل نفوذ سازگاری نیست. پنبه به pH خاک چندان حساس نیست و در خاک‌هایی که دارای pH ۸-۵ و یا بالاتر هستند، می‌تواند رشد کند. مناسب‌ترین خاک‌ها، خاک‌های لیمونی شنی و لیمونی رُسی با نفوذپذیری طبیعی و EC=۶ می‌باشد. این گیاه پس از استقرار تا EC=۱۰ را تحمل کرده و در برخی ارقام بیشتر از این هم گزارش شده است.

تحقیق کنید

علل توسعه یا محدودشدن کاشت پنبه در منطقه‌ی شما چیست؟

تناوب زراعی در پنبه

پنبه هر چند به کاشت پست سر هم در کوتاه‌مدت خیلی حساس نیست و می‌توان ۲-۳ سال در یک قطعه زمین اقدام به کاشت آن نمود ولیکن رعایت تناوب باعث افزایش عملکرد و کنترل عوامل زیان‌آور پنبه می‌گردد. در تناوب کشت، پنبه بعد از گیاهان علوفه‌ای یا آیش یا حبوبات قرار می‌گیرد. از آنجایی که پنبه زمین را خیلی فقیر نمی‌کند می‌توان پس از آن محصولات مختلفی، از

جمله غلات را کشت نمود.

مثال‌هایی از تناوب پنبه عبارتند از :

شبدر، پنبه، حبوبات، گندم

آیش، پنبه، گندم، ذرت

برنج، برنج، پنبه، آیش

گندم، کودسبز، پنبه، برنج

گندم، سویا، پنبه، برنج

تحقیق کنید

در منطقه‌ی شما جایگاه پنبه در تناوب یا چرخه‌ی زراعی چگونه است؟ محسن و معایب انواع مختلف را بحث کنید. بهترین‌ها را مشخص کنید.

ارقام مختلف پنبه

ارقام زراعی پنبه در اغلب نقاط جهان – به غیر از مناطق محدودی از آسیا و افریقا – از گونه‌های دنیای جدید می‌باشند. ارقام این گونه، نسبت به گونه‌های دنیای قدیم دارای عملکرد زیادتر و الیاف طویل‌تر می‌باشند ضمن آن‌که غوزه‌های آن‌ها کاملاً باز شده و برداشت و شن آسان است و از آن‌ها به چند نمونه که در ایران کشت می‌شود، اشاره می‌گردد :

۱- رقم ساحل: این رقم پرمحصول، دارای الیاف محکم، بلند و مرغوب است. اندازه‌ی غوزه‌ها بزرگ است و به همین علت عمل برداشت آن به سهولت انجام می‌شود. تولید متوسط و ش این رقم $\frac{2}{3}$ تا ۳ تن در هکتار بوده، برای مناطقی چون گرگان، گندم، مازندران و کردکوی بسیار مناسب است. با کارهای اصلاحی که روی این رقم در سال‌های اخیر انجام شده است، عملکرد آن را به 425° کیلوگرم و ش (در شرایط آزمایش) با کیل $\frac{3}{40}$ درصد رسانده است ضمن آن‌که این رقم به بیماری پژمردگی ورتیسیلومی^۱ مقاوم است.

۱- *Verticillium dahliae*

تحقیق کنید

ارقامی که در منطقه‌ی شما کاشته می‌شود، کدام‌اند؟ آن‌ها را از نظر خصوصیات گیاه‌ساختی، زراعی و سطح زیر کاشت (عملکرد) مقایسه کنید.

۲—رقم ورامین: این رقم به علت زودرس بودن و نیز برخورداری از کیفیت و کیفیت نسبتاً مطلوب، سال‌ها رقم غالب کشور بوده و تا 7° درصد سطح زیر کاشت به این رقم اختصاص داشت اما به علت حساس‌شدن به بیماری پژمردگی، امروز محدود به مغان، ورامین، اصفهان، خراسان، استان مرکزی و کرمان شده است، با ارتفاع حدود 116° سانتی‌متر، عملکرد تا 365° کیلوگرم وش در هکتار با کیل $39/6$ درصد.

۳—رقم دلتا پاین ۱۶: برای کاشت در استان خوزستان و جیرفت مناسب است. مقاومت مطلوب در مقابل باد، گرما و خشکی از ویژگی‌های این رقم است. متوسط عملکرد آن 312° کیلوگرم وش با کیل 36 درصد می‌باشد.

۴—رقم اولتان (oultan): رقمی زودرس با فرم بوته بسته (ساخه‌های جانبی کوتاه) و کشیده (متوسط ارتفاع 124° سانتی‌متر) است، لذا برای مناطقی با بارندگی و سرمای زودرس پاییزه و نیز برای برداشت مکانیزه مناسب است.

این رقم که برای مغان و مناطق مشابه به عنوان جایگزین رقم ورامین در دهه‌ی 6° معرفی شده است با عملکرد متوسط 310° کیلوگرم وش با کیل $4/40$ هنوز هم رقم مطلوبی محسوب می‌شود.

۵—رقم پاک: نداشتن لکه یا غده‌های (گلاند) و به تبع آن سم گوسيپول و قابلیت مصرف پنبه‌دانه‌ی آن‌ها در تعذیب طیور و هم‌چنین در صنایع غذایی از مهم‌ترین ویژگی‌های این رقم که در دهه‌ی هفتاد معرفی شده است، می‌باشد رقمی است با ارتفاع متوسط (حدود 10° سانتی‌متر)، میانگین عملکرد 366° کیلوگرم در هکتار وش با کیل $38/5$ درصد.

۶—رقم بختگان: رقمی است مقاوم به پژمردگی، فرم بوته باز، غوزه‌های درشت و تخم مرغی‌شکل، با متوسط ارتفاع حدود $10^{\circ}3$ سانتی‌متر، میانگین عملکرد وش 385° کیلوگرم با کیل $4/37$ درصد که در دهه‌ی 7° به عنوان جایگزین رقم هویی کالا برای فارس معرفی شده است.

۷—رقم مهر: رقمی است زودرس، با راندمان مصرف آب نسبتاً بالا که برای مناطق مغان و استان‌های خراسان (شمال شرق کشور) معرفی شده‌اند. این رقم که جدیدترین رقم معرفی شده می‌باشد

ضمن خاصیت برجسته زودرسی، کیفیت الیاف بسیار مطلوب دارد.

عملیات تهیه و آماده‌سازی زمین: برای مهیاکردن زمین کشت پنبه، ابتدا بقایای محصول سال قبل را در اواخر تابستان تا اوایل پاییز پس از افزودن کود دامی با شخم عمیق زیر خاک می‌کنند و زمین را به همین صورت تا اوخر زمستان یا اوایل بهار به حال خود رها می‌سازند. درصورتی که خاک زیرین متراکم باشد، بایستی قبل از شخم از زیرشکن (سوسولز) استفاده کرد و نفوذپذیری خاک را افزایش داد. در اوخر زمستان یا اوایل بهار باید زمین به وسیله‌ی دیسک یا کولتیواتور و یا هرس نرم شده و بعد از تستطیح آماده‌ی کشت گردد.

تهیّه و آماده‌کردن بذر برای کاشت: در هر منطقه با توجه به طول فصل رشد، رطوبت نسبی محیط، زمان شروع بارندگی‌های پاییزه و به خصوص آفات، ارقامی قابل کاشت در آن منطقه می‌باشند. بعد از تعیین ارقام می‌بایست آن‌ها را آماده‌ی کاشت نمود.

فعالیت

حداقل $\frac{1}{2}$ هکتار از زمین را برای کاشت پنبه آماده کنید.

چون دانه‌ی بیش‌تر واریته‌ها پوشیده از کرک‌های ریز یا لینتر^۱ می‌باشد و چنان‌چه با همان وضع کاشته شوند مشکلات زیادی به وجود می‌آید، بدین جهت قبیل از کاشت باید کرک‌های موجود در سطح دانه را از بین بیریم. به این عمل کرک زدایی یا دلینته^۲ کردن گفته می‌شود که دارایی محاسن زیر است:

۱- کرک زدایی، از مسدود شدن سوراخ‌های خروجی بذرکار به هنگام دانه‌کاری، جلوگیری می‌کند؛ بنابراین بذر به صورت یکنواخت کشت می‌شود و نیاز به واکاری هم نخواهد بود.
۲- با عمل کرک زدایی، وزن و حجم بذور کم‌تر شده، نگهداری در انبار و حمل و نقل آن‌ها نیز ساده‌تر می‌گردد.

۳- بذرهای بدون کرک پس از کاشت به سهولت آب و رطوبت اطراف خود را جذب کرده، به سرعت جوانه می‌زنند.

۴- چون وجود کرک‌ها روی پنبه‌دانه، پناهگاه مناسبی برای استقرار آفات و عوامل بیماری‌ها می‌باشد، لذا انجام عمل کرک زدایی به از بین بردن آفات و عوامل بیماری‌زا کمک می‌کند.

روش‌های کرک‌گیری

کرک‌گیری به روش‌های مختلفی انجام می‌شود که به برخی از آن‌ها اشاره می‌شود.

۱- خیساندن بذر: خیساندن، ساده‌ترین روش برای کرک‌گیری است. در این روش دانه‌ها را ۱۲ ساعت قبل از کاشت، داخل بشکه و یا ظرف آب خیس می‌کنند. در این مدت کرک‌ها نرم شده، در اثر مالش دادن با دست جدا می‌شوند. در بعضی از مناطق، هنگام مالش دادن بذر را با خاکستر مخلوط می‌کنند در این روش بذور به مقدار قابل توجهی آب جذب کرده و راحت‌تر جوانه می‌زنند.

۲- استفاده از ماسه: این روشی است از گذشته، که بذرها را با ماسه مخلوط می‌کنند و در دستگاه مخصوص و یا ظرف‌های بزرگ یا گونی ریخته، کاملاً به هم می‌زنند تا در اثر فرسایش، کرک آن‌ها گرفته شود. این روش بسیار قدیمی است. روش مرسوم‌تر مخلوط ماسه بسیار نرم (ماسه‌بادی) به علاوه‌ی خاک رس و خاکستر می‌باشد که مالیدن آن‌ها به بذر، پل ارتباطی پوسته بذر و خاک دانه شده و جذب آب را تسهیل می‌کند.

۳- روش مکانیکی: در این روش از دستگاه‌های مکانیکی مجهز به اره‌های مخصوص کرک‌گیری استفاده می‌شود.

۴- روش حرارتی: در این روش به وسیله‌ی شعله‌افکن‌های مخصوص، کرک‌های موجود در سطح دانه‌ها را می‌سوزانند. البته باید دقت نمود که دانه‌ها، بیش از چند ثانیه در معرض شعله قرار نگیرند.

۵- روش شیمیایی: در این روش، از محلول اسید سولفوریک رقیق استفاده می‌شود. ابتدا دانه‌ها را به مدت ۱۵ دقیقه در داخل محلول اسید سولفوریک رقیق (۸-۱۰ درصد) قرار می‌دهند و به هم می‌زنند. سپس دانه‌را بیرون آورده با آب آهک و بعد با آب معمولی، شست و شو می‌دهند.

با توجه به اینکه بذور گواهی شده، کرک زدایی شده‌اند، اغلب نیازی به این عملیات نمی‌باشد. **ضدغفونی بذر:** ضدغفونی بذر برای جلوگیری از سرایت و گسترش بیماری‌های قارچی لازم است. این عمل باید قبل از کاشت و به وسیله‌ی سمومی که کارشناسان حفظ نباتات توصیه می‌کنند انجام گیرد.

زمان کاشت بذر: زمان کاشت پنبه در هر ناحیه، بستگی به آب و هوای منطقه دارد. به طور کلی پنبه را زمانی می‌کارند که خطر سرمای زمستان و یا اوایل بهار از بین رفته و معدّل دمای روزانه‌ی هوا بین ۱۵-۱۸ درجه‌ی سانتی‌گراد باشد. با فراهم شدن شرایط فوق، باید هرچه زودتر به کشت اقدام

نمود تا زمان رسیدن یا برداشت محصول با سرما یا باران‌های پاییزه رو به رو نشود. زیرا این عوامل سبب کاهش شدید کمیت و کیفیت محصول خواهد شد. کاشت پنبه بر حسب شرایط آب و هوایی و نوع خاک، در مناطق مختلف ایران از اسفند تا تیرماه می‌باشد.

فعالیت

- ۱- مقدار بذر مورد نیاز برای کاشت $\frac{1}{2}$ هکتار را با الگویی که هنرآموز شما توصیه می‌کند، پیدا کنید.
- ۲- چنان‌چه بذور مورد کاشت شما کرک‌زدایی نشده‌اند، به روشی که هنرآموز شما می‌خواهد، آن‌ها را کرک‌زدایی و ضد عفونی نمایید.

روش‌های مختلف کاشت پنبه

کشت پنبه در مناطق مختلف به روش‌های زیر انجام می‌شود :

- ۱- روش درهم: در این روش بذور با دست یا ماشین بذر پاش در سطح زمین آماده شده، پاشیده می‌شود. پس از زیرخاک کردن بذور با شن‌کش یا دیسک، اقدام به ایجاد کرت یا فارو می‌کنند. این روش برای کشت پنبه - همانند اغلب محصولات زراعی - مناسب نیست، زیرا توزیع بذر و عمق کاشت، یکنواخت نمی‌باشد. هم‌چنین میزان مصرف بذر در واحد سطح بالا بوده و عملیات داشت به سختی انجام می‌گیرد.
- ۲- روش کپه‌ای: در این روش، پس از آن که زمین آماده شد جوی پسته‌هایی به وسیله‌ی نهرکن و یا بیل ایجاد می‌کنند. سپس بذور را بر حسب شرایط خاک و عرف محل روی پسته‌ها و یا دو طرف آن در بالای خط داغ آب می‌کارند. عرض جوی‌ها بین 80° تا 100° سانتی‌متر و ارتفاع پسته‌ها در ابتدا 25° و پس از چند مرتبه خاک‌دهی به آن‌ها 30° تا 50° سانتی‌متر می‌باشد. فاصله‌ی بوته‌ها بر روی پسته نیز، بین 20° تا 25° سانتی‌متر در نظر گرفته می‌شود. این سیستم کشت برای اراضی با خاک‌های کم عمق و مناطق با دور آبیاری طولانی بسیار مناسب است.

- ۳- روش ردیفی: این روش، که در اغلب شرایط و مناطق بهترین روش کشت پنبه است، بذر را به وسیله‌ی بذرکار می‌کارند که در آن فاصله‌ی خطوط کاشت 80° تا 100° سانتی‌متر و فاصله‌ی

بوته‌ها بر روی خطوط ۱۵ تا ۲۰ سانتی‌متر در نظر گرفته می‌شود.
در این روش می‌توان عملیات کاشت را به خوبی انجام داد (شکل ۳-۵). عمق کاشت در پنبه،
بسته به جنس خاک بین ۳ تا ۵ سانتی‌متر در نظر گرفته می‌شود.



شکل ۳-۵- زراعت پنبه به روش ردیفی

مقدار بذر مورد نیاز پنبه

مقدار بذر مصرفی برای کاشت هر هکتار پنبه بر حسب نوع رقم، شرایط منطقه و روش کاشت متفاوت است. به طور کلی در روش ردیفی حدود ۲۰-۳۰ کیلوگرم و در روش درهم ۶۰-۵۰ کیلوگرم و گاهی تا ۱۰۰ کیلوگرم در هکتار بذر مصرف می‌شود.
مناسب‌ترین تراکم بوته در پنبه حدود ۸۰-۵۰ هزار بوته در هکتار است.

فعالیت

زمین خود را بکارید.

عملیات داشت

۱- آبیاری: فراوانی رطوبت در خاک موجب رشد رویشی و تعویق گل دهی پنbe می شود؛
برعکس، تنش رطوبتی، رشد رویشی را کاهش داده، گل دهی را تحریک می کند.

برای برقراری تعادل بین رشد رویشی و زایشی، آبیاری پنbe را به ترتیب زیر انجام می دهند:

۱- آبیاری بعد از کاشت: چنان‌چه کاشت به صورت خشکه کاری انجام شود، آبیاری آن
بلافاصله بعد از کاشت باید انجام گیرد. اگر به صورت همکاری باشد – که بهتر است این گونه باشد –
این آبیاری قبل از کاشت و به مدت و عمق آبیاری بیشتر صورت می گیرد.

۲- آبیاری از زمان کاشت تا قبل از ظهر گل‌ها: در این دوره از رشد گیاه معمولاً دوبار
آبیاری لازم است. یک بار ۵-۷ روز بعد از آبیاری اول و یک بار حدود ۳-۴ هفته بعد، یعنی پس از
وارد کردن تنش و انجام عملیات خاک دهی پای بوته همراه با کود سرک.

۳- آبیاری دوره‌ی گل دهی و رشد غوزه‌ها: این دوره که طول آن ۴۵ تا ۶۰ روز می باشد،
مهمن ترین و حساس‌ترین زمان نیاز پنbe به آب است و تأمین منظم و کافی آب در این مرحله، باعث
افزایش تعداد گل‌ها می شود. با مشاهده‌ی اولین غوزه‌ی باز شده، آبیاری در این مرحله قطع می شود
تا گل دهی متوقف شود.

۴- مرحله‌ی رسیدن و بازشدن غوزه‌ها: آبیاری در این مرحله، دوره‌ی رسیدن و بازشدن غوزه‌ها
را به تأخیر می اندازد و در مناطق سردسیر، موجب دیررسی می شود. بنابراین آبیاری در این مرحله،
معمولًاً یک بار و آن هم حدود ۲۰ روز بعد از بازشدن اولین غوزه‌ها انجام می گیرد و پس از آن آبیاری
قطع می گردد تا رسیدن غوزه‌ها یکنواخت تر شود. به طور کلی آب مورد نیاز پنbe در طول دوره‌ی
کشت، بسته به شرایط محیطی، خاکی و رقم بین ۶ تا ۱۴ هزار مترمکعب در هکتار است. دوره‌ی
آبیاری برای این گیاه در مناطق مختلف، بسته به دمای هوا و جنس خاک و مراحل مختلف رشد، هر
۷ تا ۱۵ روز یک بار صورت می گیرد.

در ایران پنbe به روش‌های مختلف کرتی، نشتنی و بارانی آبیاری می شود.
در روش بارانی، ارقامی می کارند که در صد یکنواختی رسیدگی بالا بوده و در مرحله بازشدن
غوزه، آبیاری قطع می شود.

۲- سله‌شکنی: پنbe از جمله گیاهان حساس به سله می باشد. در صورت سله بستن زمین،
در صد جوانه‌زنی در کاشت درهم و آبیاری سطحی، فوق العاده کاهش می یابد. لذا لازم است در
روش کرتی با آبیاری به موقع، از سله بستن جلوگیری نمود. در روش ردیفی بایست دقت نمود که آب

روی ردیف‌ها یا پشت‌های را نگیرد. پس از سبز شدن هم معمولاً^۳ ۲ مرتبه سله‌شکنی انجام می‌شود. سله‌شکنی یک عمل ساده یا مجزا نیست بلکه در نوبت اول همراه با حذف علف‌های هرز و مختصری تنک کاری بوده و در نوبت دوم و سوم علاوه بر حذف علف‌های هرز، تنک (در روش دستی)، عملیات خاک‌دهی پای بوته و نیز کودکاری (در روش ماشینی) انجام می‌شود.

۳—واکاری و تنک: در روش کپه‌ای، تنک یک امر الزامی یا ضروری می‌باشد. در روش‌های دیگر نیز گاهی انجام این عملیات ممکن است لازم گردد. فراموش شود که پس از این عملیات که معمولاً^۴ توان صورت می‌گیرد حتماً باید آبیاری انجام شود. چرا؟

۴—کنترل علف‌های هرز: در طول فصل رشد، انواع علف‌های هرز، در مزارع پنبه رشد و نمو می‌کنند که لازم است هرچه زودتر و به خصوص در ابتدای فصل رشد، کنترل گرددن. برای کنترل علف‌های هرز می‌توان از دو روش مکانیکی (با استفاده از وسایل دستی و کولتیواتور) و شیمیایی (به کاربردن علف‌کش‌های مختلف با توصیه نوع و مقدار و زمان مصرف توسط کارشناسان حفظ نباتات) استفاده نمود. از علف‌های هرز مهم مزارع پنبه، می‌توان تاج خروس، تاج‌ریزی، خرفه، گاوپنبه، مرغ، قیاق و ارزن وحشی را نام برد.

۵—کود سرک: دوره رشد و نمو طولانی پنبه، مصرف کود سرک در این گیاه را الزامی می‌کند. معمولاً^۵ کود سرک از ته را حدود ۴۰ روز پس از کاشت یا به‌طور معمول یک هفت‌هه قبل از ظهور اولین غنچه گل به خاک می‌دهند. کودریز مغذی را معمولاً^۶ با ظهور علائم کمبود مصرف می‌کنند. مقدار کود و تشخیص علائم کمبود با کارشناسان خاک‌شناسی است.

۶—سرزنی یا هرس: قطع قسمت فوقانی ساقه‌ی اصلی را به تنها‌یی، یا همراه با قطع سرشاخه‌های فرعی، چند هفته قبل از بازشدن غوزه‌ها سرنزی یا هرس گویند. پنبه طبیعتاً یک گیاه دائمی گرم‌سیری با الگوی رشد نامحدود است. در خاک‌های حاصل‌خیز و با رطوبت زیاد، گیاه رشد رویشی زیادی می‌کند. سرنزی در پنبه از رشد رویشی زیاد آن جلوگیری نموده و ضمن تحریک رشد زایشی و جلوگیری از ریزش غنچه‌ها و غوزه‌ها، بازشدن غوزه‌ها را نیز به جلو می‌اندازد.

۷—آفات و بیماری‌ها: از آفات مهمی که پنبه را مورد حمله قرار می‌دهد، می‌توان کرم خاردار، کرم غوزه آگروتیس، کنه، ترپیس، شته و عسلک پنبه را نام برد. از بیماری‌های این گیاه، بوته میری و مرگ گیاهچه، بیماری ساق سیاه و سفیدک‌ها از اهمیت بیشتری برخوردارند. کنترل آفات و بیماری‌ها از طریق عملیات زراعی، مانند: انتخاب تاریخ کاشت مناسب و از بین بردن بقایای محصول و علف‌های هرز میزان و نیز با روش مبارزه‌ی شیمیایی به وسیله‌ی سموم مناسب، امکان پذیر

می باشد. جهت کاهش خسارات آفات و بیماری ها ضمن رعایت مبانی زیست محیطی با اقدامات به زراعی و تشخیص به موقع و درست عوامل بیماری زا و آفات و اقدامات کنترل و مبارزه با نظر کارشناسان حفظ نباتات ضروری می باشد.

فعالیت

کلیه عملیات داشت را انجام دهید.

عملیات برداشت

برداشت به موقع و صحیح محصول مزارع پنبه، بسیار مهم است. پایین بودن رطوبت نسبی و آفتایی بودن هوا در موقع برداشت پنبه از شرایط مطلوب است. برداشت پنبه بسته به نواحی مختلف و شرایط متفاوت کاشت، به روش های مختلف زیر انجام می شود :


۱—**برداشت با دست:** در برخی کشورهای تولید کننده‌ی پنبه و در اکثر مناطق ایران، برداشت به وسیله‌ی دست انجام می‌گیرد. پس از آن که غوزه‌ها کاملاً باز شدند، وش (مجموع الیاف و دانه) با دست از داخل غوزه بیرون کشیده می‌شود. در این روش برداشت به تدریج و در نوبت‌های متعدد — که هر نوبت را یک چین می‌نامند — انجام می‌شود. در بعضی نواحی کشور که پنبه‌ی بومی کشت می‌شود، چون وش این ارقام در داخل غوزه محکم است غوزه‌ها کاملاً باز نمی‌شوند، لذا زارعین غوزه‌ها را برداشت کرده و به تدریج با بازشدن آن‌ها در محل نگهداری، اقدام به خارج کردن وش می‌نمایند. این ارقام امروزه دیگر کمتر مورد کاشت قرار می‌گیرند. بر عکس ارقامی که غوزه‌ها کاملاً باز می‌شوند و یکنواخت می‌رسند کاشته می‌شوند.

۲—**برداشت با ماشین:** ماشین‌های برداشت پنبه دو نوعند :

الف — **غوزه‌چین:** این دستگاه‌ها دارای یک یا دو ردیف برای برداشت هستند. محصول برداشت شده با این ماشین تمیز و مرغوب نیست، زیرا الیاف به دست آمده، مخلوطی از غوزه‌های رسیده و نارس و مقداری چوب غوزه می‌باشد.

ب — **ماشین برداشت وش:** این ماشین‌ها چون فقط وش را برداشت می‌نمایند، نسبت به نوع

اول برتری داشته، محصول جمع آوری شده، تمیز و مرغوب تر می باشد (شکل ۳-۶). ارقامی برای برداشت مکانیزه مطلوب هستند که شاخه های جانبی آن ها بسیار کوتاه یا فاقد شاخه های جانبی باشند و غوزه های آن ها کاملاً باز و در صد یکنواختی رسیدگی هرچه بیش تر باشد. برگ زدایی در این روش الزامی است.



شکل ۳-۶- ماشین مخصوص برداشت و ش پنبه

زمان برداشت: زمان برداشت پنبه برحسب ارقام و نواحی مختلف، متفاوت می باشد. در کشور ما معمولاً برداشت از اوایل شهریور شروع شده، تا اواسط آذرماه ادامه می یابد. برداشت عموماً بعد از ساعت ۱۰ صبح و در هوای آفتابی - زمانی که روی محصول شبیم یا رطوبتی نباشد - صورت می گیرد.

برگ زدایی: از آنجایی که در روش مکانیزه، تمام محصول به یکباره برداشت می شود، در صد رسیدن یکنواخت محصول عامل بسیار مهمی می باشد. با ریزش برگ ها، عمل رسیدن یکنواخت غوزه، بیش تر و سریع تر می شود، ضمناً وش برداشتی تمیزتر خواهد بود. با پاشیدن موادی مثل علف کش گراماکسون به مقدار ۸-۶ لیتر در هکتار یا کلرات کلسیم به مقدار ۲۰-۲۰ کیلوگرم در هکتار، موقعی که ۵ درصد غوزه ها رسیده باشند، می توان باعث خشکیدگی و ریزش تدریجی برگ ها

از ساقه شد. ریزش برگ‌ها، ۱۵° روز بعد از مصرف این مواد شروع می‌شود. همچنین از ماده‌ای که در تجارت به نام اختصاری DEF شناخته شده است، در همان زمان ۵° درصد رسیدگی غوزه، می‌توان به مقدار ۳/۱ لیتر در هکتار استفاده کرد. با پاشیدن این ماده، ۱۰° ۷ روز بعد (برحسب درجه‌ی حرارت محیط) بیش از ۹° درصد برگ‌ها می‌ریزند.

فعالیت

مزرعه خود را بهروش دستی برداشت کنید.

– در برداشت مکانیزه مشارکت کنید.

عملکرد: مقدار محصول پنبه در مناطق مختلف بسته به شرایط طبیعی محیط، رقم، عملیات زراعی و سایر شرایط، متغیر می‌باشد، به طوری که مقدار تولید الیاف پنبه، از کم تراز یک تن تا بیش از چهار تن در هکتار – برحسب شرایط نامبرده – فرق می‌کند. به طور متوسط به ازای تولید هر ۱۰۰ کیلوگرم الیاف، مقدار ۱۷° کیلوگرم دانه‌ی پنبه حاصل می‌شود. نسبت الیاف به دانه را، کیل می‌گویند.

مقایسه کنید

عملکرد خود را با عملکرد واحد آموزشی، منطقه، استان و متوسط کشور و متوسط جهانی مقایسه کنید.

ارزیابی کنید

عملکرد بنه خود را با سایرین ارزیابی کنید.

خودآزمایی

- ۱- هدف اصلی از زراعت پنbe تولید ... آن است.
- ۲- تأثیر کاهش شدّت نور را در پنbe توضیح دهید.
- ۳- پنbe معمولاً به شوری خاک ... و به سله‌ی خاک... است.
- ۴- در زراعت پنbe بذر انتخابی باید دارای چه شرایطی باشد؟
- ۵- محسن کرک‌زدایی با دلینته کردن بذر پنbe را بنویسید.
- ۶- قطع سرشاخه‌های پنbe یا سرزنى در زراعت پنbe، چه وقت و به چه منظوری انجام می‌شود؟
- ۷- در چه مراحل رشدی از پنbe، آبیاری را می‌توان قطع کرد؟
- ۸- روش‌های برداشت پنbe را به اختصار توضیح دهید.
- ۹- محصولات به دست آمده از وش پنbe و موارد استفاده‌ی هر یک را بنویسید.
- ۱۰- هدف و چگونگی ریختن برگ‌ها در پنbe را توضیح دهید.

جمع‌آوری کنید

نمونه‌ی علائم بیماری‌ها را در سطح واحد آموزشی و منطقه‌ی خود جمع‌آوری و پس از تأیید هنرآموزان خود، مطالعه و در کلکسیون نگهداری کنید.
آفات مهم منطقه‌ی خود را که روی پنbe هم صدمه می‌زنند جمع‌آوری و پس از تأیید هنرآموزان خود، آن‌ها را از نظر نحوه خسارت، زمان و ظهور مراحل مختلف و غیره مطالعه و کلکسیون خود را کامل کنید.

بررسی کنید

نظام آبیاری پنbe در منطقه‌ی شما چگونه است؟ آن را بررسی کنید.

تحقیق کنید

عملکرد پنبه پس از سال زراعی ۱۳۸۳-۸۴ چه تغییری کرده است؟ علت نوسان عملکرد دیم و آبی را بحث کنید.

جدول ۵—۳—سطح زیرکاشت، تولید و عملکرد پنبه در کشور بر حسب آبی و دیم در سال‌های اخیر (فقط برای تحقیق)

ردیف از پایه	سطح زیر کاشت (هکتار)							
	آبی	دیم	جمع	آبی	دیم	جمع	آبی	دیم
۷۷_۷۸	۱۹۳۳۱۷	۲۲۷۰۴	۲۱۶۰۲۱	۴۲۰۵۹۹/۹	۲۰۱۶۶/۹۷	۴۴۰۷۶۶/۸۷	۲۱۷۵/۷	۸۸۸/۲۶
۷۸_۷۹	۲۲۳۴۹۸/۵	۲۲۷۲۸	۲۴۶۲۲۶/۵	۴۶۹۰۴۹/۹۹	۲۸۰۷۳/۹۵	۴۹۷۱۲۳/۹۴	۲۰۹۸/۶۷	۱۲۲۵/۲۱
۷۹_۸۰	۲۲۹۶۲۸/۵	۲۰۴۹۰	۲۵۰۱۱۸/۵	۴۷۱۶۷۸/۳۱	۲۴۴۹۹/۰۴	۴۹۶۱۷۷/۳۵	۲۰۵۴/۰۹	۱۱۹۵/۶۶
۸۰_۸۱	۱۴۵۲۳۶	۵۹۸۵	۱۵۱۲۲۱	۳۲۹۳۰۷/۶	۶۱۲۹/۸۵	۲۴۵۴۳۷/۴۵	۲۲۳۶/۲۵	۱۰۲۴/۲
۸۱_۸۲	۱۳۳۵۰۰	۶۵۸۷	۱۴۰۰۸۷	۳۴۲۵۲۳/۰۸	۹۲۴۲/۸۶	۳۵۱۷۷۶/۹۴	۲۵۶۵/۷۹	۱۴۰۳/۳۵
۸۲_۸۳	۱۵۸۴۴۲	۸۲۳۱	۱۶۶۶۷۳	۴۰۷۱۲۱/۸۸	۱۳۱۰۴/۲۷	۴۲۰۲۲۶/۱۵	۲۵۶۹/۵۳	۱۵۹۲/۰۶
۸۳_۸۴	۱۴۳۲۲۳/۲	۱۶۲۹۱	۱۵۹۵۲۴/۲	۳۴۳۵۸۹/۱۲	۱۹۸۷۱/۱۱	۳۶۲۴۶۰/۲۳	۲۳۹۸/۸۱	۱۲۱۹/۷۶