

## ۴-۱-۴- قضیه‌های مشتق

قضیه‌ی ۱: اگر تابع  $f$  در  $x=a$  مشتق داشته باشد در این نقطه پیوسته است.

$$f(x) = x^2 - 3x$$

مثال ۱: تابع  $f$  با ضابطه‌ی مقابل مفروض است این تابع

در  $x=1$  مشتق‌پذیر است و مشتق آن برابر است با :

$$f'(x) = 2x - 3 \Rightarrow f'(1) = -1$$

- بنابراین با توجه به قضیه‌ی ۱ تابع پیوسته است، زیرا :

$$\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = f(1) = -2$$

قضیه‌ی ۲: (مشتق حاصل جمع دو تابع)

اگر  $u$  و  $v$  دو تابع بر حسب  $x$  و مشتق‌پذیر باشند و  $f(x) = u + v$ ، آن‌گاه

$$y = x^2 + x^3$$

مثال ۲: مشتق تابع مقابل را به دست آورید.

$$y' = 2x + 3x^2$$

$x^2$  و  $x^3$  دو تابع مشتق‌پذیرند، پس :

قضیه‌ی ۳: اگر  $u$  و  $v$  بر حسب  $x$  دارای مشتق باشند و  $f = u \cdot v$  آن‌گاه :

$$f(x) = (-6x^2 + 7x)(3x^4 + \sqrt{x})$$

مثال ۳: مشتق تابع مقابل را به دست آورید.

- با استفاده از قضیه‌ی ۳، مشتق  $f(x)$  برابر است با :

$$f'(x) = (-12x + 7)(3x^4 + \sqrt{x}) + (12x^3 + \frac{1}{2\sqrt{x}})(-6x^2 + 7x)$$

تذکر: مشتق حاصل‌ضرب دو تابع به حاصل‌ضرب تعداد متناهی تابع قابل تعمیم است.

$$f(x) = (x-2)(x-5)(x+6)$$

مثال ۴: مشتق تابع مقابل را به ازای  $x=2$  به دست

آورید.

حل: مشتق تابع برابر است با :

$$f'(x) = (x-2)'(x-5)(x+6) + (x-2)(x-5)'(x+6) + (x-2)(x-5)(x+6)'$$

- پس از محاسبه‌ی مشتق هر پراتز خواهیم داشت :

$$\Rightarrow f'(x) = (x-5)(x+6) + (x-2)(x+6) + (x-2)(x-5)$$

- به جای  $x$  عدد ۲ را قرار می‌دهیم :

$$\Rightarrow f'(2) = (2-5)(2+6) + (2-2)(2+6) + (2-2)(2-5)$$

پس مشتق  $f(x)$  به ازای  $x=2$  برابر است با :

$$f'(2) = -24$$

**قضیه‌ی ۴:** (مشتق حاصل تقسیم دو تابع)

اگر  $u'(x)$  و  $v'(x)$  وجود داشته باشد و  $v(x) \neq 0$  به شرط آن‌گاه داریم :

$$f'(x) = \frac{u'(x)v(x) - v'(x).u(x)}{v^2(x)}$$

مثال ۵: مشتق تابع مقابله را بنویسید.

$$y = \frac{-7x + 5}{3 + 4x}$$

حل: با استفاده از قضیه‌ی ۴ داریم :

$$\Rightarrow y' = \frac{-7(3 + 4x) - 4(-7x + 5)}{(3 + 4x)^2}$$

$$= \frac{-21 - 28x + 28x - 20}{(3 + 4x)^2}$$

$$\Rightarrow y' = \frac{-41}{(3 + 4x)^2}$$

پس از ساده کردن، مشتق تابع برابر است با :

مثال ۶: مشتق تابع مقابله را به دست آورید.

$$f(x) = \frac{5}{x^3}$$

حل: طبق قضیه‌ی ۴ داریم :

$$f'(x) = \frac{0 \times x^3 - (3x^2) \times 5}{(x^3)^2} = \frac{-15x^2}{x^6}$$

- مشتق تابع برابر است با :

$$f(x) = -\frac{15}{x^4}$$

**قضیه ۵:** (مشتق ترکیب دو تابع)

اگر  $y$  تابعی بر حسب  $u$  با ضابطه  $u = f(u)$  و  $u$  نیز تابعی بر حسب  $x$  با ضابطه  $u = g(x)$  باشد، آن گاه

$$y = f(u) = f(g(x)) = (f \circ g)(x)$$

می‌باشد. حال اگر  $u = g(x)$  در  $x$  مشتق‌پذیر و تابع  $f$  در  $u = g(x)$  مشتق‌پذیر باشد آن‌گاه  $y$  نیز در  $x$  مشتق‌پذیر است و همچنین :

$$y' = (f \circ g)'(x) = f'(g(x)) \cdot g'(x)$$

**مثال ۷:** تابع‌های  $u$  و  $y$  در مقابل مفروض‌اند. مشتق  $y$  را بر حسب  $x$  ( $y'_x$ ) به دست آورید.

$$y = -2u^3, \quad u = 3x^2 + 5x$$

- با توجه به قضیه ۵ و رابطه  $y'_x$  خواهیم داشت :

$$y = f(u) \Rightarrow y' = u'f'(u) \Rightarrow y' = (6x+5)(-6u^2)$$

- در عبارت مشتق، به جای  $u$ ، مساوی آن را قرار می‌دهیم،

$$y' = -6(6x+5)(3x^2+5x)^2$$

پس :

**مثال ۸:** تابع‌های  $u$  و  $y$  در مقابل مفروض‌اند :

$$y = 3u^2 + 5u - 3 \quad u = \sqrt{3x+1}$$

ابتدا  $y'_x$  را یافته، سپس مقدار  $y'_x$  را حساب کنید.

$$y = f(u) \Rightarrow y' = u'f'(u) \Rightarrow$$

حل: با کاربرد قضیه ۵ مشتق تابع مرکب عبارت است

از :

$$y'_x = \left(\frac{3}{2\sqrt{3x+1}}\right)(6u+5) \Rightarrow$$

- در مشتق تابع به جای  $u$  مقدار آن را قرار می‌دهیم :

$$y'_x = \left(\frac{3}{2\sqrt{3x+1}}\right)(6\sqrt{3x+1}+5) \Rightarrow$$

- برای محاسبه  $y'_{(5)}$  به جای  $x$  عدد ۵ را در مشتق

قرار می‌دهیم.

$$y'_{(5)} = \left(\frac{3}{2\sqrt{3\times 5+1}}\right)(6\sqrt{3\times 5+1}+5)$$

- مشتق تابع در  $x=5$  برابر است با :

$$\Rightarrow y'_{(5)} = \left(\frac{3}{8}\right)(29) \Rightarrow y'_{(5)} = \frac{87}{8}$$

## (مشتق توابع مثلثاتی)

### الف) مشتق تابع سینوس

مثال‌های نمونه:

$$y = \sin x . \quad \forall x . \quad y. = \cos x . \quad \forall$$

$$y = 2 \sin x . \quad 3 \sin(x^2 . x) .$$

$$y. = 2 \cos x . \quad 3(2x . 1) \cos(x^2 . x)$$

$$1 - \text{اگر } y = \sin x \quad \text{آن گاه } y. = \cos x$$

$$2 - \text{اگر } y = u \cdot \cos u \quad \text{آن گاه } y. = \sin u \cdot u + \cos u \cdot (-\sin u)$$

### ب) مشتق تابع کسینوس

$$y = \cos \sqrt{x} . \quad y. = . \frac{1}{2\sqrt{x}} \sin \sqrt{x}$$

$$1 - \text{اگر } y = \cos x \quad \text{آن گاه } y. = -\sin x$$

$$2 - \text{اگر } y = \cos 2x \quad \forall \cos 3x . \quad y. = . 2 \sin 2x . \quad 2 \sin 3x \quad y. = . u \cdot \sin u \quad \text{بر حسب } (x) \quad \text{آن گاه } y. = \cos u \cdot u$$

### ج) مشتق تابع تانژانت

$$1 - \text{اگر } y = \tan x \quad \text{آن گاه } y. = \frac{1}{\cos^2 x} \quad y = \tan x$$

$$2 - \text{اگر } y = \tan u \quad \text{بر حسب } (x) \quad \text{آن گاه } y. = u \cdot (\sec^2 u)$$

$$y = \tan 4x . \quad y. = 4(\sec^2 4x) = \frac{4}{\cos^2 4x}$$

### د) مشتق تابع کتانژانت

$$1 - \text{اگر } y = \cot x \quad \text{آن گاه } y. = -\csc^2 x$$

$$y = \cot x . \quad y. = . -3(\sec^2 x) \cot x \quad y. = . (\sec^2 x) = \frac{1}{\sin^2 x}$$

$$2 - \text{اگر } y = \cot u \quad \text{آن گاه } y. = u \cdot (-\csc^2 u) = -\csc^2 u \cdot u$$

$$y = \cot \sqrt{x} . \quad y. = . \sqrt{x}(\sec^2 \sqrt{x}) = \frac{\sqrt{x}}{\sin^2 \sqrt{x}}$$

**مثال ۹:** مشتق تابع روبرو را در نقطه‌ی داده شده حساب

$$f(x) = 5x^{\frac{1}{4}} - 3 \sin 2x, \quad x = \frac{\pi}{4}$$

کنید.

حل: مشتق تابع را به ازای  $x = \frac{\pi}{4}$  حساب می‌کنیم.

$$f'(x) = 10x^{-\frac{3}{4}} - 6 \cos 2x. \quad f'(\frac{\pi}{4}) = 10(\frac{\pi}{4})^{-\frac{3}{4}} - 6 \cos 2(\frac{\pi}{4})$$

— در  $x = \frac{\pi}{4}$ ، مشتق برابر است با :

$$\therefore f'(\frac{\pi}{4}) = \frac{5\pi}{2} - 6 \cos^{\circ} \frac{\pi}{2} = \frac{5\pi}{2}$$

**مثال ۱۰:** مشتق تابع مقابله را در نقطه‌ی داده شده

محاسبه کنید.

$$f(x) = \sin 3x \cdot \cos 2x, \quad x = \frac{\pi}{6}$$

حل: مشتق حاصل ضرب دو تابع برابر است با :

$$f'(x) = 3 \cos 3x \cos 2x - 2 \sin 2x \cdot \sin 3x.$$

— به ازای  $x = \frac{\pi}{6}$ ، مشتق برابر است با :

$$f'(\frac{\pi}{6}) = 3 \cos \frac{\pi}{2} \cos \frac{\pi}{3} - 2 \sin \frac{\pi}{3} \sin \frac{\pi}{2}.$$

— پس از ساده کردن مشتق به دست می‌آید.

$$f'(\frac{\pi}{6}) = 3(\frac{1}{2}) \cdot 2 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = \sqrt{3}$$

**مثال ۱۱:** مشتق تابع مقابله را در نقطه‌ی داده شده

به دست آورید.

$$f(x) = x \sqrt{2x} \quad \text{و} \quad x = \frac{9}{2}$$

حل: مشتق حاصل ضرب دو تابع برابر است.

$$f'(x) = 1 \cdot \sqrt{2x} + \frac{2}{2\sqrt{2x}} \cdot x = \sqrt{2x} + \frac{x}{\sqrt{2x}}$$

— به ازای  $x = \frac{9}{2}$  مقدار مشتق برابر است با :

$$\therefore f'(\frac{9}{2}) = \sqrt{9} \cdot \frac{\frac{9}{2}}{\sqrt{9}} = 3 \cdot \frac{3}{2} = \frac{9}{2}$$

**مثال ۱۲:** مشتق تابع مقابله را به ازای نقطه‌ی داده

شده به دست آورید.

$$f(x) = 2x \cdot \cot \frac{x}{2} \quad \text{و} \quad x = \pi$$

حل: مشتق جمع دو تابع برابر جمع مشتق‌های آن دو

تابع است؛ در نتیجه داریم :

$$f'(x) = 2 \cdot \frac{1}{2} (\cot \frac{x}{2}) + 1 \cdot \cot \frac{x}{2} \quad f'(\pi) = 2 \cdot \frac{1}{2} (1 \cdot \cot \frac{\pi}{2})$$

— به ازای  $x = \pi$  مقدار مشتق برابر است با :

$$\therefore f'(\pi) = 2 \cdot \frac{1}{2} (1 \cdot 0) = 2 \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{2}$$

— پس از ساده کردن  $f'(\pi)$  به دست می‌آید.

$$\Rightarrow f'(\pi) = \frac{3}{2}$$

**مثال ۱۳:** مشتق تابع مقابله را به ازای عدد داده شده محاسبه کنید.

$$f(x) = \frac{3}{5x-1} \quad \text{و } x=1$$

– با استفاده از مشتق کسر به ازای  $x=1$  مشتق را به دست می آوریم :

$$f'(x) = \frac{0 \times (5x-1) - 5 \times 3}{(5x-1)^2} = \frac{-15}{(5x-1)^2} \Rightarrow$$

$$f'(1) = \frac{-15}{16}$$

**مثال ۱۴:** مشتق تابع مقابله را به ازای عدد داده شده محاسبه کنید.

$$f(t) = \frac{2t-4}{5-4t}, \quad t=4$$

– مشتق تابع کسری برابر است با :

$$f'(t) = \frac{2(5-4t) - (-4)(2t-4)}{(5-4t)^2} = \frac{10 - 8t + 8t - 16}{(5-4t)^2}$$

– به ازای  $t=4$ ، مشتق تابع برابر است با :

$$\Rightarrow f'(t) = \frac{-6}{(5-4t)^2} \Rightarrow f'(4) = \frac{-6}{121}$$

**مثال ۱۵:** مشتق تابع مقابله را به ازای عدد داده شده محاسبه کنید.

$$y = \sqrt{4 + \sin 2x} \quad \text{و } x=0$$

حل: مشتق تابع به ازای  $x=0$  برابر است با :

$$y' = \frac{\cos 2x}{\sqrt{4 + \sin 2x}} \Rightarrow y'(0) = \frac{\cos(0)}{\sqrt{4 + \sin(0)}} = \frac{1}{2}$$

**مثال ۱۶:** مشتق تابع مقابله را به ازای عدد داده شده محاسبه کنید.

$$f(0) = \sin^r + \cos^v 0, \quad r = v = \frac{\pi}{2}$$

حل: مشتق برابر است با :

$$f'(0) = r \cos 0 \sin^{r-1} - v \sin 0 \cos^{v-1} 0$$

– به ازای  $r=v=\frac{\pi}{2}$ ، مقدار مشتق به دست می آید.

$$f'(\frac{\pi}{2}) = r \cos \frac{\pi}{2} \sin^r \frac{\pi}{2} - v \sin \frac{\pi}{2} \cos^v \frac{\pi}{2} \Rightarrow f'(\frac{\pi}{2}) = 0$$

**مثال ۱۷:** مشتق تابع مقابله را به ازای عدد داده شده حساب کنید.

$$f(x) = (x^r + \cos x)(-rx + v), \quad x=0$$

$$f'(x) = (2x - \sin x)(-3x + 4) - 3(x^2 + \cos x)$$

حل: مشتق تابع حاصل ضرب برابر است با:

$$\begin{aligned} f'(0) &= (2(0) - \sin(0))(-3(0) + 4) - 3(0^2 + \cos(0)) \\ \Rightarrow f'(0) &= 0 - 3 \Rightarrow f'(0) = -3 \end{aligned}$$

- به ازای  $x = 0$  مقدار مشتق به دست می‌آید.

مثال:

$$f(x) = 3x^5 - 6x^3 + 11$$

$$f'(x) = 15x^4 - 12x$$

$$f''(x) = 60x^3 - 12$$

**۱-۴-۵-مشتق دوم یک تابع:** با تکرار عمل

مشتق‌گیری در صورت وجود مشتق می‌توان از مشتق تابع دوباره مشتق گرفت که به آن مشتق مرتبه‌ی دوم تابع می‌گوییم و آن را به صورت "y" یا  $f''(x)$  نمایش می‌دهیم.

نکته: اگر تابع  $f$  با ضابطه‌ی  $y = f(x)$  روی بازه‌ی باز I مشتق‌پذیر باشد، اگر تابع  $f'$  روی I مشتق‌پذیر باشد آنگاه می‌گوییم تابع  $f$  روی I مشتق دوم دارد و مشتق دوم  $y$  را با  $f''(x)$  نمایش می‌دهیم و به همین ترتیب مشتق مرتبه‌ی سوم را با  $f'''(x)$  یا  $f^{(3)}(x)$  و ... و مشتق مرتبه‌ی  $n$ ام را با  $f^{(n)}(x)$  نمایش می‌دهیم.

$$f^{(3)}(x) = 180x^2 \quad f^{(4)}(x) = 360x$$

$$f^{(5)}(x) = 360 \quad f^{(6)}(x) = 0$$

$$f(x) = -3x^3 + 5x^2 \quad x = -2$$

مثال ۱: در تابع روبرو  $(x)^2$  را در نقطه‌ی داده شده حساب کنید.

$$f'(x) = -9x^2 + 10x \Rightarrow f''(x) = -18x + 10$$

- از مشتق اول دوباره مشتق می‌گیریم:

$$f''(-2) = -18(-2) + 10 \Rightarrow f''(-2) = 46$$

- به ازای  $x = -2$  مشتق دوم تابع برابر است با:

$$f(x) = \sin x + \cos x \quad x = \frac{\pi}{4}$$

مثال ۲: در تابع مقابل  $(x)^2$  را در نقطه‌ی داده شده به دست آورید.

$$f'(x) = \cos x - \sin x \Rightarrow f''(x) = -\sin x - \cos x$$

- از مشتق اول دوباره مشتق می‌گیریم:

$$\Rightarrow f''\left(\frac{\pi}{4}\right) = -\sin \frac{\pi}{4} - \cos \frac{\pi}{4} = -\frac{\sqrt{2}}{2} - \frac{\sqrt{2}}{2}$$

- به ازای  $x = \frac{\pi}{4}$  مشتق دوم تابع برابر است با:

$$\Rightarrow f''\left(\frac{\pi}{4}\right) = -\sqrt{2}$$

- پس از ساده کردن داریم:

$$y = \frac{1}{3}x^3 - 5Bx^2 + 3x$$

مثال ۳: تابع مقابل مفروض است، هرگاه  $y''(2) = 9$  باشد

مقدار B را محاسبه کنید.

$$y' = x^{\frac{1}{3}} - 1 \circ Bx + 3 \Rightarrow y'' = 2x - 1 \circ B$$

حل: مشتق اول و دوم تابع را پیدا می کنیم :

$$9 = 2(2) - 1 \circ B \Rightarrow 1 \circ B = 4 - 9 \Rightarrow B = \frac{-5}{1 \circ} = \frac{-1}{2}$$

- مشتق را برابر عدد داده شده قرار می دهیم، B به دست

می آید.

$$f(x) = x^{\frac{4}{3}} \quad g(x) = x\sqrt{x}$$

مثال ۴: تابع های f و g مفروض اند :

$$f''(\lambda) + g''(4) = \frac{35}{72}$$

نشان دهید بین مشتق های دوم آنها رابطه‌ی روبرو برقرار

است :

$$f(x) = x^{\frac{4}{3}} \Rightarrow f'(x) = \frac{4}{3}x^{\frac{4}{3}-1} = \frac{4}{3}x^{\frac{1}{3}}$$

حل: مشتق اول تابع با ضابطه f(x) برابر است با :

- برای محاسبه‌ی f''(x) از f'(x) مشتق می‌گیریم :

$$\Rightarrow f''(x) = \frac{4}{3} \left( \frac{1}{3} \right) x^{\frac{1}{3}-1} = \frac{4}{9}x^{-\frac{2}{3}} = \frac{4}{9x^{\frac{2}{3}}}$$

$$f''(\lambda) = \frac{4}{9\sqrt[3]{\lambda^2}} \Rightarrow f''(\lambda) = \frac{4}{9\sqrt[3]{\lambda^2}} = \frac{1}{9}$$

- به ازای  $x = \lambda$  مقدار f''(x) برابر است با :

$$g'(x) = 1 \times \sqrt{x} + \frac{1}{2\sqrt{x}} \times x \Rightarrow g'(x) = \sqrt{x} + \frac{x}{2\sqrt{x}}$$

- مشتق اول g(x) برابر است با :

$$g''(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}} + \frac{1 \times (2\sqrt{x}) - x(2 \times \frac{1}{2\sqrt{x}})}{(2\sqrt{x})^2}$$

- برای محاسبه‌ی g''(x) از g'(x) مشتق می‌گیریم :

$$\Rightarrow g''(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}} + \frac{2x - x}{4x} = \frac{1}{2\sqrt{x}} + \frac{1}{4\sqrt{x}}$$

- مشتق دوم g(x) برابر است با :

$$\Rightarrow g''(\lambda) = \frac{1}{2\sqrt{\lambda}} + \frac{1}{4\sqrt{\lambda}} = \frac{1}{4} + \frac{1}{\lambda} = \frac{2+1}{\lambda}$$

- به ازای  $x = \lambda$  مشتق دوم g(x) برابر است با :

$$\Rightarrow g''(\lambda) = \frac{3}{\lambda}$$

$$f''(\lambda) + g''(\lambda) = \frac{1}{9} + \frac{3}{\lambda} = \frac{\lambda + 27}{72} = \frac{35}{72}$$

- با مقایسه‌ی مقادیر مشتق دوم نتیجه می‌گیریم که رابطه برقرار است.

## آزمون پایانی (۱)

### محل پاسخ به سؤالات آزمون پایانی (۱)

۱- مشتق تابع‌های زیر را با استفاده از تعریف مشتق به دست آورید.

$$1) f(x) = 5 - 3x$$

$$2) f(x) = x^2 - 7x$$

۲- با استفاده از تعریف مشتق، ثابت کنید تابع  $f(x) = |x - 2|$  در نقطه‌ی  $x = 2$  مشتق ندارد.

۳- مشتق تابع‌های زیر را به دست آورید.

$$1) y = \sqrt[3]{(2x^2 + 3x)^2}$$

$$2) y = (3x^2 + 5x)^5$$

$$3) y = (-6 \sin 2x + \cos 3x)^4$$

$$4) y = \frac{1 - 7x}{3x + 4}$$

۴- مشتق دوم توابع زیر را به دست آورید.

$$\text{الف) } y = \sqrt[3]{5x + 1} + 7x^3$$

$$\text{ب) } y = 2 \cos 3x$$

$$\text{ج) } y = \frac{3}{x}$$

$$\text{د) } y = (3x^2 - 5x)^3$$