

## ابوریحان بیرونی



ابوریحان محمد بن احمد بیرونی  
در سال ۳۶۲ قمری / ۳۵۲ شمسی / ۹۷۳ میلادی در  
بیرون خوارزم متولد شد.  
در سال ۴۴۲ قمری / ۴۲۹ شمسی / ۱۰۵۰ میلادی  
در خوارزم درگذشت.  
ریاضیدان، منجم و دانشمند و یکی از مفاخر بی نظیر  
دنیای علم بود.

ابوریحان بیرونی

کارهای ریاضی او عبارتند از :

۱. تعریف مفاهیم اولیه ریاضی برای دانش آموزان نجوم در کتاب التفهیم
۲. بررسی عمیق روی مسأله‌ی تثلیث زاویه
۳. محاسبه‌ی تقریبی وتر یک درجه و طول قوس بدون استفاده از قاعده‌ی  
انتگرال‌گیری
۴. محاسبه‌ی مجموع سری  $2^k$ .
۵. دستور محاسبه‌ی طول قوس
۶. محاسبه‌ی تقریبی ضلع نه ضلعی منتظم به وسیله‌ی معادله‌ی درجه‌ی سه  
 $x^3 - 3x - 1 = 0$ .

## منابع

۱. بیرونی‌نامه، ابوالقاسم قربانی
۲. اطلس ریاضی صفحه‌ی ۵۷۹
۳. دائرةالمعارف فارسی جلد ۱ صفحه‌ی ۳۰
۴. دانشنامه‌ی جهان اسلام جلد ۵ صفحه‌ی ۱۶۳
۵. زندگی‌نامه‌ی ریاضیدانان دوره‌ی اسلامی ابوالقاسم قربانی صفحه‌ی ۱۷۶
۶. زندگی‌نامه‌ی علمی دانشوران بنیاد دانشنامه‌ی بزرگ فارسی جلد ۱ صفحه‌ی ۲۷۹
۷. لغت‌نامه‌ی دهخدا تحت نام ابوریحان بیرونی


# ۲

## معادلات خط و صفحه

### ۱.۲ خط در فضا

یک خط مانند  $L$  با نقطه معلومی چون  $P_0(x_0, y_0, z_0)$  روی  $L$  و بردار ناصفر  $u(p, q, r)$  موازی با  $L$  به طور منحصر به فرد مشخص می شود. اکنون می خواهیم معادله خط  $L$  را پیدا کنیم. برای این منظور فرض کنیم  $P(x, y, z)$  نقطه دلخواهی باشد. در این صورت  $P$  روی خط  $L$  است اگر و فقط اگر بردارهای  $u$  و  $\vec{P_0P}$  با هم موازی باشند (به شکل ۱ نگاه کنید) و این معادل است با این که عدد حقیقی  $t$  موجود باشد با این ویژگی که  $\vec{P_0P} = t u$ . اما  $\vec{P_0P} = (x - x_0, y - y_0, z - z_0)$  و در نتیجه  $\vec{P_0P} = t u$  معادل است با این که  $(x - x_0, y - y_0, z - z_0) = t(p, q, r)$  بنابراین نقطه  $P(x, y, z)$  روی خط  $L$  است اگر و فقط اگر عدد حقیقی  $t$  موجود باشد که  $x - x_0 = pt$ ،  $y - y_0 = qt$  و  $z - z_0 = rt$ . در نتیجه معادله خط  $L$  که از نقطه معلومی چون  $P_0(x_0, y_0, z_0)$  می گذرد و با بردار  $u(p, q, r)$  موازی است عبارت است از:

$$\begin{cases} x - x_0 = pt \\ y - y_0 = qt \\ z - z_0 = rt \end{cases} \quad t \in \mathbb{R}. \quad (1)$$



شکل ۱

این شکل از معادلات خط به معادلات پارامتری خط موسوم اند، و در آن  $t$  پارامتر نامیده می شود. در واقع به ازای هر  $t$ ، یک نقطه از خط  $L$  به دست می آید و برعکس هر نقطه از خط  $L$ ، به ازای  $t$  ای در معادلات (۱) صدق می کند و لذا وقتی  $t$  در  $\mathbb{R}$  تغییر می کند تمام نقاط خط  $L$  به وجود می آید.

مثال ۱. معادلات پارامتری خطی که از نقطه  $P_0 = (2, -4, 1)$  می گذرد و موازی با بردار  $u = (3, \frac{1}{4}, -1)$  است با توجه به آنچه در بالا ذکر کردیم به صورت زیر است

$$\begin{cases} x = 2 + 3t \\ y = -4 + \frac{1}{4}t \\ z = 1 - t \end{cases}, t \in \mathbb{R}.$$

اکنون می خواهیم شکل دیگری از معادله خط را پیدا کنیم. با توجه به معادلات پارامتری خط  $L$  که از نقطه  $P_0 = (x_0, y_0, z_0)$  می گذرد و موازی با بردار  $u = (p, q, r)$  است و در (۱) به آن اشاره شد و با فرض این که  $p, q, r$  هر سه مخالف صفر باشند به دست می آوریم  $\frac{y - y_0}{q} = t$ ،  $\frac{x - x_0}{p} = t$

$$\text{و } \frac{z - z_0}{r} = t. \text{ لذا از حذف پارامتر } t \text{ به معادلات زیر می رسیم}$$

$$\frac{x - x_0}{p} = \frac{y - y_0}{q} = \frac{z - z_0}{r}. \quad (2)$$

این معادلات را معادلات متقارن خط  $L$  می نامیم.

مثال ۲. معادلات متقارن خط  $L$  را که از دو نقطه  $P_1 = (4, -6, 5)$  و  $P_2 = (2, -3, 0)$

می گذرد پیدا می کنیم. برای این منظور توجه می کنیم که این خط موازی با بردار  $P_2P_1 = (-2, 3, -5)$  می باشد و لذا می توانیم فرض کنیم  $u = (-2, 3, -5)$ . اکنون با توجه به این که  $P_1 = (4, -6, 5)$  نقطه ای از این خط است، معادلات متقارن خط  $L$  به صورت زیر به دست می آید

$$\frac{x - 4}{-2} = \frac{y + 6}{3} = \frac{z - 5}{-5}.$$

تذکر. توجه می‌کنیم که در محاسبه معادلات متقارن یک خط فرض کردیم که  $p$ ،  $q$  و  $r$  هر سه مخالف صفر هستند. اکنون اگر یکی از  $p$ ،  $q$  یا  $r$  صفر باشد، مثلاً  $p=0$ ، معادلات پارامتری خط به صورت

$$\begin{cases} x = x_0 \\ y = y_0 + qt, \quad t \in \mathbb{R}, \\ z = z_0 + rt \end{cases}$$

تبدیل خواهد شد و لذا معادلات متقارن خط در این حالت به صورت زیر است

$$x = x_0, \quad \frac{y - y_0}{q} = \frac{z - z_0}{r}.$$

در حالات دیگر نیز در مورد صفر شدن یکی یا دو تا از  $p$ ،  $q$  یا  $r$  از روی معادلات پارامتری می‌توان معادلات متقارن را به دست آورد.

**مثال ۳.** می‌خواهیم معادلات متقارن خطی را که از نقطه  $P_1 = (-2, -2, 1)$  می‌گذرد و موازی با بردار  $u = (0, 2, -3)$  است به دست آوریم. با توجه به آنچه در بالا اشاره کردیم این معادلات به صورت زیر است

$$x = -2, \quad \frac{y + 2}{2} = \frac{z - 1}{-3}.$$

**مثال ۴.** می‌خواهیم معادلات متقارن خطی را که از دو نقطه  $P_1 = (2, 3, -1)$  و  $P_2 = (2, 3, 4)$  می‌گذرد به دست آوریم. برای این منظور توجه می‌کنیم که این خط موازی با بردار  $u = P_2 P_1 = (0, 0, 5)$  می‌باشد و چون از نقطه  $P_1$  نیز می‌گذرد، لذا معادلات متقارن آن به صورت زیر خواهد بود

$$x = 2, \quad y = 3.$$

## فاصله یک نقطه از یک خط

می‌خواهیم فاصله نقطه مفروض  $P$  را که خارج خط  $L$  قرار دارد از آن پیدا کنیم. قضیه زیر برای این منظور کارساز است.

**قضیه ۱.** فرض کنیم  $L$  خطی باشد که با بردار غیر صفر  $u$  موازی است و  $P$  را نقطه‌ای

می‌گیریم که خارج (یا روی)  $L$  قرار دارد. در این صورت فاصله  $P$  از  $L$ ، یعنی  $D$ ، برابر است با

$$D = \frac{|\mathbf{u} \times \vec{P_0P}|}{|\mathbf{u}|},$$

که در آن  $P_0$  نقطه دلخواهی روی  $L$  است.

**اِنبات.** فرض کنیم  $\theta$  زاویه بین بردارهای  $\mathbf{u}$  و  $\vec{P_0P}$  باشد، پس  $0 \leq \theta \leq \pi$ .


اگر  $0 < \theta < \frac{\pi}{2}$ ، آنگاه با توجه به شکل ۲ داریم  $\sin \theta = \frac{D}{|\vec{P_0P}|}$  و لذا  $D = |\vec{P_0P}| \sin \theta$ .

توجه می‌کنیم که اگر  $\theta = 0$  یا  $\theta = \frac{\pi}{2}$ ، مجدداً تساوی اخیر برقرار است.


اکنون فرض می‌کنیم  $\frac{\pi}{2} < \theta < \pi$  و با توجه به شکل ۳ به دست می‌آوریم  $\sin(\pi - \theta) = \frac{D}{|\vec{P_0P}|}$

و در نتیجه  $D = |\vec{P_0P}| \sin(\pi - \theta)$ . چون  $\sin(\pi - \theta) = \sin \theta$ ، لذا در این حالت نیز به دست می‌آوریم  $D = |\vec{P_0P}| \sin \theta$ . اگر  $\theta = \pi$ ، نیز تساوی اخیر برقرار است. پس در هر حال داریم

$$D = |\vec{P_0P}| \sin \theta.$$



شکل ۳



شکل ۲

اما با توجه به این که  $|\mathbf{u} \times \vec{P_0P}| = |\mathbf{u}| |\vec{P_0P}| \sin \theta$ ، به دست می‌آوریم  $|\mathbf{u} \times \vec{P_0P}| = |\mathbf{u}| D$  و لذا

$$\blacksquare. D = \frac{|\mathbf{u} \times \vec{P_0P}|}{|\mathbf{u}|}$$

مثال ۵. می‌خواهیم فاصله نقطه  $P = (۵, -۶, ۲)$  را از خط  $L$  که با معادلات پارامتری زیر داده شده است پیدا کنیم

$$\begin{cases} x = ۱ \\ y = -۱ + ۴t \\ z = ۲ - ۳t \end{cases}, \quad t \in \mathbb{R}.$$

برای این منظور نقطه  $P_0 = (۱, -۱, ۲)$  را روی  $L$  در نظر می‌گیریم. بردار  $u = (۰, ۴, -۳)$  موازی خط  $L$  است و در نتیجه

$$\begin{aligned} D &= \frac{|u \times \vec{P_0 P}|}{|u|} = \frac{|(۰, ۴, -۳) \times (۴, -۵, ۰)|}{|(۰, ۴, -۳)|} = \frac{|(-۱۵, -۱۲, -۱۶)|}{|(۰, ۴, -۳)|} \\ &= \frac{\sqrt{(-۱۵)^2 + (-۱۲)^2 + (-۱۶)^2}}{\sqrt{۰^2 + ۴^2 + (-۳)^2}} = \frac{\sqrt{۶۲۵}}{\sqrt{۲۵}} = \frac{۲۵}{۵} = ۵. \end{aligned}$$

### وضعیت نسبی دو خط در فضا

به‌طور کلی دو خط متمایز در فضا یکی از سه وضعیت نسبی موازی، متقاطع یا متناظر را دارند. گیریم  $L_1$  و  $L_2$  دو خط متمایز باشند که به‌ترتیب با بردارهای  $u_1 = (p_1, q_1, r_1)$  و  $u_2 = (p_2, q_2, r_2)$  موازی‌اند.

حالت اول:  $L_1$  و  $L_2$  موازی هستند.

$L_1$  و  $L_2$  موازی‌اند اگر و فقط اگر  $u_1$  و  $u_2$  موازی باشند. یعنی معادلاً  $\lambda \in \mathbb{R}$  موجود باشد که  $u_1 = \lambda u_2$  یا  $(p_1, q_1, r_1) = \lambda (p_2, q_2, r_2)$ . پس  $L_1$  و  $L_2$  موازی‌اند اگر و فقط اگر  $p_1 = \lambda p_2$ ،  $q_1 = \lambda q_2$  و  $r_1 = \lambda r_2$ .

مثال ۶. می‌خواهیم وضعیت نسبی دو خط  $L_1$  و  $L_2$  را که با معادلات

$L_1: \frac{x-1}{-2} = \frac{y+1}{1} = \frac{z-1}{2}$  و  $L_2: \frac{x}{1} = \frac{y}{-2} = \frac{z}{-1}$  داده شده‌اند بررسی کنیم. چون  $L_1$  و  $L_2$  به‌ترتیب با  $u_1 = (-2, 1, 2)$  و  $u_2 = (1, -\frac{1}{2}, -1)$  موازی‌اند و داریم  $-2 = -2(1)$ ،  $1 = -2(-\frac{1}{2})$  و  $-1 = -2(\frac{1}{2})$ ، پس  $L_1$  و  $L_2$  موازی خواهند بود.

حالت دوم:  $L_1$  و  $L_2$  متقاطع هستند.

$L_1$  و  $L_2$  متقاطع اند اگر یک نقطه مشترک داشته باشند که در این صورت این نقطه مشترک منحصر به فرد است (چرا؟).

مثال ۷. نشان می‌دهیم دو خط  $L_1$  و  $L_2$  به معادلات  $L_1: \frac{x-2}{2} = \frac{y+2}{1} = \frac{z-2}{-1}$  و

$L_2: \frac{x-1}{1} = \frac{y}{-2} = \frac{z}{2}$  (که موازی نمی‌باشند (چرا؟)) متقاطع اند و نقطه تقاطع آنها را پیدا می‌کنیم.

برای این منظور نقطه‌ای پیدا می‌کنیم که مختصات آن در معادلات هر دو خط صدق کند. معادلات پارامتری خط  $L_1$  به صورت زیر است

$$L_1: \begin{cases} x = 2 + 2t \\ y = -2 + t \\ z = 2 - t \end{cases}, \quad t \in \mathbb{R}.$$

اکنون می‌خواهیم ببینیم به ازای چه  $t$  ای نقطه‌ای از این خط روی خط  $L_2$  قرار دارد. اگر یکی از نقاط خط  $L_1$  روی خط  $L_2$  قرار بگیرد، باید مختصات آن نقطه از  $L_2$  در معادلات  $L_2$  صدق کند.

پس باید معادلات  $\frac{(2+2t)-1}{1} = \frac{-2+t}{-2} = \frac{2-t}{2}$  را حل کنیم. از این معادلات جواب  $t = 0$  به دست

می‌آید (چرا؟). پس  $L_1$  و  $L_2$  متقاطع هستند و به ازای  $t = 0$  نقطه تقاطع  $L_1$  و  $L_2$  یعنی  $P = (2, -2, 2)$  به دست می‌آید.

حالت سوم:  $L_1$  و  $L_2$  متنافر هستند.

اگر  $L_1$  و  $L_2$  نه موازی باشند و نه متقاطع، آنگاه  $L_1$  و  $L_2$  را متنافر می‌نامیم.

مثال ۸. وضعیت نسبی دو خط  $L_1$  و  $L_2$  به معادلات  $L_1: \frac{x+1}{2} = \frac{y}{-1} = \frac{z+2}{1}$  و

$L_2: \frac{x}{1} = \frac{y}{2} = \frac{z}{3}$  را بررسی می‌کنیم.  $L_1$  موازی بردار  $u_1 = (2, -1, 1)$  و  $L_2$  موازی بردار

$u_2 = (1, 2, 3)$  است. چون  $u_1$  و  $u_2$  موازی نمی‌باشند، پس  $L_1$  و  $L_2$  نیز موازی نمی‌باشند. وجود

نقطه مشترک را روی  $L_1$  و  $L_2$  تحقیق می‌کنیم. معادلات پارامتری  $L_2$  به صورت زیر است

$$L_2: \begin{cases} x = t \\ y = 2t \\ z = 3t \end{cases}, \quad t \in \mathbb{R}.$$

این مقادیر را در معادلات  $L_1$  جایگزین می‌کنیم

$$\frac{t \cdot 1}{2} = \frac{2t}{-1} = \frac{3t \cdot 2}{1}.$$

این معادلات جواب ندارند زیرا  $\frac{t \cdot 1}{2} = \frac{2t}{-1}$  به ازای  $t = \frac{-1}{5}$  برقرار است و

$\frac{2t}{-1} = \frac{3t \cdot 2}{1}$  به ازای  $t = \frac{-2}{5}$  پس  $L_1$  و  $L_2$  متقاطع نیز نمی‌باشند، یعنی  $L_1$  و  $L_2$  متنازقند.



۱. در هر یک از حالات زیر معادلات پارامتری و متقارن خطوطی را که یک نقطه از آنها داده شده است و امتداد آنها نیز موازی بردار مفروض  $u$  است پیدا کنید.

الف)  $(-2, 1, 0)$  ،  $u = (3, -1, 5)$

ب)  $(-1, 13, 2)$  ،  $u = (11, -13, -15)$

ج)  $(7, -1, 2)$  ،  $u = (-1, 1, 0)$

د)  $(-3, 6, 2)$  ،  $u = (1, -1, 0)$

۲. معادلات پارامتری خط گذرا از نقطه  $(3, -1, 2)$  و موازی خط زیر را پیدا کنید.

$$\frac{x-1}{4} = \frac{y \cdot 3}{2} = z.$$

۳. معادلات پارامتری خط گذرا از نقاط  $(-2, 5, 7)$  و  $(-1, 1, 0)$  را پیدا کنید.

۴. نشان دهید خط گذرا از نقاط  $(0, 0, 5)$  و  $(1, -1, 4)$  عمود بر خط زیر است.

$$\frac{x}{7} = \frac{y-3}{4} = \frac{z \cdot 9}{3}.$$

۵.  $a$  و  $b$  را طوری تعیین کنید تا نقطه  $(a, b, 1)$  روی خط


گذرا از نقطه  $(2, 5, 7)$  و  $(0, 3, 2)$  قرار گیرد.

۶.  $u$  را برداری می‌گیریم که موازی خط مفروض  $L$  است.

نشان دهید اگر  $a$  و  $b$  بردارهایی باشند که از مبدأ مختصات شروع

شوند و انتهای آنها روی  $L$  قرار گیرد، آنگاه

$$u \cdot a = u \cdot b.$$





۷. فاصلهٔ مبدأ مختصات را از خط گذرا از نقطهٔ  $(-3, -3, 3)$  و موازی بردار  $(4, -2, -4)$  پیدا کنید.

۸. فاصلهٔ دو خط موازی زیر را پیدا کنید.

$$\frac{x-1}{2} = \frac{y \cdot 1}{-1} = \frac{z-2}{-2} \quad \text{و} \quad \frac{x}{2} = \frac{y-2}{-1} = \frac{z-3}{-2}.$$

۹. فاصلهٔ نقطهٔ  $(5, 0, -4)$  را از خط زیر پیدا کنید.

$$x-1 = \frac{y \cdot 2}{-2} = \frac{z \cdot 1}{2}.$$

۱۰. فاصلهٔ نقطهٔ  $(2, 1, 0)$  را از خط زیر پیدا کنید.

$$x = -2, \quad y \cdot 1 = z.$$

۱۱. وضعیت نسبی خطوط ذکر شده در تمرین ۱ را به ترتیب زیر تعیین کنید.

(الف و ب)، (ب و ج)، (ج و د)

## ۲.۲ صفحه در فضا

یک صفحه مانند  $n$  با نقطهٔ معلومی چون  $P_0 = (x_0, y_0, z_0)$  در  $n = (a, b, c)$  بردار ناصفر عمود بر  $n$  به طور منحصر به فرد مشخص می‌شود. اکنون می‌خواهیم معادلهٔ صفحهٔ  $n$  را پیدا کنیم. برای این منظور فرض می‌کنیم  $P = (x, y, z)$  نقطه‌ای دلخواه باشد. در این صورت  $P$  روی صفحهٔ  $n$  است اگر و فقط اگر بردارهای  $n$  و  $P_0P$  بر هم عمود باشند (به شکل ۱ نگاه کنید) و این معادل است با این که ضرب داخلی  $n \cdot P_0P$  برابر صفر باشد. اما  $P_0P = (x - x_0, y - y_0, z - z_0)$  و در نتیجه

$$n \cdot P_0P = a(x - x_0) + b(y - y_0) + c(z - z_0)$$


بنابراین نقطهٔ  $P = (x, y, z)$  روی صفحهٔ  $n$  است اگر و فقط اگر

$$a(x - x_0) + b(y - y_0) + c(z - z_0) = 0$$

در نتیجه معادلهٔ صفحهٔ  $n$  که از نقطهٔ معلومی چون  $P_0 = (x_0, y_0, z_0)$  می‌گذرد و بردار ناصفر

$n = (a, b, c)$  عمود است عبارت است از

$$a(x - x_0) + b(y - y_0) + c(z - z_0) = 0.$$



شکل ۱

اگر معادله بالا را بسط دهیم و به جای  $ax$ ،  $by$ ،  $cz$  که عددی ثابت است،  $d$  قرار دهیم می‌توانیم معادله صفحه را به صورت زیر نیز بنویسیم


$$ax + by + cz = d.$$

**مثال ۱.** معادله صفحه گذرا از نقطه  $P_0 = (-2, 4, 5)$  و عمود بر بردار  $n = (7, 0, -6)$  با توجه به آنچه در بالا گفتیم عبارت است از  $0 = (5-z)(-6) + (y-4)(0) + (x-2)(7)$ ، یا

$$-44 = 7x - 6z.$$

**مثال ۲.** معادله صفحه گذرا از نقطه  $P_0 = (\frac{1}{4}, 0, 3)$  و عمود بر خط  $L$  با معادلات  $\frac{x-1}{4} = \frac{y-2}{-1} = \frac{z}{5}$  را پیدا می‌کنیم. توجه می‌کنیم که خط  $L$  با بردار  $(4, -1, 5)$  موازی است و لذا صفحه مطلوب بر بردار  $n = (4, -1, 5)$  عمود خواهد بود. در نتیجه معادله آن عبارت است از  $0 = (5-z)(5) + (y-0)(-1) + (x-\frac{1}{4})(4)$ ، یا  $17 = 4x - y - 5z$ .

**مثال ۳.** معادله صفحه گذرا از سه نقطه  $P_1 = (1, 0, 2)$ ،  $P_2 = (-1, 3, 4)$  و  $P_3 = (3, 5, 7)$  را پیدا می‌کنیم. توجه می‌کنیم که این صفحه شامل دو بردار  $P_1P_2$  و  $P_1P_3$  است (به شکل ۲ نگاه کنید). لذا برداری که بر این دو بردار عمود باشد بر این صفحه نیز عمود است و می‌تواند نقش  $n$  را بازی کند. اما برداری که بر این دو بردار عمود است را می‌توانیم ضرب خارجی این دو بردار در نظر بگیریم:



شکل ۲

$n = P_1P_2 \times P_1P_3$ . چون  $P_1P_2 = (-2, 3, 2)$  و  $P_1P_3 = (2, 5, 5)$  در نتیجه  $n = (5, 14, -16)$  یعنی این که معادله صفحه مطلوب عبارت است از  $0 = (2-z)(-16) + (y-0)(14) + (x-1)(5)$  یا

$$-27 = 5x + 14y - 16z.$$

## فاصله یک نقطه از یک صفحه

می‌خواهیم فاصله نقطه مفروض  $P$  را که خارج صفحه قرار دارد از آن پیدا کنیم.

قضیه زیر برای این منظور کارساز است.

**قضیه ۱.** فرض کنیم  $\Gamma$  صفحه‌ای باشد که بردار  $n$  عمود است و  $P$  را نقطه‌ای می‌گیریم که خارج (یا روی)  $\Gamma$  قرار دارد. در این صورت فاصله  $P$  از  $\Gamma$ ، یعنی  $D$ ، برابر است با

$$D = \frac{|\vec{n} \cdot \vec{P}|}{|\vec{n}|},$$

که در آن  $P$  نقطه دلخواهی روی  $\Gamma$  است.

**اثبات.** فرض کنیم  $\theta$  زاویه بین بردار  $n$  و بردار  $\vec{P}$  باشد، پس  $0 \leq \theta \leq \pi$ .

اگر  $0 < \theta < \frac{\pi}{2}$ ، آنگاه با توجه به شکل ۳ داریم  $\cos \theta = \frac{D}{|\vec{P}|}$  و لذا  $D = |\vec{P}| \cos \theta$ .

توجه می‌کنیم که اگر  $\theta = 0$  یا  $\theta = \frac{\pi}{2}$ ، مجدداً تساوی اخیر برقرار است.

اکنون فرض می‌کنیم  $\frac{\pi}{2} < \theta < \pi$  و با توجه به شکل ۴ به دست می‌آوریم  $\cos(\pi - \theta) = \frac{D}{|\vec{P}|}$


و در نتیجه  $D = |\vec{P}| \cos(\pi - \theta)$ . چون  $\cos(\pi - \theta) = -\cos \theta$ ، لذا در این حالت به دست

می‌آوریم  $D = |\vec{P}| (-\cos \theta)$ . اگر  $\theta = \pi$ ، نیز تساوی اخیر برقرار است.


پس برای  $0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}$  داریم  $D = |\vec{P}| \cos \theta$  و برای  $\frac{\pi}{2} < \theta \leq \pi$  داریم

$$D = |\vec{P}| (-\cos \theta)$$

$$D = |\vec{P}| |\cos \theta|.$$



شکل ۴



شکل ۳

اما با توجه به این که  $|n.P.P| = |n||P.P|\cos$  به دست می آوریم  $|n.P.P| = |n|D$  و لذا

$$D = \frac{|n.P.P|}{|n|}$$

مثال ۴. می خواهیم فاصله نقطه  $P = (0, 2, 1)$  را از صفحه  $\pi$  به معادله  $\sqrt{2}x + y + \sqrt{2}z = 0$  به دست آوریم. برای این منظور نقطه  $P_0 = (\sqrt{2}, -2, 0)$  را روی  $\pi$  در نظر می گیریم. بردار  $n = (1, 1, \sqrt{2})$  بر صفحه  $\pi$  عمود است و در نتیجه

$$D = \frac{|n.P.P|}{|n|} = \frac{|(1, 1, \sqrt{2}).(-\sqrt{2}, 4, 1)|}{|(1, 1, \sqrt{2})|} = \frac{4}{2} = 2.$$

### وضعیت نسبی دو صفحه در فضا

دو صفحه متمایز  $\pi_1$  به معادله  $a_1x + b_1y + c_1z = d_1$  و  $\pi_2$  به معادله  $a_2x + b_2y + c_2z = d_2$  را در نظر می گیریم. توجه می کنیم که  $\pi_1$  بردار  $n_1 = (a_1, b_1, c_1)$  و  $\pi_2$  بردار  $n_2 = (a_2, b_2, c_2)$  عمود است.  $\pi_1$  و  $\pi_2$  یا با هم موازی هستند و یا موازی نیستند که در این حالت  $\pi_1$  و  $\pi_2$  را متقاطع می نامیم.

حالت اول:  $\pi_1$  و  $\pi_2$  موازی هستند.


دو صفحه  $\pi_1$  و  $\pi_2$  موازی اند اگر و فقط اگر  $n_1$  و  $n_2$  موازی باشند. یعنی معادلاً  $r \in \mathbb{R}$  موجود باشد که  $n_1 = rn_2$ ، یا  $(a_1, b_1, c_1) = r(a_2, b_2, c_2)$ . پس  $\pi_1$  و  $\pi_2$  موازی اند اگر و فقط اگر  $a_1 = ra_2$ ،  $b_1 = rb_2$  و  $c_1 = rc_2$ .

مثال ۵. دو صفحه به معادلات  $3x + 4y + z = 8$  و  $2x + y + 6z = 1$  موازی اند.

حالت دوم:  $\pi_1$  و  $\pi_2$  متقاطع هستند.

اگر  $\pi_1$  و  $\pi_2$  در یک نقطه متقاطع باشند، در این صورت فصل مشترک  $\pi_1$  و  $\pi_2$  یک خط خواهد بود. واضح است که این خط با برداری که بر  $n_1$  و  $n_2$  عمود است موازی می باشد و لذا می توانیم فرض کنیم با ضرب خارجی  $n_2 \times n_1 = u$  موازی است. حال با داشتن یک نقطه که روی

این خط باشد، معادله آن به راحتی قابل محاسبه است (به شکل ۵ نگاه کنید).



شکل ۵

مثال ۶. فصل مشترک دو صفحه  $\pi$  به معادله  $z=1$  و  $3x-2y$  و  $\pi$  به معادله  $u = n_1 \cdot n_2$  را به دست می آوریم. این فصل مشترک خطی است که با بردار  $n_2 = (5, 4, -6)$  و  $n_1 = (3, -2, 1)$  موازی است که در آن  $u = (8, 23, 22)$  در نتیجه  $u = (8, 23, 22)$  حال کافی است نقطه ای روی این خط پیدا کنیم. چون نقطه  $(0, -1, -1)$  روی هر دو صفحه قرار دارد، پس روی خط فصل مشترک است و لذا معادلات خط فصل مشترک دو صفحه به صورت

$$\frac{x}{8} = \frac{y+1}{23} = \frac{z+1}{22} \text{ می باشد.}$$

## وضعیت نسبی یک خط و یک صفحه در فضا

$$x = x_0 + pt$$

خط  $L$  به معادلات  $x = x_0 + pt$ ،  $y = y_0 + qt$  و صفحه  $ax + by + cz = d$  را

$$z = z_0 + rt$$

در نظر می گیریم. توجه می کنیم که  $L$  با بردار  $(p, q, r)$  موازی است و  $(a, b, c)$  عمود  $L$  و  $L$  با هم موازی هستند که معادلاً در این حالت بردار عمود بر صفحه بر خط  $L$  نیز باید عمود باشد و این معادل است با این که  $(a, b, c) \cdot (p, q, r) = 0$  یا  $ap + bq + cr = 0$ ؛ و یا با هم موازی نیستند که در این صورت متقاطع اند.

مثال ۷. وضعیت نسبی خط  $L$  به معادلات  $\frac{x-1}{1} = \frac{y}{2} = \frac{z}{-1}$  و صفحه  $x + y - z = 2$  به معادله

$2x + y - z = 2$  را تعیین می کنیم. خط  $L$  با بردار  $(1, 2, -1)$  موازی است و صفحه  $x + y - z = 2$  عمود  $(2, 1, -1)$  چون  $(2, 1, -1) \cdot (1, 2, -1) = 5 \neq 0$ ، لذا  $L$  و  $x + y - z = 2$  موازی نمی باشند. اکنون نقطه

تقاطع  $L$  و . را پیدا می کنیم. معادلات پارامتری خط  $L$  به صورت زیر است

$$\begin{aligned} x &= 1 + t \\ y &= 2t, \quad t \in \mathbb{R}. \\ z &= -t \end{aligned}$$

اکنون می خواهیم ببینیم به ازای چه  $t$  ای نقطه ای از این خط روی صفحه قرار می گیرد. برای این منظور باید معادله  $t = 2$ ،  $t = 2$ ،  $t = 2$  را حل کنیم. اما این معادله به صورت  $5t = 0$  ساده می شود که تنها جواب آن  $t = 0$  است. یعنی به ازای  $t = 0$ ، نقطه  $(1, 0, 0)$  از صفحه روی خط  $L$  واقع می شود و این یعنی  $L$  و . متقاطع اند.



۱. در هر یک از حالات زیر معادله صفحه گذرا از نقطه  $P$  و عمود بر بردار  $n$  را پیدا کنید.

الف)  $P = (-1, 2, 4)$ ،  $n = (-4, 15, -\frac{1}{4})$

ب)  $P = (2, 0, -2)$ ،  $n = (2, 3, -4)$

ج)  $P = (9, 17, -17)$ ،  $n = (2, 0, -3)$

د)  $P = (2, 3, -5)$ ،  $n = (0, 1, 0)$

۲. معادله صفحه گذرا از سه نقطه  $(2, -1, 4)$ ،  $(5, 3, 5)$  و  $(2, 4, 3)$  را پیدا کنید.

۳. معادله صفحه گذرا از نقطه  $(1, -1, 2)$  و خط  $\frac{z-5}{4} = \frac{y}{2} = \frac{x-1}{3}$  را پیدا کنید.

۴. معادله صفحه گذرا از دو خط زیر را پیدا کنید.

$$\frac{x-1}{3} = \frac{y}{2} = \frac{z-5}{4}, \quad \frac{x}{3} = \frac{y-4}{2} = \frac{z}{4}.$$

۵. معادله فصل مشترک صفحه های  $x - z = 1$  و  $4z = 2 + 2x - 3y$  را پیدا کنید.

۶. معادله صفحه گذرا از نقطه  $(-9, 12, 14)$  و عمود بر دو صفحه تمرین ۵ را پیدا کنید.

۷. فاصله نقطه  $(3, -1, 4)$  را از صفحه  $2z = 5 + 2x - y$  پیدا کنید.

۸. فاصله مبدأ مختصات را از صفحه  $ax + by + cz = d$  پیدا کنید.

۹. آیا چهار نقطه  $(2, 3, 2)$ ،  $(-3, -1, 1)$ ،  $(-1, 0, 1)$  و  $(5, 9, 5)$  همگی روی یک صفحه

قرار دارند؟

۱۰. خط  $L: \frac{x-1}{2} = \frac{y-1}{3} = \frac{z-5}{7}$  و صفحه  $2(x-1) + 2(y-3) - z = 0$  : مفروض

است. دو نقطه روی  $L$  به فاصله ۳ از  $\cdot$  پیدا کنید.

۱۱. کدامیک از صفحه‌های زیر بر هم منطبق‌اند، یا با هم موازی‌اند، یا بر هم عمودند.

(الف)  $2y - 3z = 2$  ،  $x$  ،

(ب)  $15x - 9y - z = 2$  ،

(ج)  $4 = 0$  ،  $6z$  ،  $-2x - 4y$  ،

(د)  $0 = 1 - \frac{1}{3}z - 3y - 5x$  .

۱۲. در هر یک از موارد زیر وضعیت نسبی خط و صفحه داده شده را بررسی کنید.

(الف)  $\frac{x-3}{8} = \frac{y-4}{5} = \frac{z-3}{-1}$  ،  $5z = 12$  ،  $x - 3y$  ،

(ب)  $\frac{x}{8} = \frac{y-1}{23} = \frac{z-1}{22}$  ،  $5x$  ،  $4y - 6z = 2$  ،

(ج)  $\frac{x-1}{-4} = \frac{y-1}{5} = \frac{z}{7}$  ،  $x - 2y$  ،  $2z = 5$  .

۱۳. معادله صفحه گذرا از نقطه  $(-1, 2, 3)$  را در هر یک از حالات زیر پیدا کنید.

(الف) با صفحه  $xy$  موازی باشد،

(ب) بر محور  $x$  ها عمود باشد،

(ج) بر محور  $y$  ها عمود باشد.

۱۴. معادله صفحه گذرا از نقطه  $(2, \frac{1}{3}, \frac{1}{3})$  و عمود بر خط زیر را پیدا کنید.

$x = 2t$  ،  $3$  .

$y = 6t$  ،  $6$  ،  $t \in \mathbb{R}$  .

$z = 9t$

۱۵. معادله خط گذرا از نقطه  $(2, -1, 0)$  و عمود بر صفحه  $4z = 5$  ،  $2x - 3y$  را پیدا کنید.

۱۶. خط  $L$  با معادلات  $\frac{x-1}{2} = \frac{y-3}{3} = -z$  و صفحه  $3x - 2y$  ،  $4z = -1$  با معادله

مفروض است.

الف) نقطه  $P$ ، نقطه تقاطع  $L$  و . را پیدا کنید،  
 ب) معادله صفحه عمود بر  $L$  در نقطه  $P$  را پیدا کنید،  
 ج) معادله خط گذرا از  $P$  و عمود بر . را نیز پیدا کنید.  
 ۱۷. معادله صفحه عمود منصف پاره خط واصل بین دو نقطه  $(3, 1, 0)$  و  $(5, -1, 3)$  را پیدا کنید.

۱۸. نقاط فصل مشترک دو به دوی هر دسته از صفحه‌های زیر را پیدا کنید. آیا هر دسته از صفحه‌های زیر یکدیگر را در یک نقطه قطع می‌کنند؟

الف)  $x \cdot z = 3$ ،  $y \cdot z = 2$ ،  $x \cdot y = 1$ ،


ب)  $x - y - z = 0$ ،  $-x \cdot 2y - z = 3$ ،  $x \cdot y - z = 2$ .

۱۹. برای دو خط متناظر  $L_1$  با معادلات  $\frac{x \cdot 1}{2} = \frac{y}{-1} = \frac{z \cdot 2}{1}$  و  $L_2$  با معادلات  $\frac{x}{1} = \frac{y}{2} = \frac{z}{3}$

کوتاهترین فاصله بین دو خط (طول عمود مشترک) را پیدا کنید.

(راهنمایی: طول مورد نظر، طول پاره خطی است که محصور بین دو خط داده شده است و بر

هر دو عمود است) (به شکل ۶ نگاه کنید). راستای این عمود مشترک در راستای  $u_1$  و  $u_2$  قرار دارد که  $u_1$  و  $u_2$  به ترتیب دو بردار موازی با  $L_1$  و  $L_2$  هستند. حال صفحه‌های ۱ و ۲ که راستای عمود بر هر دوی آنها  $u_1$  و  $u_2$  است را در نظر می‌گیریم. فاصله این دو صفحه، فاصله مطلوب است.)



شکل ۶



## خواجه نصیرالدین طوسی



خواجه نصیر طوسی

ابوجعفر محمد بن حسن معروف به  
خواجه نصیر طوسی

در سال ۵۹۷ قمری / ۵۷۹ شمسی /  
۱۱۹۰ میلادی در طوس متولد شد.

در سال ۶۷۲ قمری / ۶۵۲ شمسی /  
۱۲۷۳ میلادی در کاظمین درگذشت.

منجم، سیاستمدار و ریاضیدان  
کارهای ریاضی او عبارتند از:

۱. نگارش کتاب کشف القناع در اسرار شکل القطاع درباره‌ی مثلثات مسطح و  
کروی و تعیین شکل قطاع کروی و مقاطع مخروطی
۲. نگارش کتاب جامع الحساب درباره‌ی نظریه‌ی اعداد و تلفیق حساب و هندسه

### منابع

۱. تاریخ علم جرج سارتن، جلد ۱ صفحات ۴۱۷ تا ۴۲۵
۲. اطلس ریاضی صفحه‌ی ۵۸۲
۳. زندگینامه‌ی ریاضیدانان دوره‌ی اسلامی ابوالقاسم قربانی، صفحه‌ی ۴۸۶
۴. زندگینامه‌ی علمی دانشوران جلد ۳ صفحات ۵۰۸ تا ۵۱۴
۵. لغت‌نامه‌ی دهخدا تحت نام نصیرالدین طوسی