

واحد کار: تولید و پرورش آرتیشو شماره شناسایی: ۵۱ – ۲۱۰۲۱۰۲۱	پیمانه مهارتی: تولید و پرورش سبزیجاتی که از گل و اجزای آنها استفاده می‌شود. شماره شناسایی: ۵ – ۲۱۰۲۱۰۲۱	مهارت: تولید و پرورش سبزی شماره شناسایی: ۲۱۰۲۱۰۲۱
--	--	--

واحد کار اول:

تولید و پرورش آرتیشو

واحد کار: تولید و پرورش سبزیشو شماره شناسایی: ۵۱_۲۱۰۲۱۰۲۱۳۱	پیمانه مهارتی: تولید و پرورش سبزیجاتی که از گل و اجزای آنها استفاده می‌شود. شماره شناسایی: ۵_۲۱۰۲۱۰۲۱۳۱	مهارت: تولید و پرورش سبزی شماره شناسایی: ۲۱۰۲۱۰۲۱۳۱
--	--	--



شکل ۱-۵

مقدمة

فکر می کنید سبزیهایی را که در شکل (۱-۵) می بینید جزو

کدام دسته از سبزیجات هستند؟

به نظر شما سبزیهایی را که در سفره و با غذا به عنوان سبزی

خوردن می خورید جزو کدام دسته از سبزیجات‌اند؟

آیا فکر کرده اید که لبو یا هویج و شلغم پخته‌ای که در

زمستان میل می‌کنید ممکن است جزو سبزیجات باشند؟

تا به حال سبزی‌ای که گلش مصرف خوراکی دارد

خوردہ ایڈ؟

۱- آرتيشو و انواع آن

۱-۱-۱- اصل و منشأ و ارزش غذایی:

— منشأ و موطن اصلی آریشو، جنوب اروپا و سیاری از نقاط آسیاست. از زمانهای بسیار قدیم مخصوصاً رومیها و یونانیها آن را بخوبی می‌شناسخته و گل آن را مصرف می‌کرده‌اند.

- ارزش غذایی آن به دلیل دارا بودن ویتامینهای A و B و
مقدار کمی C و D و نیز املاح معدنی مانند ترکیبات گوگردی،
منگنز و فسفر، زیاد است.

۱-۱-۲- مشخصات گیاه‌شناسی (بتانیک) :

- آرتیشو^۱ گیاهی است از خانواده کلایر کهای

— ریشه: ریشه آن دائم است.

واحد کار: تولید و پرورش آرتیشو شماره شناسایی: ۵۱ - ۲۱۰۲۱۰۲۱۳۱	پیمانه مهارتی: تولید و پرورش سبزیجاتی که از گل و اجزای آنها استفاده می‌شود. شماره شناسایی: ۵ - ۲۱۰۲۱۰۲۱۳۱	مهارت: تولید و پرورش سبزی شماره شناسایی: ۲۱۰۲۱۰۲۱۳۱
--	--	--

— ساقه: ساقه‌های هوایی آن قوی، بلند و علفی است که در انتهای منشعب شده، بر روی ساقه‌های زیرزمینی (ریزوم) ظاهر می‌شود (شکل ۵-۳).



شکل ۵-۳

در انتهای هر انشعاب شاخه گل آذینی قرار گرفته است (شکل ۵-۴).



شکل ۵-۴

— برگها: برگها تعدادی طوفه‌ای و بلند و تعدادی کوچک هستند و روی ساقه گل دهنده وجود دارند.

— گل: گلهای آرتیشو مانند سایر گیاهان این خانواده، از یک دم گل که به طبقی گوشتشی منتهی می‌شود تشکیل شده، در

<p>و احد کار: تولید و پرورش آرتیشو</p> <p>پیمانه مهارتی: تولید و پرورش سبزیجاتی که از گل و اجزای آنها استفاده می‌شود.</p> <p>شماره شناسایی: ۵۱۰۲۱۰۲۱۳۱</p>	<p>مهارت: تولید و پرورش سبزی</p> <p>شماره شناسایی: ۲۱۳۱۰۲۱۰۲۱۳۱</p>
--	---



شکل ۵

روی آن گلبرگها و یا فلسها (براکته‌ها یا برگچه‌ها) به رنگ‌های بنفش ارغوانی و قرمز دیده می‌شوند و تنها قسمت خوراکی آن می‌باشدند. (شکل ۵-۵).



شکل ۶

۱-۱-۳- ارقام آرتیشو: ارقامی از آرتیشو که کشت و کار آنها در باغبانی و سبزیکاری متداول است عبارت‌اند از:
الف - آرتیشو بنفس زودرس (شکل ۶).



شکل ۷

ب - آرتیشو درشت سبز (آرتیشو پاریس) (شکل ۷).

واحد کار: تولید و پرورش آرتیشو شماره شناسایی: ۵۱ - ۲۱۰۲۱۰۲۱۳۱	پیمانه مهارتی: تولید و پرورش سبزیجاتی که از گل و اجزای آنها استفاده می‌شود. شماره شناسایی: ۵ - ۲۱۰۲۱۰۲۱۳۱	مهارت: تولید و پرورش سبزی شماره شناسایی: ۲۱۰۲۱۰۲۱۳۱
--	--	--

۲-۱- شرایط رویشی ویژه

۲-۱- آب و هوای:

- ریشه آرتیشو نسبت به سرما مقاوم و قسمت هوایی آن در برابر سرما، حساس است.

- پس، آن را در مناطقی با آب و هوای معتدل و مرطوب و نیمه گرسنگی می‌توانید براحتی بکارید. به شرط آنکه تابستان طولانی برای گل دادن داشته باشند.

آزمایش:

دو بوته آرتیشو را در آخر پاییز یکی را با پلاستیک پوشانید و دیگری را به حالت آزاد رها کنید و نتیجه را در پایان زمستان از نظر تأثیر سرما، با یکدیگر مقایسه و نتیجه را به مربی مربوطه گزارش نمایید.

۲-۲- خاک:

- آرتیشو را می‌توانید در زمینهای حاصلخیز و عمیق که دارای موادآلی (هوموس) زیاد باشد کشت نمایید.

- اگر این سبزی را در خاکهای باغچه یا سیاه خاک (چرنوزیوم) بکارید بهتر رشد نموده، محصول بیشتری می‌دهد.

آزمایش:

در سه گلدان حاوی خاک باغچه، خاک سبک (رس $\frac{1}{4}$ + ماسه $\frac{3}{4}$) و خاک سنگین (رس $\frac{3}{4}$ + ماسه $\frac{1}{4}$) سه بوته آرتیشو بکارید و در حالی که سایر شرایط زیستی برای هرسه گلدان یکسان است پس از یک ماه، آنها را از نظر سرعت رشد و نمو مقایسه نموده، گزارش دهید.

۳-۱- رطوبت: هرچه رطوبت هوا و خاک بهتر و مناسب‌تر باشد رشد آرتیشو بهتر صورت گرفته، گل بیشتری تولید می‌کند و در نتیجه، عملکرد بیشتری خواهد داشت.

واحد کار: تولید و پرورش آرتیشو شماره شناسایی: ۵۱ - ۲۱۰۲۱۰۲۱۳۱	پیمانه مهارتی: تولید و پرورش سبزیجاتی که از گل و اجزای آنها استفاده می‌شود. شماره شناسایی: ۵ - ۲۱۰۲۱۰۲۱۳۱	مهارت: تولید و پرورش سبزی شماره شناسایی: ۲۱۰۲۱۰۲۱۳۱
--	--	--

آزمایش:

دو گلدان حاوی آرتیشو، یکی را با پوشش پلاستیک (رطوبت زیاد) و دیگری را بدون پوشش پلاستیک (رطوبت کم) در حالی که سایر شرایط زیستی برای آنها یکسان باشد، پس از دو هفته از نظر رشد و تولید گل باهم مقایسه کرده، نتیجه را گزارش نمایید.

۱-۳-۱- زمان کاشت بذر در خزانه:

- بذر آرتیشو دارای رنگ خاکستری با نقوش و یا خطوط قهوه‌ای پُرنگ است و هزار دانه آن ۴۷ گرم وزن دارد.
- ۵ سال قوه نامیه خود را حفظ نموده، زمانی که دمای خاک به 20°C (درجه سانتی‌گراد) برسد چهارده روز پس از کاشت سبز می‌شود.

۱-۳-۱- مقدار بذر مصرفی و فواصل کاشت:

کار عملی ۲: در بهار پس از رفع خطر یخندان بهاره در خزانه‌ای که قبلاً آماده نموده‌اید به ازای هر یکصد متر مربع زمین خزانه، ۱۲ تا ۱۵ گرم بذر را به طور خطی و با فواصل خطوط ۲۰ تا ۲۵ سانتی‌متر و فاصله بوته‌ها از یکدیگر ۵ سانتی‌متر و در عمق ۳ تا ۵ سانتی‌متری بکارید.

۱-۳-۱- ویژگیهای خاص کاشت

۱-۱- روشهای تکثیر آرتیشو: آرتیشو را می‌توانید به وسیله بذر (روش جنسی) و جدا کردن پاجوش از پایه مادری (روش غیرجنسی) تکثیر نمایید.

۲-۱- تهیه زمین خزانه: زمین خزانه‌ای را که می‌خواهید بذر آرتیشو را در بهار در آن بکارید، به این ترتیب تهیه نمایید :

کار عملی ۱: در پاییز سال قبل از کاشت بذر، زمین خزانه را سخن عمیق بزنید.

به مقدار 40 تن در هکتار کود دامی پوسیده در زمین پخش کنید و آن را با کولتیواتور با خاک مخلوط نمایید.

آزمایش:

در دو قطعه زمین مشابه، به مساحت یکصد متر مربع، به ترتیب مقدار 20 گرم و 10 گرم بذر را به طور یکنواخت و با یک روش، کشت نمایید.

پس از سبزشدن و رشد بوته‌ها مشاهده می‌کنید که در قطعه اول بوته‌ها بلند، با ساقه نازک و کمی زرد نگ هستند و در قطعه دوم، بوته‌ها دارای ارتفاع کمتر و برگ‌هایی سبزترند. چرا؟ علت را تحقیق کنید و نتیجه را طی گزارش کتبی به مرتبه تحولی نمایید.

۱-۳-۱- تهیه زمین اصلی: آرتیشو گیاهی است

بسیار پُرپوش و موادغذایی و املاح زمین را بشدت کاهش می‌دهد و به اصطلاح زمین را فقیر می‌کند. بنابراین نشاهای آن را باید در

زمین قوی که قبلاً با دادن کود دامی و شیمیایی تقویت نموده‌اید و به صورت جوی و پسته‌هایی به عرض $1/5$ متر درآورده‌اید، بکارید.

واحد کار: تولید و پرورش آرتیشو شماره شناسایی: ۵۱ - ۲۱۰۲۱۰۲۱	پیمانه مهارتی: تولید و پرورش سبزیجاتی که از گل و اجزای آنها استفاده می‌شود. شماره شناسایی: ۵ - ۲۱۰۲۱۰۲۱	مهارت: تولید و پرورش سبزی شماره شناسایی: ۲۱۰۲۱۰۲۱
--	--	--

محل پایه گیاه بیرون زده‌اند می‌بینید.
 – پای بوته را کنده پاجوشهای قوی آن را با مقداری ریشه برای کاشت در محل دیگر از پایه مادری جدا کنید
 (شکل ۵-۸).



شکل ۵-۸

– می‌توانید طوفه قدیمی و چندساله آرتیشو را به نحوی تقسیم کنید که هر قسمت دارای یک پاجوش با مقداری از ریشه پایه مادری باشد. شکل ۵-۹ قسمتی از طوفه را که بخوبی تقسیم شده است نشان می‌دهد.



شکل ۵-۹

کار عملی ۳: کود دامی پوسیده چهل تن در هکتار و از کودهای شیمیایی در هر هکتار ۵۰ کیلوگرم سوپر فسفات به اضافه ۲۰ کیلوگرم سولفات دو پتاس را در پاییز با شخمی عمیق با خاک مخلوط نمایید.

۶-۱-۳-۱- انتقال نشاء به زمین اصلی:

– نشاء را به این ترتیب به زمین اصلی منتقل کنید:

کار عملی ۴: زمین اصلی را طبق دستورالعمل (۱-۳-۵) آماده نمایید.

– زمین خزانه را آبیاری نموده، پس از گاورو شدن نشاءای چهاربرگی را با حداقل وارد آمدن صدمه به ریشه آنها، با شفره از خزانه خارج نمایید.

– نشاء را پس از خروج از زمین، در دستجات ۵ تابی و ۱۰ تابی با ناخ بیندید. سپس آنها را در جعبه‌هایی بگذارید و به منظور جلوگیری از پلاسیدگی نشاءای، گونیهای مرطوبی روی آنها پهن نموده، در محل سایه قرار دهید تا یکجا به زمین اصلی منتقل گردد.

۷-۱-۳-۱- نشاکاری:

– نشاء را در محل داغاب جوی و پشتله‌هایی به عرض ۱/۵ متر و با فواصل یک متر از یکدیگر و به عمق ۲۰ سانتی‌متر نشاکاری کنید.

– همانطور که می‌دانید بهترین زمان نشاکاری صبح زود یا عصر می‌باشد که هوا خنک است تا از پلاسیدگی و یا احیاناً خشک شدن نشاءای جلوگیری به عمل آید.

– همین‌طور نباید تمام نشاءای را یکجا به محل کاشت نشا منتقل کنید. چرا؟

۸-۱-۳-۱- از دیاد آرتیشو به وسیله پاجوش:

– برای این کار بترتیب زیر عمل کنید:

کار عملی ۵: در بهار پس از رفع یخنдан، خاک اطراف بوتهای را کنار بزنید.

– پاجوشهای را که پس از خشکیدن ساقه گل دهنده از

واحد کار: تولید و پرورش آرتیشو شماره شناسایی: ۵۱ – ۲۱۰۲۱۰۲۱۳۱	پیمانه مهارتی: تولید و پرورش سبزیجاتی که از گل و اجزای آنها استفاده می‌شود. شماره شناسایی: ۵ – ۲۱۰۲۱۰۲۱۰۲۱۳۱	مهارت: تولید و پرورش سبزی شماره شناسایی: ۲۱۰۲۱۰۲۱۰۲۱۳۱
--	---	---

– در فصل پاییز، مقدار سی تن کود دامی پوسیده در هر هکتار زمین پخش نموده، شخم بزند.

– اوایل بهار، زمین را به صورت جوی و پشتۀ هایی به عرض ۱/۵ متر آماده نماید. پاجوش هایی را که طول آنها ۲۵ تا ۳۰ سانتی متر است و از پایه های قوی و مُسن مادری جدا نموده اید، به فواصل یک متر از هم نشا کنید.

۴-۱- مراقبتهای داشت

۱-۴- وجین:

کار عملی ۱: زمانی که بوته ها ۶ تا ۶ برگه شدند زمین را آبیاری کنید و پس از گاوره شدن اقدام به وجین علفهای هرز نمایید.

می دانید که معمولاً پس از هر بار وجین، محصول را باید آبیاری نمایید. چرا؟

۲-۱- سله شکنی: اگر آرتیشو را در خاک سنگین یا اراضی فقیر از مواد آلی کشت نموده باشید، سطح خاک بعد از هر آبیاری یا بارندگی سفت شده، شکاف بر می دارد (سله می بندد).

کار عملی ۲: با وسایل دستی مانند فوکا و غیره و یا ادوای ماشینی مناسب، اقدام به شکستن سله نمایید (شکل ۵-۱).



شکل ۵-۱

۳-۱- کود سرک:

کار عملی ۳: در بهار، پس از آنکه برای جداسازی پاجوشها از پایه مادری خاک پای بوته ها را کنار زدید و پاجوشها را جدا نمودید، قبل از این که پای بوته را با خاک پُر کنید مقدار ۲۴۰ تا ۳۲۰ کیلوگرم از کودهای ازته (سولفات آمونیم، نیترات سدیم) برای هر هکتار مصرف کنید.

واحد کار: تولید و پرورش آرتیشو شماره شناسایی: ۵۱ - ۲۱۰۲۱ - ۲۱۳۱	پیمانه مهارتی: تولید و پرورش سبزیجاتی که از گل و اجزای آنها استفاده می‌شود. شماره شناسایی: ۵ - ۲۱۰۲۱ - ۲۱۳۱	مهارت: تولید و پرورش سبزی شماره شناسایی: ۲۱۰۲۱ - ۲۱۳۱
--	--	--

می‌کند و در اوایل سال دوم می‌توانید بهره‌برداری را شروع نمایید و تا سه سال بهره‌برداری را ادامه داده، سپس کلیه بوته‌ها را کنده، در قطعه‌دیگر اقدام به احداث مزرعه آرتیشو نمایید.

- علامت رسیده بودن محصول، زمانی است که برآکته‌ها بسته‌اند و گلهای لوله‌ای از گل آذین خارج نشده‌اند.
- زمان برداشت آرتیشو بستگی به آب و هوای منطقه دارد.
- در مناطق سردسیر می‌توانید از اواسط تابستان اقدام به برداشت نمایید.
- در مناطق معتدل، از اوایل پاییز اقدام به برداشت نمایید. این کار را تا اوایل بهار، قبل از اینکه برآکته‌های آن سخت و باز شوند می‌توانید ادامه دهید.

۲-۱-۵- نحوه برداشت:

کار عملی ۱: هنگام برداشت آرتیشو باید سعی کنید همیشه حدود ۵ تا ۱۰ سانتی‌متر از ساقه را همراه با گل قطع نمایید (شکل ۱۱-۵).

۴-۱- آبیاری:

- تعداد دفعات آبیاری آرتیشو را با توجه به عوامل مختلف مانند درجه حرارت محیط، درصد رطوبت هوا و نوع بافت خاک و ... تنظیم کنید.
- به طور معمول، آبیاری آرتیشو را ۳ تا ۵ روز یکبار انجام دهید.

۴-۱-۵- واکاری:

کار عملی ۴: چنانچه نشاہابی که در زمین اصلی کاشته‌اید پس از ۱۵ روز به رشد خود ادامه ندادند و پلاسیده شدند، زمین را آبیاری نموده، مجدداً به جای بوته‌های خشک شده، نشاکاری نمایید.

۵-۱- برداشت

۱-۵-۱- زمان برداشت:

- در سال اول کاشت، بوته قوی شده، به قدر کافی رشد



شکل ۱۱-۵

واحد کار: تولید و پرورش آرتیشو شماره شناسایی: ۵۱ – ۲۱۰۲۱۰۲۱۳۱	پیمانه مهارتی: تولید و پرورش سبزیجاتی که از گل و اجزای آنها استفاده می‌شود. شماره شناسایی: ۵ – ۲۱۰۲۱۰۲۱۳۱	مهارت: تولید و پرورش سبزی شماره شناسایی: ۲۱۰۲۱۰۲۱۳۱
--	--	--



شکل ۵-۱۲

– معمولاً محصول را با آلت برندهٔ تیزی (کارد و یا قیچی باغبانی) می‌توانید برداشت نمایید.

۳-۵-۱ – درجه‌بندی: ساقه اصلی آرتیشو، بزرگترین گل را تولید می‌کند. درستی گلهایی که روی ساقه‌های فرعی قرار گرفته‌اند بسته به درجهٔ انشعاب ساقه‌های فرعی متفاوت می‌باشد. بدین معنی که هرچه انشعاب شاخه‌های فرعی از شاخه اصلی دورتر باشد گلهای کوچکتر خواهد بود (شکل ۵-۱۲).

بر این اساس می‌توانید سه نوع محصول از آرتیشو درجه‌بندی کنید که معمولاً محصول یک بوته دارای ۱۰٪ گل درشت و ۲۵٪ گل متوسط و ۶۵٪ گل ریز می‌باشد.

۴-۱-۵ – بسته‌بندی:
کار عملی ۲: جوانه‌هایی را که رسیده‌اند و همراه با ۵ تا ۱۰ سانتی‌متر از ساقه چیده‌اید از نظر اندازه و کیفیت درجه‌بندی کنید و در جعبه‌هایی با لایهٔ کاغذی که ۴۸ تا ۱۲۵ جوانه را در خود جای می‌دهند بسته‌بندی کنید.
 معمولاً برای بازارهای محلی از صندوقهای چوبی استفاده می‌کنند.

۵-۱-۵ – عملکرد: در صورتی که عملیات کاشت را در محل و زمان مناسب، و عملیات داشت را به موقع و به نحو مطلوب انجام داده باشید در شرایط زیستی و محیطی مناسب به طور متوسط ۷/۵ تن در هکتار محصول برداشت خواهد نمود.

<p>واحد کار: تولید و پرورش کلم گل</p> <p>پیمانه مهارتی: تولید و پرورش سبزیجاتی که از گل و اجزای آنها استفاده می‌شود.</p> <p>شماره شناسایی: ۵۲ – ۰۱۳۱۰۲۱۰</p>	<p>مهارت: تولید و پرورش سبزی</p> <p>شماره شناسایی: ۰۲۱۰۰۱۳۱۰۲۱۰</p>
--	---

واحد کار دوم:

تولید و پرورش کلم گل

واحد کار: تولید و پرورش کلم گل شماره شناسایی: ۵۲ – ۰۱۳۱۰۲۱	پیمانه مهارتی: تولید و پرورش سبزیجاتی که از گل و اجزای آنها استفاده می‌شود. شماره شناسایی: ۵ – ۰۱۳۱۰۲۱	مهارت: تولید و پرورش سبزی شماره شناسایی: ۰۱۳۱۰۲۱
---	---	---



شكل ۱۳

۱-۲- کلم گل و انواع آن

۱-۱- اصل و قدمت: اصل این گیاه را از نواحی غربی اروپا می‌دانند. تصور می‌شود که بشر از چندین قرن پیش آن را مورد استفاده قرار داده باشد.

۱-۲- اهمیت: کلم گل، یکی از پُر ارزش‌ترین محصولات کشاورزی است که در اکثر کشورهای جهان به همراه بسیاری از غذاها به صورت خام، پخته و بویژه سرخ کرده به مصرف تغذیه می‌رسد. بدون تردید سطح کاشت و میزان مصرف آن اگر از کلم پیچ پیشتر نباشد، کمتر نیست. در کشور ما نیز، در حدود ۴۵ سال اخیر سطح کاشت و مصرف این کلم گسترش روزافزون یافته و امروزه کلم گل یکی از فرآوردهای مهم و با ارزش و پردرآمد ما را بویژه در اطراف شهرهای بزرگ تشکیل می‌دهد. اطلاق نام گل کلم به آن اشتباه است و صحیح آن کلم گل می‌باشد (شکل ۱۳).

۳-۱- مشخصات گیاه‌شناسی (باتنیکی):

- گیاهی یکساله از راسته دولپه‌ایها و خانواده چلیپایان (کلمها) و از جنس براسیکا و گونه براسیک اوولراسه و واریته براسیکا اوولراسه واریته بوتری تیس^۱ است.

- ریشه: نسبتاً عمیق و دارای ریشه‌های فرعی و سطحی زیاد است.

- ساقه: بسیار کوتاه که در میان برگ‌های پهن منتهی به خوش، گل وجود دارد.

- برگ‌ها: مسطح، موجدار، کمی گوشتی، به رنگ سبز مایل به آبی هستند.

- گلهای چون قسمت خوراکی آن مجموع دمگل و غنچه نشکفته آن است هرگز اجازه ندهید که گل آن به مرحله شکفتی برسد و قبل از باز شدن آن، محصول کلم را برداشت کنید. فقط زمانی که می‌خواهید بذرگیری نمایید محصول آن را در روی زمین باقی بگذارید تا گیاه به رشد نهایی خود رسیده، گل آن باز و

۱- Brassica oleracea Var. botrytis

واحد کار: تولید و پرورش کلم گل شماره شناسایی: ۵۲ – ۲۱۰۲۱۰۲۱۳۱	پیمانه مهارتی: تولید و پرورش سبزیجاتی که از گل و اجزای آنها استفاده می‌شود. شماره شناسایی: ۵ – ۲۱۰۲۱۰۲۱۳۱	مهارت: تولید و پرورش سبزی شماره شناسایی: ۲۱۰۲۱۰۲۱۳۱
--	--	--

تلقیح شود و تولید میوه و دانه نماید.

– دانه: کوچک است و هزار دانه آن، سه گرم وزن دارد.

– پرورش کلم گل تا حدی مشکل است و همیشه با موفقیت

هراه نیست.

۱-۲- انواع کلم گل:

– کلم گل آقای سفید شماره ۱۸^۱: نژادی بسیار زودرس است و گل آذین آن سفید، گرد، متراکم، گوشتی و خوش فرم و با کیفیت خوب و عالی خوراکی است. خوشمزه، خوش طعم برای مصرف خام، سالاد، سرخ کرده، پخته، سور و غیره می‌باشد. ۴۵ روز پس از بازکاشت می‌توانید برداشت کنید (شکل ۱۴-۵).



شکل ۱۴-۵

– کلم گل سرسفید^۲: برای محصول پاییز کاشته می‌شود. این کلم گل آذینهای درجه یک با کیفیت عالی تولید می‌کند. گل آذین آن فوق العاده سفید و تمیز، سفت، سنگین و توپر و فشرده و بازار پسند می‌باشد. گیاه آن قوی، مقاوم و زودرشد است (شکل ۱۵-۵).



شکل ۱۵-۵

واحد کار: تولید و پرورش کلم گل شماره شناسایی: ۵۲ – ۰۱۳۱۰۲۱	پیمانه مهارتی: تولید و پرورش سبزیجاتی که از گل و اجزای آنها استفاده می‌شود. شماره شناسایی: ۵ – ۰۱۳۱۰۲۱	مهارت: تولید و پرورش سبزی شماره شناسایی: ۰۱۳۱۰۲۱
---	---	---

— کلم گل مونتانا^۱: هیبرید زودرس است و سر بسیار سختی دارد (شکل ۵-۱۶).



شکل ۵-۱۶

— کلم گل لینتاپ^۲: فوق العاده زودرس است و برای تولید محصول بهاره و اوایل تابستان مناسب است (شکل ۵-۱۷).



شکل ۵-۱۷

واحد کار: تولید و پرورش کلم گل شماره شناسایی: ۵۲ – ۲۱۰۲۱۰۲۱۳۱	پیمانه مهارتی: تولید و پرورش سبزیجاتی که از گل و اجزای آنها استفاده می‌شود. شماره شناسایی: ۵ – ۲۱۰۲۱۰۲۱۳۱	مهارت: تولید و پرورش سبزی شماره شناسایی: ۲۱۰۲۱۰۲۱۳۱
--	--	--



شکل ۱۸_۵

— کلم گل لیندی^۱: برای تولید محصول تابستانه و پاییزه مناسب است. سر آن بسیار سفید است (شکل ۱۸_۵).



شکل ۱۹_۵

— کلم گل کماندر^۲: همیرید نسبتاً دیررس و پیزه تولید محصول پاییزه و اوخر تابستان است (شکل ۱۹_۵).

<p>واحد کار: تولید و پرورش کلم گل</p> <p>پیمانه مهارتی: تولید و پرورش سبزیجاتی که از گل و اجزای آنها استفاده می‌شود.</p> <p>شماره شناسایی: ۵۲ – ۰۱۳۱۰۲۱</p>	<p>مهارت: تولید و پرورش سبزی</p> <p>شماره شناسایی: ۰۲۱۰۲۱۰۱۳۱۰۲</p>
---	---



— کلم گل توب سفید^۱: نیمه دیررس تا دیررس می‌باشد
(شکل ۵-۲).

شکل ۵-۲



— کلم گل وايتراک^۲: نیمه دیررس تا دیررس می‌باشد برای تولید محصول اواخر تابستان و پاییزه مناسب است (شکل ۵-۲۱).

شکل ۵-۲۱

واحد کار: تولید و پرورش کلم گل شماره شناسایی: ۵۲ – ۰۲۱۰۳۱۲	پیمانه مهارتی: تولید و پرورش سبزیجاتی که از گل و اجزای آنها استفاده می‌شود. شماره شناسایی: ۵ – ۰۲۱۰۳۱۲	مهارت: تولید و پرورش سبزی شماره شناسایی: ۰۲۱۰۳۱۲
---	---	---



شکل ۵-۲۲

– کلم گل لیندوریان^۱: هیبرید نیمه‌زودرس است و مناسب تولید محصول تابستانه و اوایل پاییز است (شکل ۵-۲۲).

۲-۲-۱- شرایط رویشی ویژه

۲-۲-۱- آب و هوا: توصیه می‌شود در مناطقی اقدام به کشت کنید که بتوانید آن را در زمستان در خارج از گلخانه پرورش دهید یعنی در مناطقی کشت کنید که در ماههای فروردین تا آذرماه در منطقهٔ یخنداز نباشد در چنین منطقه‌ای کلم گل بخوبی پرورش می‌یابد.

۲-۲-۲- خاک: در خاکهایی کشت کنید که بسیار حاصل خیز، مرطوب و دارای زهکش خوب باشد.
 – خاک مورد نیاز کلم گل، از حیث بافت شبیه خاک مورد نیاز کلم پیچ می‌باشد.

۲-۲-۳- نور: کلم گل را در مکانی آفتابی و روشن کشت کنید ولی از آنجا که تابش شدید آفتاب به آن لطمہ می‌زند بهتر است در مناطق خیلی گرم‌سیری آن را در نقاط سایه روش بکارید. هنگامی که سرها تشکیل شدند باید در مقابل تابش نور مستقیم آفتاب از سرها محافظت نمایید. در ارتفاع زودرس برگهای

واحد کار: تولید و پرورش کلم گل شماره شناسایی: ۵۲ – ۰۱۳۱۰۲۱	پیمانه مهارتی: تولید و پرورش سبزیجاتی که از گل و اجزای آنها استفاده می‌شود. شماره شناسایی: ۵ – ۰۱۳۱۰۲۱	مهارت: تولید و پرورش سبزی شماره شناسایی: ۰۱۳۱۰۲۱
---	---	---



شکل ۵-۲۳

طوبی خارجی را روی سر (گل) بیندید تا از آسیب خورشید در امان بمانند. در ارقام دیررس برگهای داخلی روی سر کلم برگشته، عمل محافظت در مقابل آفتاب را انجام می‌دهند (شکل ۵-۲۳).

۴-۲-۲- رطوبت: کلم گل را در نواحی نسبتاً مرطوب بکارید زیرا که گیاهی نسبتاً رطوبت‌پسند است.

۴-۲-۳- حرارت: باید زمانی کشت نمایید که در دوره سپری کردن رشد کامل، به هوای بسیار گرم برخورد نماید بهدلیل آن که کلم گل محصول فصل خشک است کشت را در فصول سرد سال انجام دهید.

۳-۲- ویژگیهای خاص کاشت

۱- ۲-۳- پخش کود دامی و شیمیایی در زمین

اصلی:

کار عملی ۱: کود دامی را به میزانی که برای کلم پیچ ذکر شد، در پاییز سال قبل از کاشت، با خاک مخلوط کنید.

- حدود ۲۰۰ کیلوگرم ازت در هر هکتار به زمین اضافه کنید.

- حدود ۱۰۰ تا ۱۲۰ کیلوگرم P_2O_5 در زمان تهیه زمین، به خاک اضافه کنید.

- میزان پتاسیم مورد نیاز این گیاه نسبتاً بالاست، از این‌رو، لازم است حدود ۲۰۰ تا ۳۰۰ کیلوگرم در هر هکتار به خاک

واحد کار: تولید و پرورش کلم گل شماره شناسایی: ۵۲ - ۰۱۳۱۰۲۱	پیمانه مهارتی: تولید و پرورش سبزیجاتی که از گل و اجزای آنها استفاده می‌شود. شماره شناسایی: ۵ - ۰۱۳۱۰۲۱	مهارت: تولید و پرورش سبزی شماره شناسایی: ۰۱۳۱۰۲۱
---	---	---

در اواخر شهریور و اوایل مهرماه به دست خواهد آورد.

۲-۳-۵ فواصل کاشت:

بودن رقم مورد کاشت، فاصله ردیفها را در محل اصلی ۷۵ تا ۹۰ سانتی متر و فاصله بوته ها را بر روی ردیفها حدود ۴۵ تا ۶۰ سانتی متر در نظر بگیرید.

۲-۳-۶ مقدار بذر مصرفی:

هکتار زمین، حدود ۲۰۰ تا ۴۰۰ گرم بذر را در خزانه کشت نمایید.

۲-۳-۷ انتقال نشا به زمین اصلی:

- زمانی که نهالها ۵ تا ۶ برگ شدند به محل اصلی منتقل کنید.

- چنانچه نشاهای کلم گل با دقت حمل و نقل نشود و دست به دست شود، و کاشت آن به تأخیر افتاد تاج کلم تشکیل نشده، چند تکمه کور، روی بوته ایجاد می‌گردد.

- نگذارید نشاها به مدت طولانی حتی چند ساعت هوا بخورد. بکوشید که عمل نشا را سریعتر انجام دهید تا موفقیت بیشتری داشته باشد.

۲-۳-۸ تشاکاری:

- به هنگام نشاکاری دقت نمایید که ساقه تا زیر دو برگ اول، در خاک فرو رود.

- خاک اطراف ریشه را فشار دهید تا به آن بچسبد.

- سپس بلا فاصله آب دهید تا هوای اطراف ریشه خارج گردد.

۲-۴ مراقبتهای داشت

۲-۴-۱ وجین و سله شکنی:

کار عملی ۱: به دلیل آن که سیستم ریشه کلم گل سطحی است از کولیتو اتورزنی عمیق خودداری کنید؛ مگر در حالتی که گیاهان بسیار کوچک هستند و خاک نیز بسیار سفت شده است.

- گیاهان بزرگ را فقط زمانی که علفهای هرز بزرگ هستند

اضافه کنید.

۲-۳-۲ تهیه زمین:

کار عملی ۲: در پاییز سال قبل از کاشت، زمین را شخم عمیق بزنید.

- در بهار قبل از انتقال نشا به محل اصلی، با دیسک سطح مزرعه را نرم نمایید.

- با بیل و یا وسایل مکانیکی، نهرها و پشتنهای را برای کاشت خطی آماده کنید.

۲-۳-۳ زمان کاشت:

- بذر آن را در نقاط معتدل، از اوایل اسفند تا اواخر اردیبهشت در گلخانه با هوای آزاد در خزانه بکارید.

- بذور را در عمق حدود یک سانتی متری بکارید.

- در نقاط گرسنگی در اواخر تابستان در خزانه کشت کنید.

۲-۳-۴ نحوه کاشت:

کار عملی ۳: پرورش کلم گل را بر حسب زمان کاشت به دو صورت می‌توانید انجام دهید: کاشت را اوایل بهار یا اوایل پاییز انجام دهید. چنانچه کاشت را در اوایل پاییز انجام می‌دهید از بذر انواع زودرس استفاده کنید تا محصول آن را در اواخر اسفند و اول بهار بروداشت نمایید. طرز عمل بدین ترتیب است که در اوایل شهریور بذر را در خزانه بکارید و آبیاری فراوان نمایید. بوتهای زودتر نمو کرده، بلند شوند و مهرماه بوتهای جوان را زیر سریوش یا در شاسی نشا کنید و گاهگاه به آنها هوا دهید. در موقع یخبندان دورشاسی و سریوشها را پهن خشک و کاه بربزید. در اواخر اسفند و اوایل فروردین، بوتهای را در محل اصلی به فواصل زیر بکارید و بلا فاصله آبیاری کنید. محصول این کشت را در ماههای اردیبهشت و خرداد بروداشت کنید. اگر کلم گل را تابستانه می‌کارید آب کافی به محصول بدهید در غیراین صورت، محصول بد و نامرغوب خواهد شد و غالباً گل نمی‌دهد و یا گل ریز و خراب می‌دهد. بذر را در اول فروردین در خزانه بکارید و بوتهای را پس از رشد کافی در مزرعه نشا و بلا فاصله آبیاری کنید و محصول را

واحد کار: تولید و پرورش کلم گل شماره شناسایی: ۵۲ – ۰۱۳۱۰۲۱	پیمانه مهارتی: تولید و پرورش سبزیجاتی که از گل و اجزای آنها استفاده می‌شود. شماره شناسایی: ۵ – ۰۱۳۱۰۲۱	مهارت: تولید و پرورش سبزی شماره شناسایی: ۰۱۳۱۰۲۱
---	---	---

کولیتواتور بزنید.

– هنگامی که کلم شروع به تشکیل سر نمود کولیتواتور زنی را متوقف کنید. کولیتواتور زنی را صبح زود انجام ندهید زیرا در این موقع گیاه آبدار و ترد است و برگها می‌شکند.

۲-۴-۲- خاکدهی پای بوته:

کار عملی ۲: در تابستان پای بوته‌ها را خاک دهید تا از کج شدن بوته به وسیله باد جلوگیری نماید.

۲-۴-۳- کود سرک:

کار عملی ۳: حدود سه هفته پس از کاشت، حدود ۲/۵ کیلوگرم نیترات دو سود در صدمتر مربع، به زمین اضافه کنید. سه هفته بعد مجدداً این عمل را تکرار نمایید.

۲-۴-۴- سفید کردن یا پوشاندن روی گل: چون در موقع پیدا شن گل، آفتاب باعث تیره و زرد شدن آن می‌شود باید گلها را از تابش مستقیم و نور شدید خورشید حفظ کنید.

– سفید کردن را با برگهای ضخیم بوته انجام دهید. بدین ترتیب که انتهای برگها را طوری بیندید که گل کلم بین برگها دور از تابش مستقیم آفتاب قرار گیرد (مطابق شکل ۵-۲۴).


– سفید کردن را بیش از ۱۵ تا ۲۰ روز ادامه ندهید. پس از این مدت، فوراً محصول را برداشت کنید.

– از آنجا که تمام بوته‌های کلم گل یک مرتبه و در یک روز برای سفید کردن حاضر نیستند بنابراین رنگ ریسمانی را که هر روز برای بستن برگها مورد استفاده قرار می‌دهید عوض کنید و تاریخ آنها را یادداشت کنید مثلاً در روز اول با ریسمان قرمز و روز دوم با ریسمان آبی و روز سوم ریسمان سفید و همچنین تا آخر.

– به هنگام برداشت باید ابتدا بوته‌هایی را که با ریسمان قرمز بسته‌اند برداشت نمایید سپس آبی و سپس سفید و غیره را.

– ضرورتی ندارد که کلمهای دیررس را سفید نمایید زیرا با برگشتن برگهای داخلی بر روی سر، عمل سفید کردن انجام می‌شود.

۲-۴-۵- آبیاری: در مدت پرورش کلم نگذارید خاک آن کاملاً خشک گردد. همیشه باید رطوبت نسبی در خاک وجود



شکل ۵-۲۴

واحد کار: تولید و پرورش کلم گل شماره شناسایی: ۵۲ - ۰۲۱۰ ۰۳۱۲	پیمانه مهارتی: تولید و پرورش سبزیجاتی که از گل و اجزای آنها استفاده می‌شود. شماره شناسایی: ۵ - ۰۲۱۰ ۰۳۱۲	مهارت: تولید و پرورش سبزی شماره شناسایی: ۰۲۱۰ ۰۲۱۰ ۰۳۱۲
---	---	--

آن طویل باشند.

۳-۵-۲- درجه‌بندی: سرهایی را که دارای اندازه

یکنواخت هستند در یک ظرف (جعبه) بسته‌بندی نمایید تا ظاهر بازارپسندی پیدا کند.

۴-۵- بسته‌بندی:

- کلم گل را در جعبه‌های چوبی یا پلاستیکی بسته‌بندی کنید (شکل ۵-۲۵).

- می‌توانید کلمها را در یک ردیف در جعبه قرار دهید یا آنکه ارتفاع جعبه را دو برابر نموده، دو ردیف کلم گل در هر جعبه جای دهید.

- به هر حال قبل از قرار دادن کلم گل در جعبه، برای حفاظت محصول نوک برگها را تا حد گلها قطع کنید و بقیه برگها را باقی بگذارید (شکل ۵-۲۶).



شکل ۵-۲۶

داشته باشد.

۶-۴- واکاری:

کار عملی ۴: چنانچه ۱۰ روز پس از نشاکاری، تعدادی از نشاها کاشته شده بهر دلیل به رشد خود ادامه نداده و پلاسیده و خشک گردیده‌اند، باید سریعاً نسبت به نشاکاری مجدد، اقدام نمایید.

۵- برداشت

۱-۵- زمان برداشت: بلا فاصله پس از رسیدن کلم به اندازه قابل عرضه به بازار و قبل از این که گل، رنگ یا حالت فشردگی خود را از دست بدهد، محصول را برداشت نمایید.

۲-۵- نحوه برداشت:

کار عملی ۱: سرهای قابل برداشت را به همراه سه یا چهار دور از برگها قطع نمایید و برگها را به نحوی بزنید که حلقه‌ای از برگها اطراف سر را احاطه کرده، اندازه کافی برای محافظت



شکل ۵-۲۵

واحد کار: تولید و پرورش کلم گل شماره شناسایی: ۵۲ - ۲۱۰۲۱۰۲۱۳۱	پیمانه مهارتی: تولید و پرورش سبزیجاتی که از گل و اجزای آنها استفاده می‌شود. شماره شناسایی: ۵ - ۲۱۰۲۱۰۲۱۰۲۱۳۱	مهارت: تولید و پرورش سبزی شماره شناسایی: ۲۱۰۲۱۰۲۱۰۲۱۳۱
--	---	---

۵-۵-۲- عملکرد: می‌توانید از هر هکتار حدود ۱۲ تا ۲۵ تن محصول برداشت کنید.
تقویم کاشت کلم گل بهاره

برداشت	خرداد
مراقبت	اردیبهشت
کاشت در محل اصلی	فروردین
مراقبت	اسفند
در	بهمن
شاسی	دی
	آذر
نشا در خزانه دوم زیرشاسی	آبان
کاشت بذر در خزانه	مهر

برداشت محصول	مرداد
	تیر
مراقبت در مزرعه	خرداد
	اردیبهشت
کاشت در محل اصلی	فروردین
مراقبت در شاسی	اسفند
نشا در خزانه دوم زیرشاسی	بهمن
مراقبت در شاسی	
کاشت بذر در شاسی	دی

تقویم کاشت کلم گل تابستانه

برداشت محصول	مهر
	شهریور
مراقبت در مزرعه	مرداد
	تیر
کاشت در محل اصلی	خرداد
مراقبت در خزانه	
کاشت بذر روی	اردیبهشت
کوش گرم	
	فروردین

<p>واحد کار: تولید و پرورش کلم بروکولی</p> <p>شماره شناسایی: ۵۳ – ۲۱۰۲۱۰۲۱۳۱</p>	<p>پیمانه مهارتی: تولید و پرورش سبزیجاتی که از گل و اجزای آنها استفاده می‌شود.</p> <p>شماره شناسایی: ۵ – ۲۱۰۲۱۰۲۱۳۱</p>	<p>مهارت: تولید و پرورش سبزی</p> <p>شماره شناسایی: ۲۱۰۲۱۰۲۱۳۱</p>
--	---	---


واحد کار سوم:

تولید و پرورش کلم بروکولی (بروکلی)

واحد کار: تولید و پرورش کلم بروکولی شماره شناسایی: ۵۳—۰۲۱۰۲۱۳۱	پیمانه مهارتی: تولید و پرورش سبزیجاتی که از گل و اجزای آنها استفاده می‌شود. شماره شناسایی: ۵—۰۲۱۰۲۱۳۱	مهارت: تولید و پرورش سبزی شماره شناسایی: ۰۲۱۰۲۱۳۱
---	--	--



شکل ۵-۲۷



شکل ۵-۲۸

۱-۳- کلم بروکولی (کلم گل سبز) و انواع آن
 ۱-۳-۱- اصل و قدمت و ارزش غذایی: به طور دقیق معلوم نیست که این گیاه کجا و در چه تاریخ، در سبزیکاری وارد شده است ولی برخی محققان کشاورزی تصور می‌کنند که قبل از کلم گل معمولی موجود بوده و به عبارت دیگر، کلم گل معمولی از تغییر کلم گل سبز به دست آمده است.

۱-۳-۲- اهمیت: تولید و مصرف این کلمها در اکثر نقاط جهان، بویژه در اروپا و امریکا بسیار زیاد است و آنها را به صورت خام، آب پز، سرخ کرده و به عنوان سبزی در کنار غذاهای گوشتی، به مصرف خوراکی می‌رسانند. روی هم رفته، سطح کشت و کار و مصرف این کلمها اگر از کلم پیچ بیشتر نباشد کمتر نیست. کشت و کار و مصرف آن در ایران احتمالاً پس از جنگ جهانی رونق یافته است. با این همه، سطح کشت و مصرف آن گسترش زیاد یافته است و امروزه بسیاری از کشاورزان ایران در تولید و بسته‌بندی و عرضه آن به بازار فروش فعالیت داشته، از این راه امرار معاش می‌کنند (شکل ۵-۲۷).

۳-۱-۳- مشخصات گیاه‌شناسی (باتانیکی):

- گیاهی یکساله و دولپه از خانواده کلمها (چلیپایان) و از جنس براسیکا و گونه براسیکا اولرا و واریته براسیکا اولرا سه واریته ایتالیکا^۱ است (شکل ۵-۲۸).

واحد کار: تولید و پرورش کلم بروکولی شماره شناسایی: ۵۳_۰۲۱۰۳۱۲	پیمانه مهارتی: تولید و پرورش سبزیجاتی که از گل و اجزای آنها استفاده می‌شود. شماره شناسایی: ۵_۰۲۱۰۳۱۲	مهارت: تولید و پرورش سبزی شماره شناسایی: ۲۱۰_۰۲۱۰۳۱۲
--	---	---



شکل ۲۹_۵

— ریشه: نسبتاً عمیق و قطور است.
 — ساقه: نسبتاً کوتاه و منشعب است که به گلهای کپهای و توبی منتهی می‌شود. ساقه سبز، علفی و تقریباً گوشتی است.
 — برگها: پهن افراسته، دارای پهنه کم و صاف و دمبرگ و رگبرگهای بزرگ و مشخص است. رنگ برگها کبود (سبز مایل به آبی) است و اندازه آنها، کوچکتر از برگهای کلم گل معمولی است.

— گلهای دوجنسی بوده، رنگ گلبرگها زرد یا سفید است. علاوه بر گل مرکزی از کنار برگهای زیرین یعنی از محل اتصال برگ به ساقه، گلهایی ظاهر می‌گردد که کوچکتر از گل مرکزی انتهایی است.

— دانه‌ها: گرد، سبز مایل به زرد و کوچک است.

۴_۱_۳_۳_— انواع کلم بروکولی:

— کلم بروکولی زودرس دنی^۱: نژاد بسیار زودرس است که در ظرف ۸۰ روز پس از بازکاشت در زمین اصلی، قابل بهره‌برداری است.

قسمت گل آذین آن خیلی خوش‌ترکیب و گنبدهای شکل (کپهای شکل) است.

— کلم بروکولی اردک سبز^۲: نژاد بسیار زودرس است که در ظرف ۸۵ روز از زمان بازکاشت در زمین اصلی قابل بهره‌برداری است. گل آذین آن بزرگ، گرد، فشرده و خوش‌فرم است.

— کلم بروکولی نوع کرونا^۳: این کلم در مدت ۶۰ روز آماده برداشت شده، در مدت کوتاهی جوانه‌های متعدد ایجاد می‌کند و تاج کلم را تشکیل می‌دهد.

— کلم بروکولی امپرور^۴: نسبتاً زودرس است و مناسب برای تولید محصول تابستانه و پاییزه است. حتی در شرایط نامساعد نیز نتیجه مطلوبی می‌دهد. مناسب برای برداشت مکانیکی می‌باشد (شکل ۲۹_۵).

۱_ Dandyearly No. 32

۲_ Green Duck No. 4


۳_ Expresscorona

۴_ Emperor F₁h.

<p>واحد کار: تولید و پرورش کلم بروکولی شماره شناسایی: ۵۳_۰۲۱۰۲۱۳۱</p>	<p>پیمانه مهارتی: تولید و پرورش سبزیجاتی که از گل و اجزای آنها استفاده می‌شود. شماره شناسایی: ۵_۰۲۱۰۲۱۳۱</p>	<p>مهارت: تولید و پرورش سبزی شماره شناسایی: ۲۱۰۲۱۰۲۱۳۱</p>
---	--	--

— کلم بروکولی نوع مونتیلا^۱: نیمه زودرس و نیمه بلند است و تنها یک سر تولید می‌کند. برای مصرف تازه و صنایع مناسب می‌باشد.

— کلم بروکولی وایکینگ^۲: دارای عملکرد عالی است. سرهای متوسط تا بزرگ آن خوش فرم می‌باشند (شکل ۵-۳۰). برای مصرف تازه و استفاده در صنایع (فرآوری) مناسب می‌باشد.



شکل ۵-۳۰

— کلم بروکولی کولونل^۳: دارای سر سبز تیره می‌باشد. پس از برداشت سر اصلی سرهای ثانوی بخوبی در آن تشکیل می‌شود. برای مصرف تازه مناسب است (شکل ۵-۳۱).



شکل ۵-۳۱

واحد کار: تولید و پرورش کلم بروکولی شماره شناسایی: ۵۳ – ۲۱۰۲۱۰۲۱	پیمانه مهارتی: تولید و پرورش سبزیجاتی که از گل و اجزای آنها استفاده می‌شود. شماره شناسایی: ۵ – ۲۱۰۲۱۰۲۱	مهارت: تولید و پرورش سبزی شماره شناسایی: ۲۱۰۲۱۰۲۱
---	--	--

زودرس مثل ارلی دسیکو^۱ و ارلی اسپارتان^۲ استفاده کنید.

– برای تهیه محصول در اوایل پاییز می‌توانید تابستان

بذرکاری کنید. برای این کشت، از ارقام متوسط رس مثل کالا بریز^۳، آتلانتیک^۴ و مدیوم^۵ استفاده کنید.

– برای برداشت بهاره می‌توانید در پاییز کشت کنید فقط

در مناطقی به کاشت در پاییز اقدام کنید که در تمام دوره زمستان پرورش عملی باشد برای این کشت، از ارقام دیررس مثل نپتون^۶ و مدیوم لیت^۷ استفاده کنید.

۵-۳-۳- نحوه کاشت:

کار عملی ۱: کاشت را می‌توانید در زمین اصلی انجام دهید یا آنکه ابتدا در خزانه بذرکاری نماید و با گذشت حدود ۵ تا ۶ هفته، به محل اصلی منتقل کنید.

۶-۳-۳- فواصل کاشت:

– فاصله ردیفها را ۶۰ تا ۷۵ سانتی متر انتخاب نمایید.

– فاصله بین بوته‌ها را برابر روی ردیفها، ۴۵ تا ۶۰ سانتی متر در نظر بگیرید.

۷-۳-۳- مقدار بذر مصرفی:

برای تهیه نشا لازم جهت کشت یک هکتار زمین، حدود ۳۰۰ گرم بذر تهیه نمایید.

۸-۳-۳- انتقال نشا به زمین اصلی:

– وقتی ارتفاع بوته‌ها به ۵ تا ۶ سانتی متر رسید خزانه را آبیاری نموده، روز بعد بوته‌ها را در سوراخی که قبلاً روی ردیفها آماده کرده‌اید بکارید و از اطراف به خاک فشار آورید تا خاک به ریشه بچسبد.

– بهتر است قبل از نشاکاری زمین را آبیاری کنید تا چسبندگی خاک به ریشه بهتر صورت گیرد.

– نشا را تا نزدیک پایین‌ترین برگها در خاک فروبرید.

۲-۳- شرایط رویشی ویژه

۱-۳- آب و هوای:

– می‌توانید در اکثر نقاط معتدل و استپی و مناطق دارای آب و هوای مدیترانه‌ای و حتی در مناطق نیمه‌گرمسیری به کاشت آن اقدام کنید.

– چون این گیاه نسبت به گرما حساس‌تر از کلم‌گل معمولی است باید زودتر کاشته شود یا قبل از رسیدن تابستان محصول جمع‌آوری گردد.

۲-۳- خاک:

در خاکهای سبک بکارید. برای کاشت در تابستان و پاییز از خاکهای لوم‌شنی با ظرفیت نگهداری آب بالا استفاده کنید.

۳-۲- نور:

در مکان بسیار روشن و آفتابی کشت

کنید.

۳-۳- ویژگیهای خاص کاشت

۱-۳- پخش کود دامی و شیمیایی در زمین

اصلی: در این باره، همانند کلم‌گل معمولی عمل نمایید.

۲-۳- آماده کردن خاک خزانه:

– زمین خزانه را با کود پوسیده گاوی و گوسفند همانند کلم‌گل تهیه کنید.

– زمین را نرم و پوک نموده، کاملاً مسطح نمایید.

۳-۳- تهیه زمین محل اصلی:

در این مورد، همانند کلم‌گل عمل نمایید.

۴-۳- زمان کاشت:

– در اوایل فروردین بذر را در خزانه بکارید تا قبل از گرم شدن هوا محصول را برداشت کنید. برای این کشت، از ارقام

۱-Early Decicco

۲-Early spartan

۳-Calabrese

۴-Atlantic

۵-Medium 90

۶-Neptune

۷-Medium late

واحد کار: تولید و پرورش کلم بروکولی شماره شناسایی: ۵۳ - ۲۱۰۲۱۰۲۱۳۱	پیمانه مهارتی: تولید و پرورش سبزیجاتی که از گل و اجزای آنها استفاده می‌شود. شماره شناسایی: ۵ - ۲۱۰۲۱۰۲۱۳۱	مهارت: تولید و پرورش سبزی شماره شناسایی: ۲۱۰۲۱۰۲۱۳۱
---	--	--

- برخلاف کلم گل معمولی که با قطع گل انتهایی، دیگر نمی‌توانید محصولی برداشت کنید در کلم بروکولی پس از آنکه گل انتهایی وسط بوته را برداشت نمودید در صورت ایجاد شیار به صورت + از بغل برگهایی که اطراف ساقه قرار دارند گلهای ثانوی ظاهر شده، شروع به نمو می‌کنند که پس از مدتی می‌توانید آنها را نیز با مقداری از دمگل قطع نمود، چند عدد آن را دسته کنید و به بازار ارسال نمایید.
- البته محصول دوم کوچکتر خواهد بود. در نتیجه می‌توانید برداشت را در چند نوبت انجام دهید (شکل ۵-۳۲).



شکل ۵-۳۲

کار عملی ۲: طرز بسته‌بندی این کلم کاملاً شبیه کلم گل معمولی است یعنی برای بازارهای تزدیک محل تولید، پس از

۴-۳-۴-۳- مراقبهای داشت

۱-۴-۳- وجین: بدون استفاده از بیل، علفهای هرز را از بین ببرید چون ریشه آن بسیار حساس است.

۲-۴-۳- کود سرک:

- کوددهی را همانند کلم گل معمولی انجام دهید.

- کودسرک را قبل از شکوفه‌دهی به خاک بدهید.

۳-۴-۳- خاکدهی پای بوته:

کار عملی ۲: در پاییز خاک اطراف را دور ساقه جمع کنید تا استحکام گیاه را تأمین کند.

۴-۴-۳- آبیاری:

- طوری آبیاری کنید که دائمًا خاک اطراف ریشه مرطوب باشد زیرا این گیاه به آب زیادی نیاز دارد. با افزایش سطح برگ بزرگ شدن اندازه برگها) آبیاری را بیشتر نمایید.

- حداقل نیاز آبی گیاه در هنگام تشکیل سر (تاج) بروز می‌کند. در این دوره، اگر میزان آب کم باشد گیاه به شدت صدمه خواهد دید و از کیفیت سر (تاج یا گل) کاسته خواهد شد.

۵-۴-۳- واکاری:

کار عملی ۳: چنانچه ۱۰ روز پس از نشاکاری، تعدادی از نشاھای کاشته شده، به‌دلیل به رشد خود ادامه نداده، پلاسیده و خشک شدند باید سریعاً نشاکاری مجدد کنید.

۵-۳- برداشت

۱-۵-۳- زمان برداشت:

- محصول کلم بروکولی را قبل از این که غنچه‌های آن باز شوند و نیز هنگامی که رنگ کلمها سبز تیره گردند قطع نمایید.

- اگر در برداشت تأخیر کنید غنچه‌ها زرد گردیده، از مرغوبیت محصول کاسته خواهد شد.

۲-۵-۳- نحوه برداشت:

کار عملی ۱: سرشاخه‌هایی را که گل آنها هنوز باز نشده به همراه ۱۰ سانتی‌متر از ساقه برداشت نمایید.

<p>پیمانه مهارتی: تولید و پرورش سبزیجاتی که از گل و اجزای آنها استفاده می‌شود.</p> <p>شماره شناسایی: ۵_۲۱۰۲۱۰_۲۱۳۱</p>	<p>مهارت: تولید و پرورش سبزی</p> <p>شماره شناسایی: ۲۱۰۲۱۰_۲۱۳۱</p>
--	--

واحد کار: تولید و پرورش کلم بروکولی
شماره شناسایی: ۵۳_۲۱۰۲۱۰_۲۱۳۱

بماند باید حتماً پس از قرار دادن بروکولی در جعبه، روی آنها را با یخ کوبیده، پوشانید، و بعد در جعبه را میخکوب نمایید.

۴_۵_۳_عملکرد: حدود ۴ تا ۱۰ تن محصول از هر هکتار برداشت خواهد نمود.

قطع انتهای برگهای اطراف گل و حذف مقدار زیادی ساقه، بوته آنها را به نحوی که گلهای به طرف بالا واقع شود در جعبه قرار دهید.

- برای ارسال بروکولی و کلم گل معمولی به بازارهای دوردست، که محصول باید اجباراً مدت نسبتاً زیادی در جعبه

جدول ۲_۵_تقویم کاشت کلم گل سبز یا بروکولی

برداشت	آذر
	آبان
مراقبت در مزروعه	مهر
	شهریور
	مرداد
کاشت در محل اصلی	تیر
مراقبت در خزانه	خرداد
نشا در خزانه دوم	اردیبهشت
کاشت بذر در خزانه اول	فروردین

<p>و احد کار: آفات و بیماریهای این سبزیجات پیمانه مهارتی: تولید و پرورش سبزیجاتی که از گل و اجزای آنها استفاده می‌شود. شماره شناسایی: ۵۴ – ۰۲۱۰۳۱۲</p>	<p>مهارت: تولید و پرورش سبزی شماره شناسایی: ۰۲۱۰۳۱۲</p>
--	---

و احد کار چهارم:

**آفات و بیماریهای سبزیجاتی که از گل و
اجزای آن استفاده می‌شود.**

<p> واحد کار: آفات و بیماریهای این سبزیجات شماره شناسایی: ۵۴ – ۲۱۰۲۱۰۲۱</p>	<p> پیمانه مهارتی: تولید و پرورش سبزیجاتی که از گل و اجزای آنها استفاده می‌شود. شماره شناسایی: ۵ – ۲۱۰۲۱۰۲۱۰۲۱</p>	<p> مهارت: تولید و پرورش سبزی شماره شناسایی: ۲۱۰۲۱۰۲۱</p>
---	--	---

۱-۴- آفات سبزیجاتی که از گل آنها استفاده می‌شود.

بیماری ریشه‌گرزی کلم، سوختگی سیاه کلم، بیماری فقط کلم، پوسیدگی ریشه کلم، پوسیدگی سیاه کلم.

سفیده بزرگ کلم، کرم ساقه خوار کلم، آبدزدک، سیرسیرک، ملخهای بومی، شته کلم، شبپره زمستانی، پروانه پرودنیا، سفیده کوچک کلم، بید کلم، کنه‌های کلم، نرم تنان زیان‌آور، شبپره آلو (روی آرتیشو خسارت می‌زند) شته آرتیشو.

پیمانه مهارتی: تولید و پرورش سبزیجاتی که از گل و اجزای آنها استفاده می‌شود.

شماره شناسایی: ۵ - ۲۱۳۱۰۲۱۰

مهارت: تولید و پرورش سبزی

شماره شناسایی: ۲۱۳۱۰۲۱۰

آزمون نهایی

- ۱- کلم گل گیاهی خشکی پسند است.
- ۲- مقدار بذر مصرفی آرتیشو در یکصد مترمربع، ۲۰ تا ۲۵ گرم است.
- ۳- حداکثر نیاز آبی کلم بروکولی در چه زمانی است؟
 الف - جوانه زنی بذر
 ب - حالت دویرگی
 ج - هنگام تشکیل سر (تاج)
- ۴- در زمان برداشت آرتیشو، همیشه حدود سانتی متر از ساقه را با گل قطع می‌نمایند.
- ۵- پس از برداشت کلم بروکولی اگر در محل برش ساقه شیاری به صورت (+) ایجاد کنید و ادار به تشکیل می‌شود.
- ۶- یک بوته آرتیشو چند درصد گل متوسط دارد؟
 الف - ۱۰ ب - ۲۵ ج - ۴۰ د - ۶۵
- ۷- زمان انتقال نشای کلم گل به زمین اصلی هنگام برگی شدن گیاه است.
- ۸- مقدار مصرف کود سرک در هکتار برای آرتیشو چقدر است؟
- ۹- بی‌دقیقی در حمل و نقل و دست به دست کرد نشاھای کلم گل، باعث تشکیل نشدن می‌شود.
- ۱۰- آرتیشو را فقط از طریق جنسی می‌توان تکثیر کرد.
 الف - غ ب - ص
- ۱۱- تولید و مصرف کلم بروکولی بیشتر در و رایج است.
- ۱۲- برای تهیه نشای لازم کام بروکولی برای کشت یک هکتار زمین، اصلی حدود گرم بذر نیاز است.

پاسخ آزمون نهایی

- ۱- غ
۲- غ
۳- ج
۴- ۱۰ تا ۵
۵- گلهای ثانویه
۶- ب
۷- ۶ تا ۵
۸- ۲۴۰ تا ۳۲۰ کیلوگرم
۹- تاج (سر)
۱۰- غ

پیمانه مهارتی: تولید و پرورش سبزیجاتی که از گل و اجزای آنها استفاده می‌شود.

شماره شناسایی: ۵_۲۱۰۲۱۰۲۱۳۱

مهارت: تولید و پرورش سبزی

شماره شناسایی: ۱۰۲۱۰۲۱۳۱

۱۱- اروپا - آمریکا

۱۲- ۳۰۰ گرم

پاسخ پیش آزمون

۱- الف

۲- الف

۳- ج

۴- ب

۵- یونجه - نخود

۶- پوسته - ذخیره غذایی - جنین

۷- ۳ تا ۴ برابر قطر بزرگ بذر

۸- بارانی - قطره‌ای

۹- ۲۰۰_۲۵۰

۱۰- ج

پیمانه مهارتی ششم

تولید و پرورش سبزیجات دانه‌ای



هدف کلی

توانایی کاشت، داشت و برداشت انواع سبزیجاتی که از دانه آنها استفاده می شود.

- هدفهای رفتاری: فراگیر پس از گذراندن این پیمانه مهارتی، خواهد توانست :
- سبزیجاتی را که از دانه آنها استفاده می شود بشناسد.
 - خواص گیاهشناسی سبزیجاتی را که از دانه آنها استفاده می شود توضیح دهد.
 - شرایط آب و هوایی انواع سبزیجاتی را که از دانه آنها استفاده می شود توضیح دهد.
 - خاک مناسب برای کشت و پرورش انواع سبزیجاتی را که از دانه آنها استفاده می شود آماده نماید.
 - کود دامی و شیمیایی مورد نیاز انواع سبزیجاتی را که از دانه آنها استفاده می شود برآورد نموده، در زمین پخش نماید.

مهارت: تولید و پرورش سبزی

شماره شناسایی: ۲۱۳۱۰۲۱۰

پیمانه مهارتی: تولید و پرورش سبزیجاتی که از دانه آنها استفاده می‌شود.

شماره شناسایی: ۶-۰۲۱۰۲۱۳۱۰

- مراقبتهای داشت انواع سبزیجاتی را که از دانه آنها استفاده می‌شود انجام دهد.
- زمان و نحوه برداشت انواع سبزیجاتی را که از دانه آنها استفاده می‌شود توضیح دهد.
- سبزیجاتی را که از دانه آنها استفاده می‌شود برداشت نماید.
- درجه‌بندی و بسته‌بندی سبزیجاتی را که از دانه آنها استفاده می‌شود انجام دهد.

پیش‌نیاز

baganai umumi

ک/۷۹-۲-۱۰/۲

توجه: اسامی علمی، برای اطلاع بیشتر فراغیران درج شده است و یادگیری آنها برای گذراندن این پیمانه مهارتی الزامی نیست مگر در مواردی که اسامی، معادل فارسی ندارند.

زمان (ساعت)	
عملی	نظری
۱۹	۸

پیمانه مهارتی: تولید و پرورش سبزیجاتی که از دانه آنها استفاده می‌شود.
شماره شناسایی: ۲۱۳۱۰۲۱۰۶

مهارت: تولید و پرورش سبزی
شماره شناسایی: ۲۱۳۱۰۲۱۰۶

فهرست

۲۶۷

پیش‌آزمون

۲۶۸

واحد کار اول — تولید و پرورش لوبیا سبز

۲۷۴

واحد کار دوم — تولید و پرورش نخودفرنگی

۲۸۱

واحد کار سوم — تولید و پرورش باقلاء

۲۸۶

واحد کار چهارم — آفات و بیماریهای سبزیجاتی که از دانه آنها استفاده می‌شود.

۲۹۰

آزمون نهایی

۲۹۰

پاسخ آزمون نهایی

۲۹۱

پاسخ پیش‌آزمون

پیش آزمون

۱- کدام یک از گیاهان زیر جزو حبوبات نیست؟

الف - لوبیا سبز

د - باقلاء

ج - گندم

ب - نخود

۲- خانواده بقولات ازت هوا در زمین به یک اندازه تثبیت می‌کنند. ص غ

۳- کدام بیماری به برگ گیاهان خسارت می‌زند؟

الف - سفیدک سطحی ب - گموز ج - نماتد د - ورتیسلیوم

۴- آیا بافت خاک و ساختمان خاک با هم فرق می‌کنند؟ بله خیر

۵- کدام نوع کود بیشتر باعث رشد رویشی در گیاه می‌شود؟

الف - کودهای فسفره ب - کودهای ازته

ج - کودهای پتاسه د - عناصر کم مصرف

۶- بعضی از بیماریهای گیاهی از طریق بذر انتقال پیدا می‌کنند. ص غ

۷- اگر بافت خاک..... باشد و یا مقدار کمی داشته باشد پس از هر آبیاری سله می‌بندد.

۸- به کودی که پس از سبزشدن گیاه به آن می‌دهند کود می‌گویند.

۹- بعد از وجبن علفهای هرز، باید مزرعه را کرد.

۱۰- حبوبات به خاطر داشتن، به گوشت فقراء معروف هستند.