

## فصل ۶

# شاپیستگی‌های پایه فنی

## اتحادها

$$(x+y)^r = x^r + rx y + y^r$$

$$(x-y)^r = x^r - rx y + y^r$$

$$(x+a)(x+b) = x^r + (a+b)x + ab$$

$$(x+y)^r = x^r + rx^r y + rx y^r + y^r$$


$$(x-y)^r = x^r - rx^r y + rx y^r - y^r$$

$$x^r - y^r = (x-y)(x^{r-1} + xy + y^{r-1})$$


$$x^r - y^r = (x-y)(x^{r-1} - xy + y^{r-1})$$

$$x^r + y^r = (x+y)(x^{r-1} - xy + y^{r-1})$$



## مجموعه ها




اشتراع دو مجموعه



$A \subseteq B, B \not\subseteq A$   
زیر مجموعه








تفاضل دو مجموعه







اجتماع دو مجموعه

## نمایش مجموعه به صورت بازه

نمایش مجموعه	نمایش روی محور	نمایش بازه
$\{x \in \mathbb{R}   a \leq x \leq b\}$		$[a, b]$
$\{x \in \mathbb{R}   a < x \leq b\}$		$(a, b]$
$\{x \in \mathbb{R}   a \leq x < b\}$		$[a, b)$
$\{x \in \mathbb{R}   a < x < b\}$		$(a, b)$
$\{x \in \mathbb{R}   a < x\}$		$(a, +\infty)$
$\{x \in \mathbb{R}   x \leq b\}$		$(-\infty, b]$

	<p><b>مربع</b></p> <p>L طول ضلع e قطر A مساحت</p>	$A = L^2$ $e = \sqrt{2} \cdot L$
	<p><b>لوزی</b></p> <p>b ارتفاع L طول ضلع A مساحت</p>	$A = L \cdot b$
	<p><b>مستطيل</b></p> <p>e قطر b عرض L طول A مساحت</p>	$e = \sqrt{L^2 + b^2}$ $A = L \cdot b$
	<p><b>متوازي الاضلاع</b></p> <p>L طول b عرض A مساحت</p>	$A = L \cdot b$
	<p><b>ذوزنقه</b></p> <p>A مساحت L<sub>1</sub> طول قاعده بزرگ L<sub>2</sub> طول قاعده بزرگ L<sub>m</sub> طول متوسط b عرض</p>	$L_m = \frac{L_1 + L_2}{2}$ $A = l_m \cdot b$ $A = \frac{L_1 + L_2}{2} \cdot b$
	<p><b>مثلث</b></p> <p>A مساحت L طول قاعده b ارتفاع</p>	$A = \frac{L \cdot b}{2}$
	<p><b>حلقه دائري</b></p> <p>A مساحت D قطر خارجي d قطر داخلي d<sub>m</sub> قطر متوسط b عرض</p>	$d_m = \frac{D + d}{2}$ $A = \pi \cdot d_m \cdot b$ $A = \frac{\pi}{4} (D^2 - d^2)$
	<p><b>بيضي</b></p> <p>A مساحت D قطر بزرگ d قطر كوچك U محيط</p>	$U = \frac{\pi}{4} \cdot (D + d)$ $A = \frac{\pi \cdot D \cdot d}{4}$

 <p><b>مكعب مستطيل</b></p>	<p><math>b</math> عرض  <math>h</math> ارتفاع  <math>A_o</math> مساحت  <math>L</math> طول قاعدة  <math>V</math> حجم</p>	$V = L \cdot b \cdot h$ $A_o = 2 \cdot (L \cdot b + L \cdot h + b \cdot h)$
 <p><b>استوانه</b></p>	<p><math>A_m</math> مساحت جانبي  <math>h</math> ارتفاع  <math>V</math> حجم  <math>A_o</math> مساحت</p>	$A_o = \pi \cdot d \cdot h$ $V = \frac{\pi \cdot d^2}{4} \cdot h$ $A_o = \pi \cdot d \cdot h + 2 \cdot \pi \cdot \frac{d}{2} \cdot h$
 <p><b>هرم منتظم</b></p>	<p><math>h</math> ارتفاع  <math>h_s</math> ارتفاع وجه  <math>b</math> عرض قاعدة  <math>L_1</math> طول يال  <math>L</math> طول قاعدة  <math>V</math> حجم</p>	$V = \frac{L \cdot b \cdot h}{3}$ $L_1 = \sqrt{h_s^2 + \frac{b^2}{4}}$ $h_s = \sqrt{h^2 + \frac{L^2}{4}}$
 <p><b>مخروط</b></p>	<p><math>V</math> حجم  <math>d</math> قطر  <math>h</math> ارتفاع  <math>h_s</math> طول يال  <math>A_M</math> مساحت جانبي</p>	$h_s = \sqrt{\frac{d^2}{4} + h^2}$ $A_M = \frac{\pi \cdot d \cdot h_s}{2}$ $V = \frac{\pi \cdot d^2}{4} \cdot \frac{h}{3}$
 <p><b>كرة</b></p>	<p><math>A_o</math> مساحت  <math>V</math> حجم  <math>d</math> قطر كرة</p>	$A_o = \pi \cdot d^2$ $V = \frac{\pi \cdot d^3}{6}$

## نسبت و تنااسب

**۱** در حالت کلی، دو نسبت  $a$  به  $b$  و  $c$  به  $d$  مساوی‌اند، هرگاه برای یک عدد مانند  $k$  داشته باشیم:

$$c=kd \quad a=kb \quad \frac{a}{b} = \frac{c}{d} = k$$

**۲** اگر  $a$  و  $b$  مقادیر متناظر دو کمیت باشند که با هم رابطه معکوس دارند، مقدار  $k=a \times b$  ثابت است و اگر  $c$  و  $d$  دو مقدار متناظر دیگر از همین کمیت باشند، داریم:

$$a=\frac{k}{b} \quad c=\frac{k}{d} \quad a \times b=c \times d$$

## ۳ خواص عملیات

در عبارت‌های زیر، فرض بر آن است که مخرج‌ها مخالف صفر هستند.

$\frac{a}{b} = \frac{ca}{cb} \quad (c \neq 0)$	$c \times \frac{a}{b} = \frac{ca}{b}$	$\frac{a}{b} = a \times \frac{1}{b}$
$\frac{a+b}{c} = \frac{a}{c} + \frac{b}{c}$		$-\frac{a}{b} = \frac{-a}{b} = \frac{a}{-b}$
$\frac{\frac{a}{b}}{\frac{c}{d}} = \frac{ad}{bc}$		$\frac{a}{b} \times \frac{c}{d} = \frac{ac}{bd}$

$$a \times d = b \times c \quad \text{تساوی} \quad \frac{a}{b} = \frac{c}{d} \quad \text{معادل است با}$$

## درصد و کاربردهای آن

**۱** معادله درصد: رابطه بین مقدار اولیه، درصدی از مقدار اولیه و مقدار نهایی را نشان می‌دهد.

$$b = x \times a \quad \begin{matrix} \leftarrow \text{مقدار نهایی} \\ \downarrow \\ \text{درصد به صورت عدد} \end{matrix}$$

اعشاری / کسری

**۲** درصد تغییر: برای هر کمیتی مقدار

$$\frac{\text{مقدار اولیه} - \text{مقدار نهایی}}{\text{مقدار اولیه}} \times 100 = \frac{\text{میزان تفاوت در مقدار}}{\text{مقدار اولیه}} \times 100 \times \frac{\text{نسبت تغییر}}{100}$$

را درصد تغییر آن کمیت می‌نامند.

درصد تغییر می‌تواند منفی هم باشد که به معنای کاهش است.

## معادله درجه دوم

$$ax^2 + bx + c = 0$$

$$\Delta = b^2 - 4ac \left\{ \begin{array}{l} \Delta > 0 \Rightarrow x_1, x_2 = \frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a} \\ \Delta = 0 \Rightarrow x_1, x_2 = \frac{-b}{2a} \\ \Delta < 0 \Rightarrow \text{معادله ریشه ندارد} \end{array} \right.$$

## نامعادله درجه دوم

نامساوی هایی به صورت  $ax^2 + bx + c \geq 0$  یا  $ax^2 + bx + c \leq 0$  که در آن  $a, b, c$  اعداد داده حقیقی هستند ( $a \neq 0$ ) را نامعادله درجه دوم می‌نامند. مقدارهایی از  $x$  که نامعادله را به یک نامساوی درست تبدیل می‌کنند، جواب‌های نامعادله می‌نامند.

## توان و ریشه یابی

$$a^m \times a^n = a^{m+n}$$

$$\frac{a^m}{a^n} = a^{m-n} \quad \frac{a^m}{a^n} = \frac{1}{a^{n-m}} \quad (a \neq 0)$$

$$(a^m)^n = a^{mn}$$

$$(ab)^n = a^n b^n, \quad \left(\frac{a}{b}\right)^n = \frac{a^n}{b^n} \quad (b \neq 0)$$

$$a^0 = 1 \quad (a \neq 0)$$

$$a^{-n} = \frac{1}{a^n} \quad (a \neq 0)$$

$$a^{\frac{1}{n}} = \sqrt[n]{a}$$

$$a^{\frac{m}{n}} = \sqrt[n]{a^m} = (\sqrt[n]{a})^m$$

$$\sqrt[n]{a^n} = (\sqrt[n]{a})^n = a$$

$$\sqrt[n]{a} \sqrt[k]{b} = \sqrt[nk]{ab}$$

$$\sqrt[mn]{a^n} = \sqrt[m]{a}$$


$$\frac{\sqrt[n]{a}}{\sqrt[n]{b}} = \sqrt[n]{\frac{a}{b}} \quad (b \neq 0)$$

## مثلثات

**۱** یکی از حالات تشابه دو مثلث، تساوی زاویه‌های آن دو مثلث می‌باشد.

**۲** رابطه فیثاغورس: در مثلث قائم‌الزاویه  $ABC$  داریم:

$$(AB)^2 = (AC)^2 + (BC)^2$$




## ۲ نسبت‌های مثلثاتی یک زاویه تند:

در مثلث قائم‌الزاویه ABC زاویه تند  $\alpha$  را در نظر بگیرید. بنا به تعریف داریم:

$$\tan \alpha = \frac{\text{طول ضلع روبروی زاویه } \alpha}{\text{طول ضلع مجاور زاویه } \alpha} = \frac{BC}{AC}$$

$$\pi = \frac{\pi}{180} R \quad (\text{رادیان}) \quad R = \frac{L}{r}$$



$$\sin \alpha = \frac{\text{طول ضلع روبروی زاویه } \alpha}{\text{وتر}} = \frac{BC}{AB}$$

$$\frac{L}{r} = \frac{\pi}{180} D \quad (\text{درجه})$$

$$\cos \alpha = \frac{\text{طول ضلع مجاور زاویه } \alpha}{\text{وتر}} = \frac{AC}{AB}$$

$$D = \frac{180}{\pi} R \quad (\text{درجه})$$

## ۳ روابط بین نسبت‌های مثلثاتی:

$$\tan \alpha = \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha} \quad (\text{ب})$$

$$\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1 \quad (\text{الف})$$

$\sin(\pi - \theta) = \sin \theta$	$\cos(\pi - \theta) = -\cos \theta$	$\tan(\pi - \theta) = -\tan \theta$
$\sin(\pi + \theta) = -\sin \theta$	$\cos(\pi + \theta) = -\cos \theta$	$\tan(\pi + \theta) = \tan \theta$
$\sin(-\theta) = -\sin \theta$	$\cos(-\theta) = \cos \theta$	$\tan(-\theta) = -\tan \theta$
$\sin(2\pi + \theta) = \sin \theta$	$\cos(2\pi + \theta) = \cos \theta$	$\tan(2\pi + \theta) = \tan \theta$
$\sin(2\pi - \theta) = -\sin \theta$	$\cos(2\pi - \theta) = \cos \theta$	$\tan(2\pi - \theta) = -\tan \theta$

Angle A in degrees	Angle A in radians	sin A	cos A	tan A	cot A
0°	0	0	1	0	∞
15°	$\frac{\pi}{12}$	$\frac{1}{4}(\sqrt{6} - \sqrt{2})$	$\frac{1}{4}(\sqrt{6} + \sqrt{2})$	$2 - \sqrt{3}$	$2 + \sqrt{3}$
30°	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}\sqrt{3}$	$\frac{1}{3}\sqrt{3}$	$\sqrt{3}$
45°	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{1}{2}\sqrt{2}$	$\frac{1}{2}\sqrt{2}$	1	1
60°	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{1}{2}\sqrt{3}$	$\frac{1}{2}$	$\sqrt{3}$	$\frac{1}{3}\sqrt{3}$
75°	$\frac{5\pi}{12}$	$\frac{1}{4}(\sqrt{6} + \sqrt{2})$	$\frac{1}{4}(\sqrt{6} - \sqrt{2})$	$2 + \sqrt{3}$	$2 - \sqrt{3}$

Angle A in degrees	Angle A in radians	sin A	cos A	tan A	cot A
90°	$\frac{\pi}{2}$	1	0	$\pm\infty$	0
105°	$\frac{7\pi}{12}$	$\frac{1}{4}(\sqrt{6} + \sqrt{2})$	$-\frac{1}{4}(\sqrt{6} - \sqrt{2})$	$-(2 + \sqrt{2})$	$-(2 - \sqrt{2})$
120°	$\frac{2\pi}{3}$	$\frac{1}{2}\sqrt{3}$	$-\frac{1}{2}$	$-\sqrt{3}$	$-\frac{1}{\sqrt{3}}$
135°	$\frac{3\pi}{4}$	$\frac{1}{2}\sqrt{2}$	$-\frac{1}{2}\sqrt{2}$	-1	-1
150°	$\frac{5\pi}{6}$	$\frac{1}{2}$	$-\frac{1}{2}\sqrt{3}$	$-\frac{1}{\sqrt{3}}$	$-\sqrt{3}$
165°	$\frac{11\pi}{12}$	$\frac{1}{4}(\sqrt{6} - \sqrt{2})$	$-\frac{1}{4}(\sqrt{6} + \sqrt{2})$	$-(2 - \sqrt{2})$	$-(2 + \sqrt{2})$
180°	$\pi$	0	-1	0	$\pm\infty$

### لگاریتم و خواص آن:

اگر  $a$  یک عدد حقیقی مثبت مخالف 1 باشد و اعداد حقیقی  $b$  و  $c$  به گونه‌ای باشند که:  $b = a^c$  آنگاه  $c$  را لگاریتم  $b$  در مبنای  $a$  می‌نامند و با  $\log_a b$  نشان می‌دهند. به عبارت دیگر داریم:

$\log_a b = c$  ■ فقط اعداد مثبت لگاریتم دارند، یعنی عبارت  $\log_a b$  فقط برای  $b > 0$  تعریف می‌شود.

$\log(bc) = \log b + \log c$  ■ برای  $b, c > 0$  داریم:

$\log(a+b) \neq \log a + \log b$  ■ در حالت کلی: برای هر  $a, b > 0$  داریم:

$\log \frac{b}{c} = \log b - \log c$  ■ برای  $b, c > 0$  داریم:

$\log(a-b) \neq \log a - \log b$  ■ در حالت کلی: برای هر  $a, b > 0$  داریم:

$\log b^x = x \log b$  ■ برای  $b > 0$  و هر عدد حقیقی  $x$  داریم:


■ برای  $a, b > 0$  و  $a \neq 1$  داریم:

$$\log_a b = \frac{\log b}{\log a}$$

■ آمار توصیفی: ✓

- نمودار پراکنش دو کمیت، مجموعه‌ای از نقاط در صفحه مختصات است که طول و عرض هر نقطه، داده‌های مربوط به اندازه‌گیری‌های متناظر دو کمیت است.
- $x$  و  $y$  دو کمیت مرتبط هستند. اگر مقادیر این دو کمیت برای بخش از  $x$ ها در یک بازه، مشخص باشد، پیش‌بینی مقادیر  $y$  به ازای  $x$ های مشخص در این بازه به کمک خط برآش را درون‌بایی و پیش‌بینی مقادیر  $y$  به ازای  $x$ های مشخص در خارج از این بازه را برونویانی می‌نامند.
- پس از مرتب کردن مقادیر داده‌ها، عددی را که تعداد داده‌های قبل از آن با تعداد داده‌های بعد از آن برابر است را میانه می‌نامند.

### ■ نمودار جعبه‌ای



## ■ نمودارها و منحنی‌ها

### ■ حد تابع

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = A \quad \lim_{x \rightarrow a} g(x) = B. \Leftarrow \text{اگر}$$

$$\lim_{x \rightarrow a} k = k \quad \lim_{x \rightarrow a} [k \cdot f(x)] = k \cdot \lim_{x \rightarrow a} f(x) = k \cdot A.$$

$$\lim_{x \rightarrow a} [f(x) \pm g(x)] = \lim_{x \rightarrow a} f(x) \pm \lim_{x \rightarrow a} g(x) = A \pm B$$

$$\lim_{x \rightarrow a} [f(x) \cdot g(x)] = [\lim_{x \rightarrow a} f(x)] \cdot [\lim_{x \rightarrow a} g(x)] = A \cdot B$$

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{\lim_{x \rightarrow a} f(x)}{\lim_{x \rightarrow a} g(x)} = \frac{A}{B} \quad B \neq 0$$

$$p(x) \quad \Rightarrow \quad \text{چند جمله‌ای باشد} \quad \lim_{x \rightarrow a} p(x) = p(a).$$

$$\lim_{x \rightarrow a} [f(x)]^k = [\lim_{x \rightarrow a} f(x)]^k = A^k.$$

### ■ پیوستگی و ناپیوستگی تابع‌ها

تابع  $f$  و یک نقطه  $a$  از دامنه آن را در نظر بگیرید. گوییم تابع  $f$  در نقطه  $a$  پیوسته است، هرگاه حد  $f$  در  $a$  موجود باشد و


$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$$

در غیر این صورت گوییم تابع  $f$  در نقطه  $a$  ناپیوسته است. اگر تابعی در همه نقاط دامنه خود پیوسته باشد، آن را تابعی پیوسته می‌نامند.

### مشتق و شیب خط مماس بر نمودار تابع ✓

فرض کنید تابع  $f$  در نقطه  $a$  از دامنه خود مشتق پذیر باشد. در این صورت،  $(a) f'$  نشان‌دهنده

$$\text{شیب خط مماس بر نمودار این تابع در نقطه } M = \begin{bmatrix} a \\ f(a) \end{bmatrix} \text{ است.}$$



### مشتق تابع

$$m_{\tan} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_1 + h) - f(x_1)}{h}$$

$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x + h) - f(x)}{h}$$

$$f(x) = k \quad f'(x) = 0.$$

$$f(x) = x^n \quad f'(x) = nx^{n-1}$$

$$f(x) = k \cdot g(x) \quad f'(x) = k \cdot g'(x)$$

$$f(x) = u(x) \pm v(x) \quad f'(x) = u'(x) \pm v'(x).$$

$$f(x) = u(x) \cdot v(x) \quad f'(x) = u(x) \cdot v'(x) + v(x) \cdot u'(x).$$

$$f(x) = u(x)/v(x) \quad f'(x) = \frac{v(x) \cdot u'(x) - u(x) \cdot v'(x)}{[v(x)]^2}.$$

$$y=f[g(x)] \quad \frac{dy}{dx} = f'[g(x)].g'(x).$$

## اندازه‌گیری و دستگاه بین‌المللی یکاها

### کمیت‌های اصلی و یکای آنها

نام یکا	نام یکا	کمیت
m	متر	طول
kg	کیلوگرم	جرم
s	ثانیه	زمان
K	کلوین	دما
mol	مول	مقدار ماده
A	آمپر	جريان الکتریکی
cd	کنده (شمع)	شدت روشنایی

### یکای فرعی

یکای فرعی	یکای	کمیت
m/s	m/s	تندی و سرعت
m/s <sup>r</sup>	m/s <sup>r</sup>	شتاب
kg.m/s <sup>r</sup>	(N)	نیرو
kg/ms <sup>r</sup>	(Pa)	فشار
kgm <sup>r</sup> /s <sup>r</sup>	(J)	انرژی

### مقادیر تقریبی برخی طول‌های اندازه‌گیری شده

جسم	طول	جسم	طول
افق اهل منظومه شمسی تا نزدیک‌ترین کهکشان	$2 \times 10^{11}$	طول زمین فوتیال	$9 \times 10^1$
افق اهل منظومه شمسی تا نزدیک‌ترین ستاره	$4 \times 10^{16}$	طول بدن نوعی مگس	$5 \times 10^{-3}$
یک سال نوری	$9 \times 10^{15}$	اندازه ذرات کوچک گرد و خاک	$1 \times 10^{-4}$
شعاع مدار میانگین زمین به دور خورشید	$1 / 1.5 \times 10^{11}$	اندازه یاخته‌های بیشتر موجودات زنده	$1 \times 10^{-5}$
افق اهل میانگین ماه از زمین	$3 / 8.4 \times 10^8$	اندازه بیشتر میکروب‌ها	$0 / 2 - 2 \times 10^{-6}$
افق اهل میانگین زمین	$6 / 4.0 \times 10^6$	قطر اتم هیدروژن	$1 / 5.6 \times 10^{-10}$
افق اهل ماهواره‌های مخابراتی از زمین	$3 / 6 \times 10^7$	قطر هسته اتم هیدروژن (قطر بروتون)	$1 / 7.5 \times 10^{-15}$

## مقادیر تقریبی برخی جرم‌های اندازه‌گیری شده

جسم (kg)	جسم (kg)	جسم
$7 \times 10^{-1}$	انسان	$1 \times 10^{53}$ عالم قلیل مشاهده
$1 \times 10^{-1}$	قورباغه	$7 \times 10^{41}$ کهکشان راه شیری
$1 \times 10^{-5}$	پشه	$2 \times 10^{30}$ خورشید
$1 \times 10^{-15}$	باکتری	$6 \times 10^{24}$ زمین
$1/6 \times 10^{-27}$	اتم هیدروژن	$7/34 \times 10^{22}$ ماه
$9/1 \times 10^{-31}$	الکترون	$1 \times 10^{-3}$ کوسمه

## مقادیر تقریبی برخی از بازه‌های اندازه‌گیری شده

بازه زمانی	ثانیه
سن عالم	$5 \times 10^{17}$
سن زمین	$1/43 \times 10^{17}$
میانگین عمر یک انسان	$2 \times 10^9$
یک سال	$3/15 \times 10^7$
یک روز	$8/6 \times 10^4$
زمان بین دو ضربان عادی قلب	$8 \times 10^{-1}$

## واحدهای اندازه‌گیری انگلیسی

### ۱ واحدهای اندازه‌گیری طول

۱ میلی‌متر (mm) =  $25/4$  سانتی‌متر (cm) =  $2/5$  اینچ (in)

۱ فوت (ft) = ۱۲ اینچ (in)

۱ فوت (ft) =  $36$  اینچ (in)  $\cong 90$  سانتی‌متر (cm)

۱ فوت (ft) =  $5280$  متر (m)  $= 1609/344$  اینچ (in)  $= 63360$  mil (mil)

۱ متر (m)  $\cong 1853$  فوت (ft)  $\cong 6080$  مایل دریایی (nautical mile)

۱ مایل خشکی (dry mile)  $\cong 1/15$  مایل دریایی (nautical mile)

ضریب تبدیل (با تقریب کمتر از ۰/۰۱)	به	برای تبدیل از
۱/۶۱	کیلومتر	مایل
۲/۵۴	سانتی‌متر	اینچ
۰/۳۱	متر	فوت
۰/۹۱	متر	یارد
۰/۶۲	مایل	کیلومتر
۰/۳۹	اینچ	سانتی‌متر
۳/۲۸	فوت	متر
۱/۰۹	یارد	متر

## ۲ واحدهای اندازه‌گیری جرم

۱ اونس (oz) = ۰/۰۳۵ گرم (g)

۱ گرم (g) ≈ ۲۸ اونس (oz)

۱ کیلوگرم (kg) ≈ ۳۵/۲۷ اونس (oz)

۱ پوند (lb) ≈ ۴۵۰ اونس (oz)

۱ کیلوگرم (kg) ≈ ۰/۴۵ پوند (lb)

۱ پوند (lb) ≈ ۲۲۰۰ تن (T)

## ۳ واحدهای اندازه‌گیری حجم

۱ میلی‌لیتر (ml) = ۵ قاشق چایخوری (tsp)

۱ میلی‌لیتر (ml) = ۱۵ قاشق سوپ‌خوری (tbsp)

۱ میلی‌لیتر (ml) = ۲۴۰ فنجان (C)


## پیشوندهای مورد استفاده در دستگاه SI

نماد	پیشوند	ضریب	نماد	پیشوند	ضریب
y	یوکتو	$10^{-24}$	Y	یوتا	$10^{24}$
z	زیتو	$10^{-21}$	Z	زتا	$10^{21}$
a	آتو	$10^{-18}$	E	اگزا	$10^{18}$
f	فِمتو	$10^{-15}$	P	پِتا	$10^{15}$
p	پیکو	$10^{-12}$	T	تِرا	$10^{12}$
n	نانو	$10^{-9}$	G	گیگا (جیگا)	$10^9$
μ	میکرو	$10^{-6}$	M	مِگا	$10^6$
m	میلی	$10^{-3}$	k	کیلو	$10^3$
c	سانتی	$10^{-2}$	h	هِکتو	$10^2$
d	دِسی	$10^{-1}$	da	دِکا	$10^1$




پیشوندهای کوچک کننده یکای متر

اهرم‌ها



گشتاور نیروی ساعتگرد = گشتاور نیروی پاد ساعتگرد  
 $d_r \times f_r = d_l \times f_l$




مزیت مکانیکی

$$\text{مزیت مکانیکی} = \frac{\text{بازوی محرك}}{\text{بازوی مقاوم}} = \frac{\text{اندازه نیروی مقاوم}}{\text{اندازه نیروی محرك}}$$

کاربرد	فرمول (معادله، رابطه)
جریان مقاومت‌های موازی	$I_1 + I_2 + I_3 = I_{eq}$
ولتاژ مقاومت‌های موازی	$V_1 = V_2 = V_3 = V_{eq}$
مقاومت معادل مقاومت‌های موازی	$\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} = \frac{1}{R_{eq}}$
فشار و ارتباط آن با نیروی عمودی و سطح تماس	$P = \frac{F}{A}$
اختلاف فشار دو نقطه شاره ساکن	$P_3 - P_1 = +\rho g \Delta h$
فشار یک نقطه شاره ساکن	$P = \rho g \Delta h + p_{atm}$
اصل پاسکال	$P_3 = P_1 \Rightarrow \frac{F_1}{A_1} = \frac{F_3}{A_3}$
چگالی	$\rho = \frac{m}{v}$
چگالی نسبی	$d = \frac{\rho_3}{\rho_1}$
رابطه دما در مقیاس سلسیوس و مقیاس فارنهایت	$F = \frac{9}{5}\theta + 32$
رابطه دما در مقیاس سلسیوس و مقیاس کلوین	$T = \theta + 273$
رابطه دما در مقیاس فارنهایت و مقیاس کلوین	$T = (F + 459) \div 1.8$
مقدار گرمای داده شده به یک جسم	$Q = mC(\theta_3 - \theta_1) = mC\Delta\theta$
تعادل گرمایی	$Q_1 + Q_2 + Q_3 + \dots = 0$
گرمای منتقل شده از طریق رسانش	$Q = \frac{KAt(T_3 - T_1)}{L} = \frac{KAt\Delta T}{L}$
انسپاٹ خطی	$I_3 - I_1 = \alpha I_3 \Delta \theta$ $I_3 = I_1(1 + \alpha \Delta \theta)$
انبساط سطحی	$A_3 - A_1 = 2\alpha A_3 \Delta \theta$ $A_3 = A_1(1 + 2\alpha \Delta \theta)$
انبساط حجمی	$V_3 - V_1 = 3\alpha V_1 \Delta \theta$ $V_3 = V_1(1 + 3\alpha \Delta \theta)$

کاربرد	فرمول (معادله، رابطه)	کاربرد	فرمول (معادله، رابطه)
نیروی وزن	$g = \frac{W}{m} \rightarrow W = mg$	بازه زمانی	$\Delta t = t_f - t_i$
بیشینه نیروی اصطکاک ایستایی	$f_{s(max)} = \mu_s N$	جابجایی	$\Delta x = x_f - x_i$
نیروی اصطکاک جنبشی	$f_k = \mu_k N$	سرعت متوسط	$\bar{v} = \frac{x_f - x_i}{t_f - t_i} = \frac{\Delta x}{\Delta t}$
شدت جریان الکتریکی متوسط	$I = \frac{\Delta q}{\Delta t}$	رابطه مکان زمان حركت یکنواخت	$x = vt + x_0$
قانون اهم	$R = \frac{V}{I}$	شتاب متوسط	$\bar{a} = \frac{\Delta v}{\Delta t}$
مقاومت رساناهای فلزی در دمای ثابت	$R = \frac{\rho L}{A}$	شتاب لحظه‌ای حركت با شتاب ثابت	$a = \bar{a} = \frac{\Delta v}{\Delta t}$
انرژی الکتریکی مصرفی	$U = I^2 R t$	رابطه سرعت زمان حركت با شتاب ثابت	$v = v_0 + at$
توان مصرفی	$P = I^2 R$ و $P = \frac{U}{t}$ $P = VI$ و $P = \frac{V^2}{R}$	سرعت متوسط در حركت با شتاب ثابت	$\bar{v} = \frac{v_f + v_i}{2}$
جریان مقاومت‌های متواالی (سری)	$I_1 = I_2 = I_3 = I_{eq}$	رابطه مستقل از زمان در حركت با شتاب ثابت	$v_f^2 - v_i^2 = 2a(x - x_0)$
ولتاژ مقاومت‌های متواالی (سری)	$V_1 + V_2 + V_3 = V_{eq}$	رابطه جابجایی در حركت با شتاب ثابت	$\Delta x = x_f - x_i = \frac{1}{2}at^2 + v_0 t$
مقاومت معادل مقاومت‌های متواالی (سری)	$R_1 + R_2 + R_3 = R_{eq}$	قانون دوم نیوتن	$\vec{a} = \frac{\vec{F}}{m}$




## کدهای رنگی مقاومت



انواع مقاومت ثابت



مقدار مقاومت درصد خطأ



نحوه خواندن مقاومت رنگی

رنگ	کد رنگ	درصد خطأ
سیاه	۰	-
قهوه‌ای	۱	۱ درصد
قرمز	۲	۲ درصد
نارنجی	۳	۳ درصد
زرد	۴	۴ درصد
سبز	۵	-
آبی	۶	-
بنفش	۷	-
خاکستری	۸	-
سفید	۹	-
طلایی	-	۵ درصد
نقره‌ای	-	۱۰ درصد

## ضریب انبساط طولی برخی اجسام

ماده	$\frac{1}{k}$	ماده	$\frac{1}{k}$
الجاس	$1/2 \times 10^{-6}$	مس	$17 \times 10^{-6}$
شیشه پرکس	$3/2 \times 10^{-6}$	برنج	$19 \times 10^{-6}$
شیشه معمولی	$9-12 \times 10^{-6}$	آلومینیوم	$23 \times 10^{-6}$
فولاد	$11-13 \times 10^{-6}$	سرپ	$29 \times 10^{-6}$
بتن	$10-14 \times 10^{-6}$	( $^{\circ}\text{C}$ )	$51 \times 10^{-6}$

ضریب انبساط حجمی چند مایع در  
دهمای حدود  $20^{\circ}\text{C}$

جرمای ویژه $\text{J/kg.K}$	ماده	ضریب انبساط طولی $\frac{1}{k}$	ماده
۱۲۸	سرپ	$۰/۱۸ \times ۱۰^{-۳}$	جیوه
۱۳۴	تنگستن	$۰/۲۷ \times ۱۰^{-۳}$	آب
۲۳۶	نقره	$۰/۴۹ \times ۱۰^{-۳}$	گلیسیرین
۳۸۶	مس	$۰/۷۰ \times ۱۰^{-۳}$	روغن زیتون
۹۰۰	آلومینیوم	$۰/۷۶ \times ۱۰^{-۳}$	پارافین
۳۸۰	برنج	$۱/۰۰ \times ۱۰^{-۳}$	بنزین
۴۵۰	نوعی فولاد (آلیاژ آهن با $۲\%$ کربن)	$۱/۰۹ \times ۱۰^{-۳}$	اتانول
۴۹۰	فولاد زنگ نزن	$۱/۱۰ \times ۱۰^{-۳}$	استیک اسید
۱۳۵۶	چوب	$۱/۲/۷ \times ۱۰^{-۳}$	بنزن
۷۹۰	گرانیت	$۱/۴/۳ \times ۱۰^{-۳}$	کلروفرم
۸۰۰	بتون	$۱/۶/۰ \times ۱۰^{-۳}$	استون
۸۴۰	شیشه	$۲/۴/۵ \times ۱۰^{-۳}$	اتر
۲۲۲۰	یخ	$۰/۹/۱۷ \times ۱۰^{-۳}$	آمونیاک
۱۴۰	جیوه	$۰/۱/۳ \times ۱۰^{-۳}$	
۲۴۳۰	اتانول	$۰/۱/۵ \times ۱۰^{-۳}$	
۳۹۰۰	آب دریا	$۰/۱/۷ \times ۱۰^{-۳}$	
۴۱۸۷	آب	$۰/۱/۹ \times ۱۰^{-۳}$	

\* تمام نقاط غیر از یخ در دمای  $20^{\circ}\text{C}$

### چگالی برخی مواد متداول

$\rho(\text{kg/m}^3)$	ماده	$\rho(\text{kg/m}^3)$	ماده
$۱/۰۰ \times ۱۰^{-۳}$	آب	$۰/۹/۱۷ \times ۱۰^{-۳}$	یخ
$۱/۲۶ \times ۱۰^{-۳}$	گلیسیرین	$۲/۷۰ \times ۱۰^{-۳}$	آلومینیوم
$۰/۸۰۶ \times ۱۰^{-۳}$	اتیل الکل	$۷/۸۶ \times ۱۰^{-۳}$	آهن
$۰/۸۷۹ \times ۱۰^{-۳}$	بنزن	$۸/۹۲ \times ۱۰^{-۳}$	مس
$۱۳/۶ \times ۱۰^{-۳}$	جیوه	$۱۰/۵ \times ۱۰^{-۳}$	نقره
$۱/۲۹$	هوای	$۱۱/۳ \times ۱۰^{-۳}$	سرپ
$۱/۷۹ \times ۱۰^{-۱}$	هليم	$۱۹/۱ \times ۱۰^{-۳}$	اورانیوم
$۱/۴۳$	اکسیژن	$۱۹/۳ \times ۱۰^{-۳}$	طلاء
$۸/۹۹ \times ۱۰^{-۳}$	هیدروژن	$۲۱/۴ \times ۱۰^{-۳}$	پلاتین

داده های این جدول در دمای صفر درجه ( $0^{\circ}\text{C}$ ) سلسیوس و فشار یک اتمسفر اندازه گیری و گزارش شده اند.

## جدول تناوبی عنصرها

۱	<b>H</b> هیدروژن ۱...۱۰۰	۲	Li بئریتین ۱۰۰...۱۰۱	Be بئریتین ۱۰۱...۱۰۲	۳	Na نمی‌سیان ۱۰۰...۱۰۸	Mg نمی‌سیان ۱۰۸...۱۱۰	۴	Ca نمی‌سیان ۱۱۰...۱۱۲	K نمی‌سیان ۱۱۲...۱۱۴	۵	Sc نمی‌سیان ۱۱۴...۱۱۵	Ti نمی‌سیان ۱۱۵...۱۱۷	V نمی‌سیان ۱۱۷...۱۱۹	Cr نمی‌سیان ۱۱۹...۱۲۰	Mn نمی‌سیان ۱۲۰...۱۲۱	Fe نمی‌سیان ۱۲۱...۱۲۲	Co نمی‌سیان ۱۲۲...۱۲۳	Ni نمی‌سیان ۱۲۳...۱۲۴	Cu نمی‌سیان ۱۲۴...۱۲۵	Zn نمی‌سیان ۱۲۵...۱۲۶	Ga نمی‌سیان ۱۲۶...۱۲۷	Ge نمی‌سیان ۱۲۷...۱۲۸	As نمی‌سیان ۱۲۸...۱۲۹	Se نمی‌سیان ۱۲۹...۱۳۰	Br نمی‌سیان ۱۳۰...۱۳۱	Kr نمی‌سیان ۱۳۱...۱۳۲
۱	<b>H</b> هیدروژن ۱...۱۰۰	۲	Li بئریتین ۱۰۰...۱۰۱	Be بئریتین ۱۰۱...۱۰۲	۳	Na نمی‌سیان ۱۰۰...۱۰۸	Mg نمی‌سیان ۱۰۸...۱۱۰	۴	Ca نمی‌سیان ۱۱۰...۱۱۲	K نمی‌سیان ۱۱۲...۱۱۴	۵	Sc نمی‌سیان ۱۱۴...۱۱۵	Ti نمی‌سیان ۱۱۵...۱۱۷	V نمی‌سیان ۱۱۷...۱۱۹	Cr نمی‌سیان ۱۱۹...۱۲۰	Mn نمی‌سیان ۱۲۰...۱۲۱	Fe نمی‌سیان ۱۲۱...۱۲۲	Co نمی‌سیان ۱۲۲...۱۲۳	Ni نمی‌سیان ۱۲۳...۱۲۴	Cu نمی‌سیان ۱۲۴...۱۲۵	Zn نمی‌سیان ۱۲۵...۱۲۶	Ga نمی‌سیان ۱۲۶...۱۲۷	Ge نمی‌سیان ۱۲۷...۱۲۸	As نمی‌سیان ۱۲۸...۱۲۹	Se نمی‌سیان ۱۲۹...۱۳۰	Br نمی‌سیان ۱۳۰...۱۳۱	Kr نمی‌سیان ۱۳۱...۱۳۲
۶	Al نمی‌سیان ۱۳۲...۱۳۳	۷	Si نمی‌سیان ۱۳۳...۱۳۴	۸	P نمی‌سیان ۱۳۴...۱۳۵	۹	S نمی‌سیان ۱۳۵...۱۳۶	۱۰	Cl نمی‌سیان ۱۳۶...۱۳۷	۱۱	Ar نمی‌سیان ۱۳۷...۱۳۸	۱۲	Ne نمی‌سیان ۱۳۸...۱۳۹	۱۳	F نمی‌سیان ۱۳۹...۱۴۰	۱۴	He نمی‌سیان ۱۴۰...۱۴۱	۱۵	W	۱۶	W	۱۷	W				
۱۸																											

عدد اتمی  
عنصر  
حیدروژن

جذب اتمی میانگین

جذب اتمی

حامد

مالع

کاز

حیدروژن

عنصر

عدد اتمی





۱۸	La نمی‌سیان ۱۳۸...۱۳۹	۱۹	Ce نمی‌سیان ۱۳۹...۱۴۰	۲۰	Pr نمی‌سیان ۱۴۰...۱۴۱	۲۱	Nd نمی‌سیان ۱۴۱...۱۴۲	۲۲	Sm نمی‌سیان ۱۴۲...۱۴۳	۲۳	Eu نمی‌سیان ۱۴۳...۱۴۴	۲۴	Gd نمی‌سیان ۱۴۴...۱۴۵	۲۵	Tb نمی‌سیان ۱۴۵...۱۴۶	۲۶	Dy نمی‌سیان ۱۴۶...۱۴۷	۲۷	Ho نمی‌سیان ۱۴۷...۱۴۸	۲۸	Er نمی‌سیان ۱۴۸...۱۴۹	۲۹	Yb نمی‌سیان ۱۴۹...۱۵۰
۲۰	Ac نمی‌سیان ۱۴۰...۱۴۱	۲۱	Th نمی‌سیان ۱۴۱...۱۴۲	۲۲	Pa نمی‌سیان ۱۴۲...۱۴۳	۲۳	U نمی‌سیان ۱۴۳...۱۴۴	۲۴	Np نمی‌سیان ۱۴۴...۱۴۵	۲۵	Pu نمی‌سیان ۱۴۵...۱۴۶	۲۶	Am نمی‌سیان ۱۴۶...۱۴۷	۲۷	Cm نمی‌سیان ۱۴۷...۱۴۸	۲۸	Cf نمی‌سیان ۱۴۸...۱۴۹	۲۹	Md نمی‌سیان ۱۴۹...۱۵۰				
۲۱	Fr نمی‌سیان ۱۴۱...۱۴۲	۲۲	Ra نمی‌سیان ۱۴۲...۱۴۳	۲۳	Db نمی‌سیان ۱۴۳...۱۴۴	۲۴	Bh نمی‌سیان ۱۴۴...۱۴۵	۲۵	Mt نمی‌سیان ۱۴۵...۱۴۶	۲۶	Rg نمی‌سیان ۱۴۶...۱۴۷	۲۷	Lv نمی‌سیان ۱۴۷...۱۴۸	۲۸	Uuo نمی‌سیان ۱۴۸...۱۴۹	۲۹	Uus نمی‌سیان ۱۴۹...۱۵۰						
۲۲																							


## ثابت تفکیک اسیدها (Ka) و بازها (Kb)


**توجه:** در شرایط یکسان (دما و غلظت) هر چه ثابت تفکیک اسید یا بازی بزرگ‌تر باشد، آن اسید یا باز قوی‌تر است.



ثابت تفکیک (Ka)	فرمول شیمیابی	نام اسید	ثابت تفکیک (K <sub>a</sub> )	فرمول شیمیابی	نام اسید
$6.9 \times 10^{-3}$	H <sub>3</sub> PO <sub>4</sub>	فسفریک اسید	اسید قوی	HClO <sub>4</sub>	پر کلریک اسید
$1.3 \times 10^{-3}$	CH <sub>3</sub> ClCO <sub>2</sub> H	کلرو استیک اسید	اسید قوی	H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub>	سولفوریک اسید
$7.4 \times 10^{-4}$	C <sub>6</sub> H <sub>5</sub> O <sub>7</sub>	سیتریک اسید	اسید قوی	HI	هیدروکلریک اسید
$6.3 \times 10^{-4}$	HF	هیدروفلوئوریک اسید	اسید قوی	HCl	هیدروکلریک اسید
$5.6 \times 10^{-4}$	HNO <sub>2</sub>	نیترو اسید	اسید قوی	HNO <sub>3</sub>	نیتریک اسید
$6.2 \times 10^{-5}$	C <sub>6</sub> H <sub>5</sub> CO <sub>2</sub> H	بنزوئیک اسید	$2.2 \times 10^{-1}$	CCl <sub>3</sub> CO <sub>2</sub> H	تری کلرو استیک اسید
$1.7 \times 10^{-5}$	CH <sub>3</sub> CO <sub>2</sub> H	استیک اسید	$1.8 \times 10^{-1}$	H <sub>2</sub> CrO <sub>4</sub>	کرومیک اسید
$4.5 \times 10^{-7}$	H <sub>2</sub> CO <sub>3</sub>	کربنیک اسید	$1.7 \times 10^{-1}$	HIO <sub>3</sub>	یدیک اسید
$8.9 \times 10^{-8}$	H <sub>2</sub> S	هیدرو سولفوریک اسید	$5.6 \times 10^{-1}$	C <sub>2</sub> H <sub>5</sub> O <sub>4</sub>	اگرالیک اسید
$4 \times 10^{-8}$	HClO	هیپوکلرو اسید	$5 \times 10^{-3}$	H <sub>3</sub> PO <sub>3</sub>	فسفو اسید
$5.4 \times 10^{-10}$	H <sub>3</sub> BO <sub>3</sub>	بوریک اسید	$4.5 \times 10^{-1}$	CHCl <sub>3</sub> CO <sub>2</sub> H	دی کلرو استیک اسید
			$1.4 \times 10^{-3}$	H <sub>2</sub> SO <sub>3</sub>	سولفورو اسید
ثابت تفکیک (K <sub>b</sub> )	فرمول شیمیابی	نام باز	ثابت تفکیک (K <sub>b</sub> )	فرمول شیمیابی	نام باز
$4 \times 10^{-4}$	C <sub>6</sub> H <sub>5</sub> NH <sub>2</sub>	بوتیل آمین	باز قوی	KOH	پتاسیم هیدروکسید
$6.3 \times 10^{-5}$	(CH <sub>3</sub> ) <sub>2</sub> N	تری متیل آمین	باز قوی	NaOH	سدیم هیدروکسید
$1.8 \times 10^{-5}$	NH <sub>3</sub>	آمونیاک	باز قوی	Ba(OH) <sub>2</sub>	باریم هیدروکسید
$1.7 \times 10^{-9}$	C <sub>6</sub> H <sub>5</sub> N	پیریدین	باز قوی	Ca(OH) <sub>2</sub>	کلسیم هیدروکسید
$7.4 \times 10^{-10}$	C <sub>6</sub> H <sub>5</sub> NH <sub>2</sub>	آنیلین	$5.4 \times 10^{-4}$	(CH <sub>3</sub> ) <sub>2</sub> NH	دی متیل آمین
			$4.5 \times 10^{-4}$	C <sub>6</sub> H <sub>5</sub> NH <sub>2</sub>	اتیل آمین




نمونه‌ها	نام کلرید	حالت فیزیکی	نوع کلرید	فاز پخش کننده	فاز پخش شونده
-	-	-	-	گاز	گاز
کفت صابون	کفت	مایع	گاز در مایع	مایع	
سنگ پا، یونالیت	کفت جامد	جامد	گاز در جامد	جامد	
مه، افسانه‌ها (اسپرسی‌ها)	آبروسول مایع	گاز	مایع در گاز	گاز	مایع
شیر، کره، مایونیز	امولسیون	مایع	مایع در مایع	مایع	
ژله، ژل موی سر	ژل	جامد	مایع در جامد	جامد	
دود، غبار	آبروسول جامد	گاز	جامد در گاز	گاز	جامد
رنگ‌های روغنی، چسب مایع	سول	مایع	جامد در مایع	مایع	
سرامیک، شیشه، رنگی، یاقوت، لعل، فیروزه	سول جامد	جامد	جامد در جامد	جامد	








ساختار سلولی	درشت مولکول	واحد سازنده	
			نیتروژن پونیک
			آسید نوکلئیک
			پروتئین
			چربی

تصویر انواع درشت مولکول‌های شرکت‌کننده در ساختار یاخته‌ها

## سازمان‌بندی یاخته‌ها








تصویر گروه های اصلی جانوران

جدول فهرست منابع طبیعی


موضوعات	نوع منبع
جنگل ها و مراع و کشاورزی	منابع گیاهی
حيات وحش و دامپروری	منابع جانوری
مجموعه قارچ ها و باکتری ها	منابع میکروبی
مدت زمان دریافت نور، شدت نور خورشید، دما، شدت باد، رطوبت، ابرناکی و انواع بارش	منابع جوی
آنواع آب: سفره های آب زیرزمینی، چشمته ها، روان آب ها، آبگیرها، دریاچه ها، دریاها و آقیانوس ها	منابع آبی
انواع خاک و بستر سنگی - کوه، تپه، دره و دشت	منابع خاکی
فلزات و سنگ های قیمتی	منابع کانی
نفت، گاز و زغال سنگ	منابع فسیلی
تمام افراد جامعه	منابع انسانی




## زیست‌شناسی در مورد انسان



شكل بالا گردش خون را در بدن نشان می‌دهد. شماره ۳، ۲، ۴ آغاز و پایان گردش ششی و ۱، ۵ و ۶ آغاز و پایان گردش عمومی خون را نشان می‌دهد.



### تنوع استخوان‌ها و کاربرد آنها در ورزش



- ۱ دفتر برنامه ریزی و تأثیف آموزش‌های فنی و حرفه‌ای و کارداش. برنامه درسی رشته معماری داخلی، ۱۳۹۳.
- ۲ آریانزاد، پرستو. طراحی معماری. تهران. شرکت چاپ و نشر کتاب‌های درسی ایران، چاپ سوم، ۱۳۹۶.
- ۳ پترو، جولیوس. زلینگ، مارتین. ترجمه محمد احمدی‌نژاد. ابعاد انسانی و فضاهای داخلی. کتاب مرجع استانداردهای طراحی. تهران. نشر خاک. چاپ دوم. پاییز ۱۳۸۶.
- ۴ حاجی قاسمی و دیگران. گنجنامه. فرهنگ آثار معماری اسلامی ایران: خانه‌های کاشان. تهران. انتشارات دانشگاه شهید بهشتی. ۱۳۷۵.
- ۵ حاجی قاسمی و دیگران. گنجنامه، فرهنگ آثار معماری اسلامی ایران: خانه‌های یزد. تهران. انتشارات دانشگاه شهید بهشتی و انتشارات روزنه. ۱۳۸۳.
- ۶ حاجی قاسمی و دیگران. گنجنامه. فرهنگ آثار معماری اسلامی ایران: خانه‌ها (جلد ۱ و ۲). تهران. انتشارات دانشگاه شهید بهشتی و انتشارات روزنه. ۱۳۸۳.
- ۷ خان محمدی، محمد علی. مبانی طراحی معماری. تهران. شرکت چاپ و نشر کتاب‌های درسی ایران. ۱۳۸۶.
- ۸ دچیار، جوزف، پترو، جولیوس. زلینک، مارتین. ترجمه میرحسین سیفی، استانداردهای جامع معماری داخلی و طراحی فضا (تايم سیور Time-Saver)، تهران. نشر شهراب. چاپ اول ۱۳۹۱.
- ۹ سرتیپی‌پور، محسن. خانه‌های روستایی ایران. تهران. بنیاد مسکن انقلاب اسلامی. ۱۳۸۸.
- ۱۰ سید صدر، سید ابوالقاسم. معماری. رنگ و انسان. تهران. آثار اندیشه. بهار ۱۳۸۴.
- ۱۱ صادقی‌پی، ناهید. طرح معماری، طراحی خانه مسکونی. تهران. انتشارات فاطمی. ۱۳۹۰.
- ۱۲ طاقی، زهرا. ترسیم فنی و نقشه‌کشی. تهران. شرکت چاپ و نشر کتاب‌های درسی ایران. ۱۳۹۵.
- ۱۳ قاسم‌زاده، مسعود. معیارهای ابعادی و ملاحظات طراحی فضاهای واحد مسکونی شهری. تهران. مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی. ۱۳۹۱.
- ۱۴ کامبی، ابریکو و به نه د تو. کریستینا و اشتاینر. جوانان بالتسانه تی. ترجمه حسین ماهوتی‌پور. تیپولوژی ساختمان‌های مسکونی حیاط دار تهران. نشر امین دز. ۱۳۸۲.
- ۱۵ مهندسین مشاور زیستا. راهنمای عمومی طراحی مسکن و محیط مسکونی. تهران. وزارت راه و شهرسازی. مرکز مطالعاتی و تحقیقاتی شهرسازی و معماری. ۱۳۹۰.
- ۱۶ نویفرت، ارنست. نویفرت، پیتر. ترجمه حسین مظفری ترشیزی. اطلاعات معماری نویفرت. تهران. نشر آزاده. ۱۳۸۶.

- ۱۷** ونتلینگ، جیمز. ترجمه حبیب قاسمی. طراحی مسکن بر پایه سبک زندگی.  
مشهد. کتابکده کسری. ۱۳۹۲.
- ۱۸** نیکخواه، عباس. متره و برآورده. تهران. شرکت چاپ و نشر کتاب‌های درسی ایران. ۱۳۹۶.
- ۱۹** فهرست بها واحد پایه. رشتة ابنيه سال ۱۳۹۶. سازمان برنامه و بودجه.
- ۲۰** استانداردهای سازمان ملی استاندارد.
- ۲۱** موافقتنامه و شرایط عمومی و شرایط خصوصی و پیمان‌ها (نشریه شماره ۴۳۱۱ سازمان برنامه و بودجه).
- ۲۲** ارجمند، محمدعلی. متره و برآورد و اصول پیمانکاری. تهران. نشر آزاده. ۱۳۹۵
- ۲۳** حقایقی، نصرت الله. متره و برآورد و آنالیز بهاء. تهران. انتشارات دانشگاه علم و صنعت ایران. ۱۳۹۳.
- ۲۴** فرخزاد، محمد. کاربرد رایانه در نقشه‌کشی معماری. تهران. چاپ و نشر کتاب‌های درسی. ۱۳۹۵.
- ۲۵** تاجالدینی، شاهین. اتوکد و نقشه‌های ساختمانی. تهران. چاپ و نشر کتاب‌های درسی. ۱۳۹۵.
- ۲۶** خان‌محمدی، محمدعلی، نقشه‌کشی معماری، آموزش و پژوهش. ۱۳۹۵
- ۲۷** خان‌محمدی، محمدعلی، نقشه‌کشی فنی ساختمان، آموزش و پژوهش ۱۳۹۲
- ۲۸** فخیمی، محمدمهری. طراحی داخلی (از معماری تا دکوراسیون داخلی). انتشارات پرهام نقش. ۱۳۹۲
- ۲۹** علیرضایی، مهدی و سمیه ابراهیمی. معماری فضا. انتشارات علم معمار. ۱۳۹۴
- ۳۰** گریملی، گریس و می‌می‌لاو. مرجع و مشخصات فنی طراحی داخلی. انتشارات کتاب کده کسری. ۱۳۹۵
- ۳۱** سرمهد نهری، امیر. اطلاعات معماری نویفرت. انتشارات سیماهی دانش. ۱۳۹۱.
- ۳۲** استانداردهای نقشه‌کشی ساختمان. نشریه شماره ۲۵۶ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور.
- ۳۳** دچیارو، جوزف و جونیول پاندو و مارتین زلینک. استانداردهای جامع سازی داخلی و طراحی فضا. انتشارات شهرآب. ۱۳۹۳.
- ۳۴** کاتوس، دیتیریس. اطلاعات ضروری برای معماران. انتشارات طحان. ۱۳۹۳.
- ۳۵** مقررات ملی ساختمان مبحث ۱۲. وزارت مسکن و شهرسازی
- ۳۶** دی.کی.چینگ. فرهنگ بصری معماری. انتشارات یزدا. ۱۳۸۸.
- ۳۷** سورنسن، رابرت جیمز. ترجمه حبیب، فرح، فیاض، راما. معماری برای معلومان. مرکز نشر دانشگاهی. ۱۳۷۰.

**۲۸** Autodesk , Inc , AutoCAD 2017 Help , 2017

